

ی انتخاب برای تحمل به خشک در تعدادی از ھ ی ذرت دانه ای Study of selection indices for drought tolerance in some of grain maize hybrids

عباس جعفری ، رجب چوکان ، فرزاد پاک نژاد و عباس پور میدانی

چکیده

جعفری، ع، ر. چوکان، ف. پاک نژاد و ع. پورمیدانی.
مجله علوم زراعی ایران. () . . .
ی انتخاب برای تحمل به خشک در تعدادی از ھ ی ذرت دانه ای.

به منظور شناسایی ذرت دانه ای متحمل به تنش خشک، این پژوهش در سال زراعی ۱۳۹۷ در نزدیکی شهرک شکوهیه در استان قم در منطقه ای مه خشک و معتدل، اجرا گردید. در آن دو ذرت در آب با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی، در چهار تکرار در شرایط آبیاری معمول (آب ااری بعد از تخلیه درصد آب قابل دسترس) و تنش خشک (آبیاری بعد از تخلیه درصد آب قابل دسترس) مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه واریانس عملکرد ذرت دانه و اجزای عملکرد در شرایط آبیاری معمول و تنش خشک وجود تنوع در بین علماً دانه را نشان داد. بیان عملکرد ذرت دانه را در شرایط نرمال و تنش به شرایط BC678 و BC504 و NS504 داشتند. بیان کمترین عملکرد را در شرایط نرمال و تنش داشتند. برای ارزیابی از تنش از شاخص های (SSI) و (STI) و (MP) و (TOL) و (Harm) برداشت شد. بررسی انتخاب برای تحمل به خشک در ذرت دانه ای کاربرد در عناوین هارمه به تزاوی ذرت معرفی شد. ذرت دانه ای کاربرد در شرایط نرمال و تنش خشک داشتند.

واژه های کلی: ذرت، هیبرید، تنش خشک، شرایط نرمال، ذرت دانه ای تحمل، عملکرد ذرت

تاریخ دریافت: //

-دانشجوی سابق کارشناس ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
-پایت اعلم، بات اعلم، بات اعلم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
-پایت اعلم، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی استان قم

دیرس در شرایط بدون تنش و تنش در مرحله زا
ورو نشان دادند که بر اساس شاخص های GMP و
STI ای عملکرد بالا در دو محیط تنش و
بدون تنش، و با استفاده از شاخص SSI
ن عملکرد بالا در شرایط تنش انتخاب می گردد
(Fischer, and Maurer, 1978).

کک (Cakir, 2004) در ازمایشی که بری مطالعه
تأثیر تنش رطوبتی بر روی مراحل مختلف رشد رویشی
و زایشی ذرت انجام داد به این نتیجه رسید که تنش
دهی منجر به کاهش ارتفاع کیا و
نیز توسعه سطح برگ در ذرت می شود. کاهش آب
طی رشد رویشی سریع موجب کاهش - درصدی
وزن ماده خشک نهایی می شود.

هدف از ای ایاری بلند مدت، قطع ایاری برای دو تا سه دور را
در مراحل حساس رشد بتواند تحمل کنند.

مواد و روش

برای ارزیابی بزان تحمل به خشک در
ذرت، آزمایش در قالب طرح بلوک های
تصادفی، در چهار تکرار و در دو آزمایش جدا گانه
تحت شرایط نرمال (ایاری بعد از تخلیه درصد آب
قابل دسترس) و تنش خشک (ایاری بعد از تخلیه
رطوبت درصد آب قابل دسترس) در سال
انجام شد. محل اجرای ای ایاری در شمال غرب
استان قم و در تزدیک شهر کشکووه واقع بود و بر
اساس روش آمبرژه جزء مناطق نیمه خشک معتدل
ارتفاع منطقه از سطح دریا به طور متوسط
مترا و میانگین حرارت بیشینه ان، و کمینه ان
- درجه سانتیگراد است. میزان بارندگی آن حدود
میلی متر در سال می باشد. سطح آب زیر زمینی در
زمان اجرای ازمایش در عمق بیش از ۱۰ متری قرار
داشت. خاکورزی و زمان کاشت و عملیات داشت و
برداشت طبق عرف محل انجام شد. خاک بر اساس

بررسی تحمل به خشک و گزرنژه ای
محتمل بر اساس شرایط موجود هر منطقه انجام
شود. بر اثر مقدار بارش، شدت و پراکنش
زاده بارندگی و نوسانات دما از خصوصیات دار
خشک، با توجه به کمبود منابع آبی در
کشور و نیاز به صرفه جویی در مصرف آب، دستیابی به
ارقامی که نیاز کمزیری به آب داشته باشند یا در اثر
کمبود آب کمتر دچار صدمه و کاهش عملکرد شوند
ضروری می باشد. با توجه به نقش ذرت در تولید دام و
علوفه و تامین غذای دام و دیگر مصارف آن از جمله
مصارف صنعتی سبب شده است که ذرت در ایران نیز
جزء محصولات دارای اهمیت تلقی شود.
ذرت در ایران در راستای خود کفای از اهداف مهم
باشد و به همین منظور با اجرای برنامه های افزایش
تولید ذرت دانه ای در چند سال اخیر، این محصول روند
بسیار سریعی را از نظر سطح زیر کشت، تولید و
عملکرد طی نموده است.

مقدم و هادی زاده (2004) به منظور بررسی
العمل هیریدهای ذرت و لاین های والد آنها به
خشکی با استفاده از شاخصهای مختلف تحمل به تنش
ازمایشی را با مورد اجرا گذاشتند که نتایج نشان داد از
میان چهار شاخص محاسبه شده به نام شاخص های
TOL STI MP SSI STI (Larson and Clegg, 1999)
جهت گزینش ارقام مطلوب در شرایط تنش و بدون
تنش برخوردار هست (Roseille and Hamblin, 1981; Fernandez, 1992)
لارسن و کلگ (Larson and Clegg, 1999) در بررسی اثرات تنش
روطبه ای زودرس و دیررس ذرت به این اثرات
جهه رسیدند که این اثرات تنش را نسبت به
دیررس تحمل بیشتری داشتند که این امر
تواند موجب بهبود عملکرد شود. و همکاران
(در بررسی ای ایاری اثر تنش خشک
عملکرد و اجزای عملکرد در هشت ژنتیک پذیر

وزنی و میانگین وزن مخصوص ظاهری / گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد.

درصد تغیر رات صفات براثر تنفس در دو محیط از رابطه (Edmeads *et al.*, 1999) (ز.) بدست آمد:

نتایج تجزیه های شیمیایی محدودیت شوری و قلیائیت ندارد و میزان کربن آلی آن کم، فسفر و پتاسیم قابل جذب در حد متوسط است. میانگین رطوبت نیم رخ خاک تا عمق سانتیمتری در ظرفیت زراعی مزرعه و نقطه پژمردگی دائم به ترتیب برابر و درصد

هزان صفت در شرایط بدون تنفس = درصد تغییرات صفت زمان صفت در شرایط بدون تنفس

$$MP = \frac{Y_p + Y_s}{2}$$

مقادیر بالای TOL

خشکی بوده و هر قدر مقدار این شاخص پایین تر باشد، مطلوبتر خواهد بود. و ارقام متتحمل تر و مطلوب تر دارای مقادیر

(Fernandez, 1992) :
STI (STI)

$$STI = \left(\frac{Y_p}{\bar{Y}_p} \right) \left(\frac{Y_s}{\bar{Y}_s} \right) \left(\frac{\bar{Y}_s}{\bar{Y}_p} \right) = \frac{(Y_p)(Y_s)}{(\bar{Y}_p)^2}$$

مقدار بالاتر شاخص STI برای یک ژنوتیپ، نمایانگر تحمل به خشکی بالا و عملکرد بالقوه بیشتر از ژنوتیپ می باشد.

میانگین هندسی محصول دهنده (GMP) (Fernandez, 1992) :

$$GMP = \sqrt{(Y_s)(Y_p)}$$

این شاخص حساسیت کمتری به مقادیر بسیار متفاوت Y_p و Y_s دارد و بیشتر بودن مقدار عددی آن

در کلیه فرمول های فوق،

$=$ عملکرد بالقوه هر ژنوتیپ در محیط بدون تنفس.

$=$ عملکرد بالقوه هر ژنوتیپ در محیط تنفس.

بمنظور بررسی واکنش ژنوتیپ مورد مطالعه به شرایط تنفس خشک، از شاخص های مختلف بشرح زیر استفاده گردید:

(Fischer and Maures, 1978)

$$SSI = \frac{1 - (Y_s/Y_p)}{SI}$$

$$SI = 1 - \left(\frac{\bar{Y}_s}{\bar{Y}_p} \right)$$

SI معادل شدت تنفس می باشد. مقدار SSI کوچکتر باشد، میزان تحمل به خشکی بالاتر است. میانگین هارمونیک (Harm)

(Rosielie and Hamblin, 1981)

$$Harm = \frac{2(Y_p \times Y_s)}{Y_p + Y_s}$$

هر چقدر این شاخص بالاتر باشد مطلوب تر است. اختلاف عملکرد محصول (TOL) تنفس و بدون تنفس و همچنین شاخص محصول دهنده (MP) را بصورت میانگین عملکرد در دو محیط تنفس و بدون تنفس و بر اساس روابط زیر محاسبه می شود:

$$TOL = Y_p - Y_s$$

با توجه به اینکه میزان بالای عددی این شاخص نشان دهنده تحمل به تنش است، هیبریدهای BC504 و KSC302 به عنوان هیبریدهای برتر انتخاب شده اند.

عنوان هر بد های ضعیف تر معرف کرد. در شاخص میانکین هارمونیک با توجه به اینکه میزان بالای عددی نشان دهنده تحمل است از میان هیبریدهای مورد بررسی BC504 و KSC302 به عنوان BC652

این شاخص همه

که دارای عملکرد بالای بودند را به عنوان هیبریدهای متحمل بصن داد (جدول). مشاهده شود Harm در شناسایی ژنوتی فی محصول و متحمل به خشکی در ذرت مطلوب است.

این NS540 و BC678، را

لدهای ضعیف در برابر تنش معرف کرد (جدول).

عددی بالا نشان دهنده متحمل بودن هیبرید است.

این اساس هیبریدهای BC504 و BC652 و KSC302 همانطور که عنوان ژنوتی فی

مشاهده می شود این شاخص توانست همه هیبریدهای که دارای عملکرد بالا در شرایط بودند را به عنوان هیبرید متحمل شناسایی کند. از نظر ا

این NS540 و BC678، جزء هر لدهای ضعیف در

شرایط بودند. در شاخص GMP

اینکه مقادیر عددی بالا نشان دهنده تحمل نسبی BC504 و BC652

و KSC302 عنوان هیبریدهای متحمل شناسایی شدند.

GMP یک شاخص در شناسایی ارقام

متتحمل می باشد و همانطور که مشاهده می شود این شاخص ژنوتی فی را که دارای عملکرد بالا هستند

را به عنوان هیبرید متحمل شناسایی کرد و می تواند

عنوان یک شاخص مناسب در شناسایی هیبریدهای تحمل معرفی شود (مقدم و هادیزاده). از نظر

\bar{Y}_P = میانگین عملکرد کلیه ژنوتیپ ها در محیط بدون

\bar{Y}_S = میانگین عملکرد کلیه ژنوتیپ ها در محیط تنفس

در این تحقیق از نرم افزارهای Statistica و SAS برای تجزیه اماری داده ها استفاده شد.

یج و بحث

در صد تغیرات، مبنی بر عملکرد و برخی از صفات مربوط به اجزای عملکرد در جدول ارائه شده است. نشان تغییرات مربوط به صفت تعداد دانه در بلال مبتنی بر مجموع و همکاران (Campose *et al.*, 2004) در تحقیقی که برای بهبود تحمل به خشکی در ذرت انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که ذرت در مرحله کل دهی، زمان رشد خامه و گرددهافشانی بیشتر. بترا به خشکی دارد.

کاکل نسبت به ظهرور کل تاجی و نهایتاً افزایش ASI شود و در نتیجه منجر به عدم باروری کلچه ها و تعداد دانه در بلال و نهایتاً، کاهش محصول می شود (Edmeads *et al.*, 1999). همانطور که در جدول شماره آمده است کمترین رات بر اثر تنفس مربوط به عرض دانه است. این موضوع می تواند به این دلیل که با کاهش تعداد دانه در بلال، دانه های مانده با استفاده از آسیمیلات موجود شرایط رشد مناسب تری داشتهند.

کلی مورد نظر با توجه به فرمول های بف شده محاسبه و به همراه مقادیر بنیان گذار

دانه در شرایط نرمال و تنفس در جدول آمده است.

بنیان گذار در شرایط نرمال و تنفس به ترتیب BC504 و BC652 داشتند.

ب کمترین عملکرد NS540 و BC678 را در شرایط نرمال و تنفس داشتند. در شاخص

جدول - بر در میان عملکرد دانه و اجزای آن در شرایط نرمال و تنش خشک

Table 1. Changes in mean of grain yield and its components under normal and drought stress conditions

Trait		درصد تغیرات Variation (%)	نرمال Normal	
			Stress	
Rows/ ear	ردیف دانه در بلال	11.93	13.72	15.58
Kernel/ ear row	دانه در ردیف بلال	38.88	23.36	38.22
Ear diameter	قطر بلال	10.47	3.76	4.20
Kernel No/ear	تعداد دانه در بلال	50.50	292.91	591.11
Kernel depth	عمق دانه	15.03	0.70	0.83
Hectolitre	هکتو لیتر	12.05	612.10	696.00
1000 Kernel Weight	وزن هزار دانه	29.30	146.94	207.84
Kernel diameter	قطر دانه	27.23	3.42	4.70
Kernel width	عرض دانه	9.93	7.31	7.86
(Yield (t/ha)	عملکرد آتن در هکتار	31.72	4.160	6.093

جدول - برآورد شاخص های ذرت به خشک در هی

Table 2. Estimation of drought tolerance indices in grain maize hybrids

Entry	Hybrids	Yp*	Ys	TOL	MP	GMP	SSI	Harm	STI
1	BC582	5.62fheg	4.31gf	1.31	4.96	4.92	0.73	4.87	0.65
2	BC678	4.92j	2.83i	2.09	3.87	3.73	1.34	3.59	0.37
3	BC504	8.35a	5.07b	3.28	6.71	6.50	1.24	6.30	1.14
4	NS540	5.28hi	2.05m	3.23	3.66	3.28	1.93	2.95	0.29
5	BC666	5.79fe	4.38gf	1.41	5.08	5.03	0.76	4.98	0.68
6	BC652	7.28cb	5.60a	1.68	6.44	6.38	0.72	6.33	1.10
7	BC572	5.39hg	3.37k	2.02	4.38	4.26	1.18	4.14	0.49
8	MV502	5.79fe	4.03ih	1.76	4.91	4.83	0.96	4.75	0.63
9	KSC500	5.58fhg	3.29k	2.29	4.43	4.28	1.29	4.13	0.49
10	OSSK499	5.53fhg	4.50ef	1.03	5.01	4.98	0.58	4.96	0.67
11	BC462	5.05ji	4.22gf	0.83	4.63	4.61	0.51	4.59	0.57
12	DSSK444	5.70feg	4.35gf	1.35	5.02	4.98	0.75	4.93	0.67
13	BC404	6.97c	4.61ed	2.36	5.79	5.66	1.06	5.54	0.86
14	BC418	5.96c	4.74cd	1.22	5.35	5.31	0.64	5.28	0.76
15	KSC320	7.39b	4.06ih	3.33	5.72	5.47	1.42	5.24	0.81
16	KSC302	6.96g	4.88cb	2.08	5.92	5.82	0.94	5.73	0.91
17	KSC250	5.67feg	4.31gf	1.36	4.99	4.94	0.75	4.89	0.66
18	KSC260	6.28d	5.00b	1.28	5.64	5.60	0.64	5.56	0.84
19	KSC647	6.59d	3.88ij	2.71	5.23	5.05	1.29	4.88	0.69
20	KSC704	5.54fhg	3.69j	1.85	4.61	4.52	1.05	4.42	0.55

- ی: در هر ستون، که دارای حروف مشابه می باشند، بر اساس آزمون چند دامنه ای دانک در سطح احتمال ۱٪ اختلاف معنی داری ندارند.

Means, in each column, followed by similar letters are not significantly different at the 5% probability level, using Dancan's Multiple Range Test.

Yp = Yield potential Ys = Yield in Stress TOL = Tolerance Index MP = Mean Productivity Harm = Harmonic Mean
GMP = Geometric Mean Productivity SSI = Stress Susceptibility Index STI = Stress Tolerance Index

بنابراین هیبریدهای OSSK499 و BC462 به عنوان مدهای BC678 و NS540 و BC404 ضعیف در شرایط تنش م بودند. ای ۱. گزینش ژنتیک هایی موفق بود، که عملکرد آنها در شرایط تنش بالا بود، ولی در گزینش ژنتیک هایی که در هر دو محیط تنش و بدون تنش دارای عملکرد TOL بودند موفق نبود. در واقع در شاخص نشان دهنده تحمل نسبی هیبریدها می:

ای ۲. آنست که به مقادیر (MP) کمتری دارد (جدول ۲).

ای ۳. در شاخص تحمل TOL، مقادیر عددی پایین در این

شاخص نشان دهنده تحمل نسبی هیبریدها می:

مثبت و معنی داری در سطح Harm احتمال % دارد (جدول ۱) با توجه به اینکه اها با هر دو شرایط تنش و بدون تنش دارای همبستگی بالایی داشتند، می توانند جهت دست یابی به های پر محصول در هر دو شرایط محیطی مورد استفاده قرار کیرند. طبق نظر فرناندز (Fernandez, 1992) هایی که در هر دو محیط تنش و بدون تنش (نرمال) دارای همبستگی بالایی با عملکرد دانه باشند به عنوان بهترین شاخص، زیرا اینها قادر به جداسازی ژنتیک‌هایی با عملکرد دانه بالا در هر دو محیط می‌باشد.

عملکرد دانه در شرایط تنش و شاخص حساس (MP) بود. شاخص بهره وری (SSI) محصول دهنده (GMP) و میزان هارمونیک (STI) در شرایط تنش هم بعد از BC504 داشت، در شرایط تنش هم بعد از BC652 بنابراین عملکرد آن در دو شرایط داشت به عنوان ژنتیک حساس از نظر این شاخص انتخاب شد (جدول ۲).

در شاخص حساسیت به تنش (SSI) اینکه مقادیر عددی پایین در این شاخص نشان دهنده متحمل است، هیریدهای BC462 و OSSK499 به عنوان هم متحمل و دو هم KSC320 به عنوان هم حساس انتخاب شد. در محاسبه این شاخص یک جزء به نام SI شدت تنش وجود دارد که در این تحقیق مقدار آن / بود (جدول ۳). هر چه این جزء بزرگ‌تر باشد SSI کوچکتر می‌شود (مقدم و هادی زاده، ۱۹۹۲). علاوه بر میزان عملکرد هیریدها در شرایط تنش به تغییر یا اسیب وارد به هیریدها در اثر تنش نیز عکس العمل نشان می‌دهد. یعنی اگر هیریدی در هر دو شرایط تنش و بدون تنش دارای عملکرد بالاتری باشد اما درصد تغییر زیادی را نشان دهد به عنوان هیرید متحمل شناسائی نمی‌شود.

فرناندز (Fernandez, 1992) در بررسی عملکرد ژنتیک‌ها در دو محیط تنش و بدون تنش، تظاهر کیاهان نسبت به دو محیط را به چهار گروه تقسیم نموده است:

الف) ژنتیک‌هایی که عملکرد مشابه را در هر دو محیط تنش و بدون تنش دارا هستند (گروه A).

ب) ژنتیک‌هایی که فقط عملکرد خوبی در محیط بدون تنش دارا هستند (گروه B).

تغییر حاصل از شرایط تنش را بیان می‌کند. نکته دیگر در مورد این شاخص آنست که پایین بودن TOL الزاماً به معنی بالا بودن عملکرد در شرایط بدون تنش نیز ممکن است عملکرد یک هم بد در شرایط بدون تنش پایین باشد و در شرایط تنش نیز با افت کمتری همراه باشد، که این باعث کوچک ماندن TOL می‌شود (مقدم و هادی زاده، ۱۹۹۲).

BC504 KSC320 کنترل و NS540 به عنوان هم بد های ضعیف انتخاب شدند (جدول ۴).

BC504 که عملکرد بالا در شرایط نرمال داشت، در شرایط تنش هم بعد از BC652 بنابراین عملکرد آن در دو شرایط داشت به عنوان ژنتیک حساس از نظر این شاخص انتخاب شد (جدول ۵).

در شاخص حساسیت به تنش (SSI) اینکه مقادیر عددی پایین در این شاخص نشان دهنده متحمل است، هیریدهای BC462 و OSSK499 به عنوان هم متحمل و دو هم KSC320 به عنوان هم حساس انتخاب شد. در محاسبه این شاخص یک جزء به نام SI شدت تنش وجود دارد که در این تحقیق مقدار آن / بود (جدول ۶). هر چه این جزء بزرگ‌تر باشد SSI علاوه بر میزان عملکرد هیریدها در شرایط تنش به تغییر یا اسیب وارد به هیریدها در اثر تنش نیز عکس العمل نشان می‌دهد. یعنی اگر هیریدی در هر دو شرایط تنش و بدون تنش دارای عملکرد بالاتری باشد اما درصد تغییر زیادی را نشان دهد به عنوان هیرید متحمل شناسائی نمی‌شود.

BC504 که دارای عملکرد بالا در هر دو شرایط تنش و بدون تنش بود، به علت درصد تغییر زیاد به عنوان (جدول ۷).

عملکرد در شرایط تنش و نرمال با GMP و STI

با توجه به اینکه میزان MP بالای عددی این شاخص نشان دهنده تحمل به تنفس است، هیریدهای BC504 و BC652 به عنوان KSC302 هیریدهای متتحمل شناسایی، . همانطور که در دیده می شود، این هدفها در گروه A قرار (). بنابراین می توان نتیجه گرفت که MP تمایل به گزینش ژنوتیپ هایی با عملکرد بالقوه بالاتر و تحمل به تنفس پایین تر دارد. در شاخص GMP با توجه به اینکه مقادیر عددی بالا نشان دهنده BC504 ژنوتیپی .

KSC302 و BC652 عنوان هیریدهای متتحمل شناسایی MP. بنابراین شاخص GMP در مقایسه با شاخص MP قدرت بالاتری در تفکیک گروه A از سایر گروه ها دارد () همچنین در شاخص Harm از میان BC504 BC652 و KSC302 به عنوان ژنوتیپی .

بدها در گروه A قرار گرفتند. در مورد هدف وجود در گروه A قرار نکرفتند، آن پایین تر بودن عملکرد پتانسیل آنها در مقایسه با بود ().

در شاخص SSI که خطوط کوتاه تر نشاندهنده تحمل است که بر این اساس هیریدهای BC462 و OSSK499 به عنوان هدف متتحمل و دو هدف KSC320 به عنوان هدف حساس انتخاب NS540 شود هدفی .

انتخاب این شاخص در گروه C قرار گرفتند، و هدف KSC320 که در گروه A قرار گرفت واژ نظر این شاخص حساس بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که انتخاب بر اساس SSI سبب گزینش ژنوتیپ هایی با عملکرد پایین در شرایط عادی ولی عملکرد بالا در نتایج SSI قادر به تفکیک و شناسایی .

گروه A از گروه C در شاخص


جاذب ژنوتیپ هایی که عملکرد بالایی را در محیط تنفس دارا هستند (گروه C). ژنوتیپ هایی که عملکرد محصول کم را در دو محیط دارا هستند (گروه D).

به نظر ایشان مناسب ترین معیار انتخاب برای تنفس معیاری است که قادر به تشخیص گروه A از سایر گروه های دیگر باشد.

برای گروه بندی بدها از پلات های X استفاده شد. که در آن عملکرد در محیط بدون تنفس بر روی محور X ها، عملکرد در محیط تنفس بر روی محور Y و یکی از شاخص های انتخاب شده بر روی محور Z ها نمایش داده شد. بن منظور، برای نشان دادن روابط بین این سه متغیر و جدا نمودن ژنوتیپی، گروه A از دیگر گروه (گروه B و C) و همچنین تشخیص سودمندی شاخص مورد نظر بعنوان معیاری برای انتخاب ارقام پر محصول و متتحمل به خشکی سطح x-y به وسیله کشیدن خطوط متقاطع به چهار گروه A, B, C و D (Fernandez, 1992) گرد. . بجز در، هدف ارائه شده است.


با توجه به اینکه مقادیر پایین TOL نشاندهنده تحمل است، هیریدهای BC462 و OSSK499 به عنوان هدف متحمل خط و داشتن TOL به علت عملکرد پایین در شرایط بدون تنفس در گروه A قرار نمی گیرند و در گروه C قرار گرفتند ().

کفت که گزینش بر اساس این شاخص سبب انتخاب ژنوتیپ هایی با عملکرد بالقوه پایین تحت شرایط بدون تنفس و عملکرد بالا تحت شرایط تنفس می شود. در اغلب آزمایش های مقایسه عملکرد، همبستگی میان شاخص های TOL و Yp منفی و همبستگی شاخص های TOL و Ys بنابراین، این شاخص قادر به تفکیک و شناسایی گروه C از A در




- نمودار سه بعدی TOL بر اساس شاخص خشکی متحملی

Fig. 1. 3-D graph for drought tolerance in maize hybrids based on TOL index




-نمودار سه بعدی MP برا اساس خشک به متحملی

Fig. 2. 3-D graph for drought tolerance in maize hybrids based on MP index



-نمودار سه بعدی GMP بر اساس خشکی متحملی


Fig. 3. 3-D graph for drought tolerance in maize hybrids based on GMP index



ی متحمل به خشکی بر اساس

-نمودار سه بعدی


Fig. 4. 3-D graph for drought tolerance in maize hybrids based on SSI index



ی متحمل به خشکی بر اساس

-نمودار سه بعدی


Fig. 5. 3-D graph for drought tolerance in maize hybrids based on Harm index



ی متحمل به خشکی بر اساس

-نمودار سه بعدی

Fig. 6. 3-D graph for drought tolerance in maize hybrids based on STI



دندوکرام حاصل از تجزیه خوشای ذرت بر اساس شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش و عملکرد دانه

Fig. 7. Dendrogram of cluster analysis of maize hybrids based on tolerance and susceptibility indices and grain yield

جمع این گروه اضافه شدند. به این مورد مطالعه در این گروه قرار گرفتند. اگر دارهای سه بعدی که در نمودارهای رسم شده اند مراجعه شود، مشاهده می‌شود هم‌ای فوچ در گروه C قرار گرفتند. این گروه از نظر اختصاص دادند، به دلیل عملکرد پایین در شرایط بدون تنش و عملکرد بالا در شرایط تنش، این گروه بر اساس فرناندز در گروه C قرار گرفتند).

مشاهده می‌شود هم‌ای قرار گرفتند. با مراجعه به نمودارهای این گروه، در دسته D به این گروه، در دسته بندی فرناندز (Fernandez, 1992) ای (عملکرد پایین در هر دو شرایط بدون تنش و تنش) قرار گرفتند. و در اکثر موارد، هیبریدهای این گروه از لحاظ دو شاخص‌های SSI و TOL و KSC500 در BC572 و BC678 NS540 در KSC504 و BC504 در KSC302 بودند.

گروه بعد شامل KSC302 BC404 BC652 BC504 KSC647 و KSC320 بودند. این گروه از نظر رتبه‌های GMP و MP Harm STI را در یاری داشتند و همچنین از نظر عملکرد دانه، می‌دانند. این گروه نسبت به سایر

STI که خطوط بلندتر نشانده‌اند تحمل است، هیبریدهای BC504 و BC652 وان KSC302. این شاخص توانست همه هیبریدهای که دارای عملکرد بالادر شرایط تنش بودند را به عنوان هیبرید متتحمل شناسایی کدو همکار در گروه A قرار گرفتند.

BC678 و NS540 بدنهای ضعیف در شرایط تنش باشند، که در گروه D قرار گرفتند. بنابراین طبق که فرناندز (Fernandez, 1992) بزرگزارش کرد، قادر به تفکیک و شناسایی ژنتیکی STI

از گروه A و B بود ().

ی ارز. مورد مطالعه در شرایط نرمال و تنش، جهت شناسایی گروه‌های ژنتیک مختلف به دسته بندی داده در گروه‌های مشابه از روش کلاستر بندی بزرگ استفاده شد ().

همانطور که در این مشاهده می‌شود، با بررسی از نقطه تشابه / می‌موجودد به سه گروه با تشابه‌ای درون گروه بالا و برون گروه.

گروه بک شامل ژنتیکی KSC250 BC582 و BC462 OSSK499 BC666 DSSK444 دو هم‌ای MV502 و KSC704 به جمع این گروه اضافه شده، و در نهایت دو هم‌ای KSC260 و BC418 باشد که

و STI Harm MP های

بل عملکرد هر بدھا در شرایط نرمال و تنفس، هر بدھا BC504 و BC652 را به عنوان ی متحمل و هر بدھا NS540 و BC678 را حساس شناسائی کردند. با توجه به این نمودارها تقریباً توانی تفکیک هیریدها توسط این بودند. با بررسی نتایج فوق متوجه می‌توانیم KSC302 BC404 BC652 BC504 بدھا KSC647 و KSC320 به عنوان هیریدها متحمل معرفی کرد.

کروههای بیشتر بود ().

و بر اساس نمودارهای قرار می‌گیرد که شاخص STI Harm MP مشاهده می‌شود که شاخص GMP که مقادیر آنها نشان دهنده هیریدها است در گروه A قرار می‌گیرد. عملکرد هر بدھا در شرایط نرمال و BC504 و BC652 را به عنوان ی متحمل و هر بدھا NS540 و BC678 را حساس شناسائی کردند. بررسی فوق نشان می‌دهد که هر بدھا BC404 BC652 BC504 KSC647 و KSC320 به عنوان ژنوتیپ‌های

جدول ۳ - مختلف متتحمل به تنفس و میزان عملکرد در دو شرایط نرمال و تنفس رطوبت

Table 3. Correlation between different drought tolerance indices and grain yield under normal and drought

	stress conditions							
	YP	YS	TOL	MP	GMP	SSI	HARM	STI
YP	1							
YS	0.61**	1						
TOL	0.51*	-0.35 ns	1					
MP	0.90**	0.89**	0.10 ns	1				
GMP	0.85**	0.93**	0.0016	0.99**	1			
SSI	-0.09 ns	-0.71**	0.89**	-0.32 ns	-0.42 ns	1		
HARM	0.80**	0.96**	-0.091	0.97**	0.99**	-0.50*	1	
STI	0.88**	0.90**	0.063 ns	0.99**	0.99**	-0.36 ns	0.98**	1

* و **: دار در سطح اختصاری (%) و %

* and ** : Significant at 5% and 1% levels of probability , respectively.

ns: غیر معنی دار

ns: Non-Significant

References

منابع مورد استفاده

- مقدم، کاظمی، مقدم، و مقدم. ۱۴. ارزیابی مقاومت به خشکی در مراحل مختلف رشد ژنوتیپ، دیر رس ذرت. بن کنکره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران رشت. ص ۱۰۰-۱۰۵. العمل هیریدهای ذرت و لاین‌های والدی انها به خشکی با استفاده از شاخص‌های مقدم، ع. و هادی زاده. مجله نهال بذر، ۲۰۰۷: ۱-۶.
- بان، م. ح، غدیر، کامکار حق. بر تنفس رطوبت و نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و راندمان استفاده از آب در ذرت دانه ای. بن کنکره زراعت و اصلاح نباتات ایران. ۱۴(۱): ۱-۱۶.
- Cakir. R. 2004. Effect of water stress at different development stage on vegetative and reproductive growth of corn. Field Crops Res. 89(1):1-16.
- Campos. H., Cooper. M. , Habben. J.E and J. R. Schussler. 2004. Improving drought tolerance in maize: a

view from industry. *Field Crops Res.* 90 (1): 19-34.

Edmeads, G. O. J. Bolanas. J. and , H. R. Laffitte. 1990. Selection for drought tolerance in maize adapted to the lowland tropics. Mexico D. F., Mexico, CIMMYT.

Fernandez, G. C. 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In: Proceeding of a Symposium, Taiwan, 13-18 Aug. Chapter 25. pp. 257-270.

Fischer. R. A. and R. Maurer 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain Yield responses. *Australian J. Agri. Res.* 29:897-912.

Larson , E. J. and M. O. Clegg. 1999. Using corn maturity to maintain grain yield in the presence of late season drought. *Journal of Production Agriculture.* 12(3): 400-405.

Rosielle. A. A., and J. Hamblin. 1981. Theoretical aspects of selection for yield in stress and non-stress environments. *Crop Sci.* 21: 943- 946.

Study of selection indices for drought tolerance in some of grain maize hybrids

Jafari, A¹., R. Choukan², F. Paknejad³ and A. Pourmaidani⁴

ABSTRACT

Jafari, A., R. Choukan, F. Paknejad and A. Pourmaidani. 2007. Study of selection indices for drought tolerance in some of grain maize hybrids. *Iranian Journal of Crop Sciences*. 9(3): 200-212.

To study the drought tolerance in some of grain maize hybrids, this study was carried out in Qom province in 2006 cropping season. Twenty maize hybrids were evaluated in randomized complete block design with four replications , in two separate experiments, under normal irrigation(30% depletion of available water) and drought stress (60% depletion of available water). Results of analysis of variance for grain yield and its components showed variation among hybrids under normal and drought stress conditions. The highest yield under normal and stress conditions belonged to hybrids BC504 and BC652, respectively. While, hybrids BC678 and NS504 showed the lowest yield under normal and stress conditions, respectively. To evaluating the response of hybrids to drought stress, different indices, including, Stress Susceptibility Indices (SSI), Harmonic mean (Harm), Tolerance index (TOL), Mean Productivity (MP), Stress Tolerance Index (STI) and Geometric Mean Productivity (GMP) were used. Different indices revealed hybrids BC504 , BC652 , BC404 , KSC302 , KSC320 and KSC647 as tolerance under stress condition. STI , MP , GMP and Harm indices, were identified as suitable indices to be used in applied maize breeding programs. These indices showed the highest correlation between grain yield under normal and drought stress conditions.

Key words : Maize, Hybrid , Drought stress, Normal condition, Tolerance indices, Grain yield

Received: September, 2007.

1- Former M.Sc. Student, Islamic Azad University, Karaj Unit, Karaj, Iran.

2- Faculty member, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran (Corresponding author).

3- Faculty member, Islamic Azad University, Karaj Unit, Karaj, Iran.

4- Faculty member, Agriculture and Natural Research Center of Qom Province, Qom, Iran.