

*(Brassica napus)*

**Study of effects genetotype and date of sowing on quantitative and qualitative traits in Canola (*Brassica napus*) in Bushehr provience**

نرجس کازرانی<sup>۱</sup> و محمد رضا احمدی<sup>۲</sup>

(Strip Plot)

(Tower)	(Regent)	(Global)	:	(Maluka)	PF	/	PF	/
/	/	/ / :						/ /
(First pod height)				(Plant height)				(Grain yield)
		%						
				(Oil yield)				(%Oil content)
		%						
			/	PF	/	PF	/	
( r= / )								%

تحقیقات به نژادی و به زراعی آن از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و با انتخاب و مقایسه عوامل مناسب می توان عملکرد کمی و کیفی آن را افزایش داد و به ارقام متناسب با شرایط اقلیمی مورد نظر دست یافت. تعیین تاریخ کاشت کلزا در هر منطقه نیز با توجه به رقم و شرایط اقلیمی منطقه صورت می پذیرد. به طور کلی هدف از تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت، پیدا نمودن

صرف روغن نباتی به دلیل بالا رفتن سطح زندگی، افزایش جمعیت و رعایت بهداشت در صنعت آن رو به افزایش است. کلزا یکی از مهم ترین گیاهان روغنی جهان است که کشت آن به ویژه در مناطق معتدل رو به افزایش است و نقش قابل توجهی در تأمین روغن های خوراکی انسان دارد. با توجه به اهمیت گیاه روغنی کلزا،

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۳/۵/۱۵

۲- عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- کرج

۱- کارشناس دانه های روغنی مرکز تحقیقات کشاورزی (برازجان)

تاریخ دریافت: ۱۳۸۰/۱۲/۵

عملکرد ۹ رقم کلزا و خردل در دهی نو اظهار کردنده که تاریخ کاشت اواسط ماه اکتبر، جمعیت شته را به کمترین میزان ممکن کاهش داد و سبب افزایش عملکرد دانه گردید و به عبارت دیگر عملکرد محصول با جمعیت آفت رابطه عکس داشت.

پرادهان (Pradhan et al., 1997) و همکاران اثر تاریخ کاشت را بر روی عملکرد کلزا در هند بررسی نمودند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان عملکرد دانه در بیست و پنجم ماه اکتبر حاصل شد.

گوش و همکاران (Ghosh et al., 1997) با بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد دانه شلغم روغنی رقم بینوکس (Binox) بعد از برداشت برنج در هند، اظهار نمودند، که تاریخ کاشت بعد از ۱۶ اکتبر، عملکرد محصول را کاهش داد. ایوانووا و همکاران (Ivanova et al., 1995) طی آزمایشی اثر تاریخ کاشت و میزان بذر بر روی خواص کمی و کیفی کلزای علوفه‌ای رقم اسیک ۳ (Osiek 3) مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفتند که بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت اوخر اوت و با میزان بذر مصرفی ۱۲ کیلوگرم در هکتار حاصل شد.

بختیار و همکاران (Bakhtiar et al., 1992) در آزمایشی اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد دانه ارقام خردل، شلغم روغنی و کلزا مورد بررسی قرار داده و اظهار داشتند که رقم کلزا در تاریخ کاشت اوخر سپتامبر با ۱۵۱۸ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را نشان داد.

لتو (Leto) و کاروبوا (Carruba, 1995) با بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی مراحل فنولژی و عملکرد دانه ارقام کلزا پائیزه و بهاره نتیجه گرفتند، که بیشترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت ۲۵ نوامبر برای ارقام پائیزه بود.

نتایج آزمایش‌های داخل و خارج از کشور نشان داد که کشت به موقع و رقم مناسب، مؤثرترین عوامل در افزایش عملکرد و اجزای آن می‌باشد. بنابراین هدف از

زمانی است که در مجموع عوامل اقلیمی برای کلیه مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه مناسب بوده و به عبارتی دیگر هر مرحله از رشد گیاه کمتر با شرایط نامساعد محیطی مواجه شود.

کشت کلزا برای اولین بار در سال ۱۳۷۳ به منظور بررسی سازگاری و آشنایی با صفات فنولژیک و مورفو‌لوزیک در مرکز تحقیقات کشاورزی برازجان و ایستگاه تحقیقات خرما واقع در شبانکاره با دورقم تاور (Tower) و رجنت (Regent) انجام شد. از آن سال به بعد ارقام دیگری چون Pf ۷۰۴۵/۹۱، کرج -۱۶ و گلوکسینیا در زمان‌های مختلف کاشت در فصول پاییز و

زمستان مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین قطعات کوچکی به منظور تکثیر مقدماتی ارقام کلزا نیز مورد استفاده واقع شدند. نتایج این آزمایش‌ها نشان داد که ارقام بهاره کلزا به ویژه رقم PF ۷۰۴۵/۹۱ سازگار با شرایط اقلیمی استان بود و تاریخ کاشت اوخر مهرماه تا اوایل آبان ماه کمترین مشکلات زراعی را داشته است.

شیرانی راد و احمدی (۱۳۷۴) اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی دو رقم کلزای سرز و بلیندا را در کرج بررسی نمودند. در این تحقیق مشخص گردید که تاریخ کاشت دیرهنگام سبب کاهش صفاتی چون ارتفاع بوته و وزن ماده خشک، میزان رشد و عملکرد دانه می‌شود.

کوچ تتو (Kuchtovo) و واسک (Vasak, 1998) با بررسی اثر تاریخ کاشت بر رقم پائیزه لیراجت (Lirajet) اظهار نمودند که کاشت دیرهنگام سبب کاهش تعداد غنچه و کپسول می‌شود. کانچان و همکاران (Kanechan et al., 1998) با بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد ارقام کلزا و خردل در هند نتیجه گرفتند که تاریخ کاشت ۱۵ نوامبر، بیشترین عملکرد دانه و کمترین خسارت شته را داشت. فادک (Phaake) و پراساد (Prasad, 1987) در تحقیق دیگری بر روی

۲۱ درجه و ۲ دقیقه در قطعه زمینی به مساحت ۱۳۵۰ مترمربع که در سال قبل آیش بوده اجرا گردید. میانگین بارندگی سالیانه در این منطقه ۳۰۰-۳۵۰ میلی متر، حداکثر دمای آن ۵۱ درجه سانتیگراد در مردادماه و حداقل دمای آن -۱ درجه سانتیگراد در بهمن ماه می باشد. آمار هواشناسی ایستگاه در جدول شماره ۱-ب و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی در جدول شماره ۱-الف ارایه شده است.

این تحقیق، انتخاب تاریخ کاشت و رقم مناسب کلزا در منطقه است تا تولید کنندگان محلی بتوانند محصولی با کمیت و کیفیت مناسب تولید نموده و در نهایت درآمد بیشتری نصیب آنها شود.

این آزمایش در سال زراعی ۱۳۷۶-۷۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی استان بوشهر واقع در نه کیلومتری جنوب شرقی شهر برازجان با ارتفاع ۱۱۰ متر از سطح دریا و طول شرقی ۵۱ درجه و ۱۷ دقیقه و عرض شمالی

### جدول ۱-الف- برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی

Table 1a. Physical and chemica characteristics of soil of the experimental farm

اسیدیته pH	هدایت الکتریکی EC	فسفر P(ppm)	پتاسیم K(ppm)	درصد مواد آلی C %
7.3	4.33	3.5	155	0.052

### جدول ۱-ب- میانگین آمار هواشناسی برازجان در سال زراعی ۱۳۷۶-۷۷

Table 1b. Climatical conditions of Borazjan (1997-98)

Months	ماه	دما		رطوبت نسبی		بارندگی Rainfall (mm)	حداقل دمای زمین Min. temp. of soil °C
		Temp. °C	RH %	Max.	Min.		
Sept.22- Oct.21	مهر	40	23.3	48.3	22.1	2	14.55
Oct.22- Nov.20	آبان	26.5	17.36	77.7	55	101.9	13.5
Nov.21- Dec.20	آذر	22.5	12.55	85	65	140.5	-
Dec.21- Jan.19	دی	17.7	6.64	90.2	69.5	144.5	3.2
Jan.20- Feb.18	بهمن	21.9	9.4	82.5	59.7	109.5	8.9
Feb.19- Mar.20	اسفند	23.9	9.9	81	51.1	26.5	7.5
Mar.21- Apr.19	فروردين	33.2	15.1	70	40.6	19.5	15.4
Apr.20-May.20	اردیبهشت	39.8	19.59	51.4	20.7	-	19.8
May.21-Jun.20	خرداد	45	25.33	36.83	16.9	-	24.22

\* دما نسخ تا ۲۰ دی ماه خراب بود.

تاریخ کاشت (D) شامل ۴ تاریخ کاشت: ۷۶/۷/۳۰، ۷۶/۸/۱۵ و ۷۶/۹/۱۵ در ستون افقی قرار گرفتند.

پس از انتخاب زمین، شخم مجدد، تسطیح زمین، ایجاد جوی پشته و آبیاری قبل از کاشت در تاریخ های موردنظر، بذرها با قارچ کش (مانکوزب ۱ در هزار) ضد عفونی گردیده و کشت شدند. مقادیر کودهای مصرفی شامل: ۱۵ تن در هکتار کود دامی و ۹۲ کیلو گرم

در این آزمایش از طرح کرت های نواری (strip plot) در پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار استفاده شد. هر واحد آزمایشی شامل ۴ خط ۳ متری با فاصله بین ردیف ۵۰ سانتیمتر و فاصله بوته ۱۰ سانتیمتر بود. عوامل مورد بررسی عبارت بودند از: عامل رقم (V) شامل ۶ رقم کلزای بهاره به اسامی گلوبال (Global)، رجنت (Regent)، Tower (Tower)، PFV۰۴۵/۹۱، Maluka (Maluka) در ستون عمودی، عامل

تجزیه واریانس اطلاعات حاصل از اندازه‌گیری صفات عملکرد دانه، درصد روغن دانه، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، ارتفاع اولین کپسول و عملکرد روغن نشان داد که عملکرد دانه شدیداً تحت تأثیر تاریخ کاشت، رقم و اثرات متقابل آنها بود و بین تاریخ‌های کاشت و ارقام از نظر صفات مذکور تفاوت معنی‌داری در سطح ۱ درصد مشاهده شد (جدول ۲).

مقایسه میانگین عملکرد تیمارها با استفاده از آزمون چندامنه‌ای دانکن نشان داد که ارقام  $PFV_{45/91}$  و  $PFV_{45/88}$  به ترتیب با ۲۰۱۰ و ۱۸۴۰ کیلوگرم در هکتار، بیشترین میانگین عملکرد دانه را در تاریخ کاشت اول (۳۰ مهرماه) داشتند. و کمترین عملکرد دانه را رقم رجنت با ۷۳۰ کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت چهارم (۱۵ آذرماه) نشان داد (جدول ۴) و به عبارت دیگر کشت دیرهنگام با کاهش عملکرد دانه همراه بود که این مسئله با نتایج شیرانی راد و احمدی (۱۳۷۴) هماهنگی دارد. وزن هزار دانه در تاریخ‌های کاشت و ارقام مختلف تغییرات جزیی و ناچیزی داشت و اختلاف معنی‌داری بین تیمارها مشاهده نگردید. چون تفاوت بین تیمارها به گونه‌ای بود که اجزاء عملکرد بر یکدیگر اثر گذاشته و در نهایت بر عملکرد دانه تأثیری نداشت. به هر صورت ارقام گلوبال و تاوار به ترتیب با  $\frac{3}{5}$  و  $\frac{2}{6}$  گرم بیشترین و کمترین وزن هزار دانه را داشتند. بین ارقام و تاریخ‌های مختلف کاشت از نظر درصد روغن تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال ۵٪ مشاهده شد (جدول ۲).

مقایسه میانگین‌ها نشان داد که بیشترین درصد روغن را در بین ارقام، رقم ریجنت با ۴۲٪ داشت (جدول ۳) و همین درصد روغن در تاریخ کاشت ۱۵ آبان ماه حاصل شد و کمترین مقدار درصد روغن در تاریخ کاشت ۳۰ مهرماه حاصل شد (جدول ۴) علت کاهش درصد روغن در تاریخ کاشت مذکور را می‌توان ناشی از رطوبت فراوان حاصل از بارندگی زیاد در سال آزمایش دانست و این مسئله با نتایج تحقیقات کنل و

در هکتار ( $P_2O_5$ ) از منبع کودی فسفات آمونیم، ۷۵ کیلوگرم در هکتار از خالص (N) به صورت کود اوره و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار (K<sub>2</sub>O) به شکل سولفات پتانسیم بود. نحوه کوددهی به صورت ساندویچی بود یعنی ابتدا کف جوی‌ها را در آورده و نیمی از کود حیوانی را در آن‌ها ریخته و پس از افزودن کودهای فسفاته و پتاسه و  $\frac{1}{3}$  کود ازته، نیمه دیگر کود حیوانی را در آن‌ها ریخته و پس از افزودن کودهای فسفاته و پتاسه و  $\frac{1}{3}$  کود ازته، نیمه دیگر کود حیوانی همراه با خاک بر روی آن‌ها ریخته شد و آبیاری گردید.  $\frac{2}{3}$  باقی مانده کود ازته را در زمان ساقده‌یی و گلدهی به صورت سرک به تیمارها داده شد.

به علت بارندگی فراوان (۶۲۰ میلیمتر) در سال آزمایش هر تاریخ کاشت در تمام مراحل رشد خود، تنها ۴-۳ بار آن هم در زمان گلدهی آبیاری گردیدند.

برای مبارزه با علف‌های هرز تاریخ‌های کاشت اول و دوم هر کدام یک بار و تاریخ‌های کاشت سوم و چهارم دو تا سه بار و جین گردیدند. برای مبارزه با آفت شته سیاه در مرحله کپسولدهی از سم سیستمیک متاسیستوکس به نسبت یک در هزار استفاده شد.

برای تعیین صفاتی از قبیل تعداد شاخه فرعی در بوته و ارتفاع بوته و ارتفاع اولین کپسول ۱۰ بوته از دو خط میانی به طور تصادفی انتخاب گردید و صفات مذکور در آن‌ها اندازه‌گیری شد. پس از حذف ۲۵ سانتیمتر از ابتدا و انتهای دو خط میانی و مساحت هر کرت برداشت به  $\frac{2}{5}$  مترمربع محدود گردید.

محاسبات آماری بر روی عملکرد دانه، تعداد شاخه فرعی در بوته، ارتفاع بوته، ارتفاع اولین کپسول از سطح زمین، وزن هزار دانه، درصد روغن و عملکرد روغن در هکتار انجام شد و برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون دانکن در سطح ۵ درصد استفاده گردید هم‌چنین همبستگی ساده بین صفات مورد آزمون محاسبه شد.

عملکرد روغن دانه در سطح ۱ درصد معنی‌دارشد (جدول ۲) مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین متوسط عملکرد روغن دانه مربوط به رقم PF ۷۰۴۵/۹۱ با ۸۰۹/۲ کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت اول و کمترین مقدار ناشی از رقم رجت با ۳۱۹/۵ کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت چهارم بود (جدول ۵) از آن جا که عملکرد روغن از حاصل ضرب عملکرد دانه و درصد روغن به دست می‌آید و با توجه به آن که تفاوت درصد روغن ارقام کلزای مورد مطالعه بسیار ناچیز بود (جدول ۳) می‌توان با انتخاب ارقام پرمحصول در تاریخ کاشت مناسب، عملکرد روغن بیشتری در واحد سطح تولید نمود. نتایج حاصل همچنین نشان داد که عملکرد دانه با عملکرد روغن، ارتفاع بوته و ارتفاع اولین کپسول از سطح زمین همبستگی مثبت و معنی‌داری در سطح احتمال ۱٪ داشت به طوری که عملکرد دانه با عملکرد روغن بیشترین همبستگی ( $r=0.99$ ) با ارتفاع بوته همبستگی متوسط ( $r=0.471$ ) و با ارتفاع اولین کپسول از سطح زمین همبستگی ضعیف ( $r=0.345$ ) و باسایر صفات همبستگی معنی‌داری نشان نداد (جدول ۷). بنابراین با روش‌های مدیریت زراعی نظری تاریخ کاشت و رقم مناسب می‌توان تغییراتی در متغیرهای مستقل در جهت بهبود افزایش عملکرد دانه به وجود آورد.

نتایج جدول ۴ نشان‌دهنده اثر تاریخ کاشت بر مراحل فنولوژیک و مورفو‌فنولوژیک ارقام مختلف می‌باشد. به طوری که دوره گل‌دهی رقم زودرس مالوکا در تاریخ کاشت اول (۳۰ مهر)، ۷۱ روز و در تاریخ کاشت چهارم (۱۵ آذرماه) به ۲۳ روز کاهش یافت. بیشترین دوره رویش در تاریخ کاشت اول، ۱۷۷، روز و کمترین دوره رویش در تاریخ کاشت چهارم ۱۲۸ روز بود. بیشترین ارتفاع بوته در تاریخ کاشت اول با ۲۱۳ سانتی‌متر متعلق به رقم گلوبال و کمترین ارتفاع بوته نیز مربوط به رقم مذکور در تاریخ کاشت چهارم با ۱۲۸ سانتی‌متر بود در این بررسی رقم گلوبال با دوره رویش ۱۷۷، روز

بلفورد (Cannel & Belford, 1980) هماهنگی دارد. ارتفاع بوته شدیداً تحت تأثیر تاریخ کاشت و رقم بوته طوری که اثر تاریخ کاشت بر این صفت در سطح احتمال ۱٪ و اثر رقم بر آن در سطح احتمال ۰.۵٪ معنی‌دار شد. ارتفاع بوته رقم گلوبال در تاریخ کاشت اول (۳۰ مهر) ۲۱۲/۵ سانتی‌متر و در تاریخ کاشت چهارم (۱۵ آذرماه) ۱۲۷/۵ سانتی‌متر بود. این تغییرات حاکی از آن است که کاشت دیرهنگام سبب کاهش ارتفاع بوته می‌شود. زیرا دوره رویش گیاه در تاریخ کاشت اول از عوامل مساعد مثل شرایط مطلوب تشبع، دما و رطوبت برخوردار بوده ولی در کشت دیرهنگام (۱۵ آذرماه) به علت افزایش دما و تنفس رطوبت در آخر فصل رویش، گیاه از رشد نامطلوبی برخوردار بوده، به طوری که باعث کاهش ارتفاع بوته و کوتاه شدن طول ساقه گردید و این مسئله با تحقیقات شیرانی‌راد و احمدی (۱۳۷۴) مطابقت دارد. اثر تاریخ‌های مختلف کاشت و ارقام بر ارتفاع اولین کپسول نیز به ترتیب در سطح احتمال ۱٪ و ۰.۵٪ درصد معنی‌دار گردید (جدول ۲) به طوری که متوسط ارتفاع اولین کپسول از سطح زمین در تاریخ کاشت اول (۳۰ مهر)، ۱۳۲/۲ سانتی‌متر و در تاریخ کاشت چهارم (۱۵ آذرماه)، ۸۱/۲۹ سانتی‌متر بود. بین تاریخ‌های مختلف کاشت از نظر اثر بر تعداد شاخه فرعی در بوته تفاوت معنی‌داری در سطح ۰.۵٪ مشاهده شد، ولی این صفت در ارقام مختلف مورد آزمایش معنی‌دار نگردید و میانگین تعداد شاخه فرعی در بوته بین ۵/۰-۹/۰ عدد بود. بیشترین تعداد شاخه فرعی در بوته در تاریخ کاشت ۳۰ مهر تا ۱۵ آبان بود، علت این امر را می‌توان ناشی از رشد گیاه در شرایط مطلوب محیطی دانست، هر چند که افزایش تعداد شاخه فرعی در بوته باعث تأخیر در رسیدگی محصول گردیده و در برداشت مکانیزه مشکلاتی را به وجود آورد. بنابراین علاوه بر دست یابی به تاریخ کاشت مناسب باید تراکم بوته آن را نیز مدنظر داشت. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر



**Table 2. Simple analysis of some traits of rapeseed cultivars in Borazjan area**

میانگین مربuat

S. O. V	df	Grain yield	1000 SW	Oil %	Plant height	No. of sub branch	The height of first pod	Oil yield
Rep (R)	3	119075.983**	0.166 <sup>ns</sup>	1.486 <sup>ns</sup>	413.288 <sup>ns</sup>	0.942 <sup>ns</sup>	141.222 <sup>ns</sup>	202736.306**
Date (D)	3	1104090.583**	0.301 <sup>ns</sup>	10.326*	17133.705**	10.472*	13923.444**	162787.258**
Error (a)	9	14697.946	0.213	0.939	224.233	2.147	170.019	2770.888
Variety (V)	5	118712.760**	0.057 <sup>ns</sup>	3.184*	212.894*	1.889 <sup>ns</sup>	72.06*	19361.955**
Error (b)	15	12788.316	0.177	0.831	64.722	1.689	120.256	2160.918
V×D	15	214195.538**	0.202*	0.756**	361.872 <sup>ns</sup>	2.961*	323.944*	37810.918**
Error (c)	45	18256.279	0.102	1.070	204.788	1.353	167.163	3391.553
C. V.		11/27%	10/49%	2/49%	8/75%	16/94%	12/86%	11/72%

ns, \* and \*\* : Non significant, significant at the 5 and 1% levels of probability respectively.

. % %

: \*\* \* ns



ارتفاع بوته، ارتفاع اولین کپسول از سطح زمین و تعداد کپسول در بوته کاهش می‌یابد. این موضوع با تحقیقات شیرانی راد و احمدی (۱۳۷۴) مطابقت دارد. موریسون و همکاران (Morrison et al., 1998) در مورد کشت دیرهنجام گیاه کلزا چنین اظهار داشتند که افزایش دما و تنفس آب در مرحله گرده‌افشانی، موجب عقیمی گلچه‌ها شده و بر تلقیح اثر می‌گذارد و فرآیند گل‌دهی در اثر دمای زیاد تسريع و کوتاه شده و در نهایت منجر به افت عملکرد می‌شود. مندهام و همکاران

دیررس ترین و رقم مالوکا با دوره رویش ۱۵۳، روز زودرس ترین رقم شناخته شدند.

به طور کلی در کشت دیرهنجام به علت سردی هوا جوانهزنی بذر به تعویق افتاده و بذر مورد حمله پرندگان، حشرات و علف‌های هرز قرار گرفته و در نتیجه درصد سبز مزرعه کاهش می‌یابد. از طرفی دوره روزت و نمو رویشی گیاه کوتاه شده و به علت ناکافی بودن مرحله رشد رویشی، با ایجاد یک روزت ضعیف وارد فاز زایشی شده به طوری که تعداد شاخه فرعی در بوته،

#### جدول ۳- مقایسه میانگین برخی از صفات کلزا در ارقام مورد آزمایش

Table 3. Comparison of mean of some of traits of rapeseed in experiment

ارقام Varieties	عملکرد دانه Seed yield (kg/ ha)	درصد روغن Oil content (%)	متوسط روغن Oil yield (kg/ ha)
Global	1184 a	41.2 a	4.95 bc
Regent	1088 b	42.20 a	457.3 c
Tower	1204 bc	41.2 a	495.98 bc
PF 7045.91	1265 c	41.73 a	524.4 ab
PF 5045.88	1373 c	41.28 a	547.6 a
Maluka	1130 c	42.08 a	462.3 c

میانگین‌هایی که در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، فاقد اختلاف معنی دار در سطح ۵٪ بر اساس آزمون دانکن می‌باشند.

Means in each column having similar letter (s), are not significantly different at the 5% level (DMR-Test)

#### جدول ۴- مقایسه میانگین برخی از صفات کلزا در تاریخ‌های مختلف کاشت

Table 4. Comparison mean of some traits of rapeseed in different sowing date

تاریخ کاشت Planting date	عملکرد دانه Seed yield (kg/ ha)	درصد روغن Oil content (%)	عملکرد روغن Oil yield (kg/ ha)
Oct. 20 <sup>th</sup> , 1997	مهر ماه ۳۰	1509 a	40.63 a
Nov. 6 <sup>th</sup> , 1997	آبان ماه ۱۵	1163 b	42.20 a
Nov. 21 <sup>th</sup> , 1997	آبان ماه ۳۰	1098 c	41.54 a
Dec. 6 <sup>th</sup> , 1997	آذر ماه ۱۵	1025 d	41.73 a

میانگین‌هایی که در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، فاقد اختلاف معنی دار در سطح ۵٪ بر اساس آزمون دانکن می‌باشند.

Means in each column having similar letter (s), are not significantly different at the 5% level (DMR-Test)

### جدول ۵- مقایسه میانگین اثر متقابل رقمه و تاریخ کاشت بر روی برحی از صفات کلزا

Table 5. Mean comparison the interaction of sowing date and variety effect on some traits of colza

تاریخ کاشت Date of planting	ارقام Varieties	وزن هزار دانه 1000 seed weight (g)	درصد روغن Oil %	عملکرد روغن Oil yield (kg/ha)	عملکرد دانه Seed yield (kg/ha)
Oct.20 th, 1997	Global	2.95 bc	43.28 ab	564.8 bd	1305 bc
	Regent	3 ab	39.75 h	484.9 bc	1230 bc
	Tower	3.2 ab	40.75 ef	578.65 b	1420 bc
	PF 7045/91	2.8 bc	40.25 fg	809.2 a	2010 a
	PF 5045/88	3.3 ab	41.86 bc	770.22 a	1840 a
	Maluka	3.2 ab	37.9 I	477.54 cd	1260 bc
	Global	2.9 bc	39.95 gh	531.5 bc	1330 bc
	Regent	2.85 bc	43.03 ab	529.2 bc	1230 bc
	Tower	2.65 d	41.3 cd	516.2 bc	1250 bc
Nov. 6 <sup>th</sup> , 1997	PF 7045/91	2.8 bc	43.6 a	470.88 cd	1080 cd
	PF 5045/88	3.1 ab	41.60 bc	470.08 cd	1130 bc
	Maluka	2.9 bc	43.7 a	419.5 ef	960 ef
	Global	2.9 bc	42.78 bc	534.75 bc	1250 bc
	Regent	3 ab	42.63 ab	499.77 bc	1170 bc
	Tower	3 ab	39.97 gh	405.69 bc	1015 de
	PF 7045/91	3.2 ab	42.60 ab	405.2 fg	951.3 fg
	PF 5045/88	2.85 bc	40.03 gh	396.2 gh	990 ef
	Maluka	3.2 ab	42.25 ab	511.2 bc	1210 bc
Nov. 21 <sup>th</sup> , 1997	Global	3.5 a	41.22 dc	350.3 hi	850 gh
	Regent	3.05 abc	43.74 a	319 I	730 h
	Tower	3.1 abc	42.78 ab	483.4 bc	1130 bc
	PF 7045/91	3.1 abc	40.4 fg	412.7 fg	1020 de
	PF 5045/88	2.75 cd	41.65 bc	553.94 bc	1330 bc
	Maluka	3.2 abc	40.47 fg	441.1 de	1090 cd
	Global	3.5 a	41.22 dc	350.3 hi	850 gh
	Regent	3.05 abc	43.74 a	319 I	730 h
	Tower	3.1 abc	42.78 ab	483.4 bc	1130 bc
Dec,6 <sup>th</sup> ,1997	PF 7045/91	3.1 abc	40.4 fg	412.7 fg	1020 de
	PF 5045/88	2.75 cd	41.65 bc	553.94 bc	1330 bc
	Maluka	3.2 abc	40.47 fg	441.1 de	1090 cd

میانگین‌هایی که در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، فقد اختلاف معنی دار در سطح ۵٪ بر اساس آزمون دانکن می‌باشند.

Means in each column having similar letter (s), are not significantly different at the 5% level (DMR-Test)

## جدول ۶- مقایسه میانگین اثرباره کاشت بر روی برخی صفات فنولوژیکی و مورفولوژیکی کلزا

Table 6. Effect of different planting date on phenological and morphological characteristics of rapeseed cultivars

تاریخ کاشت Date of planting	ارقام Varieties	دوره گل دهی Fl. date (days)	شروع کپسول دهی Br. Phase (days)	دوره روسیش Veg. phase (days)	ارتفاع بوته Pl. height (cm)	تعداد شاخه فرعی در بوته No. of s.br.	ارتفاع اولین کپسول از سطح زمین First p. height (cm)
Oct. 20 <sup>th</sup> , 1997	Global	47	11.12	177	213	7	141.3
	Regent	32	11.9	175	203	8	141.8
۳۰-مهر ماه	Tower	49	11.7	175	194	8	128
Nov. 6 <sup>th</sup> , 1997	PF 7045.91	49	11.8	175	184	7	112
	PF 5045.88	48	11.10	175	188	6	120
	Maluka	71	11.2	153	199	8	150.3
۱۵-آبان ماه	Global	47	11.28	165	153	8	97.25
	Regent	51	12.6	165	177	7	100.5
	Tower	47	11.22	165	177	9	114.5
Nov. 21 <sup>th</sup> , 1997	PF 7045.91	31	12.16	165	183	7	112.5
	PF 5045.88	32	12.15	165	173	7	94.75
	Maluka	41	12.6	150	180	8	118.8
۳۰-آبان ماه	Global	55	12.16	160	139	6	74
	Regent	57	12.13	160	143	7	81
	Tower	48	12.2	160	133	7	79
Dec. 6 <sup>th</sup> , 1997	PF 7045.91	48	12.22	160	143	6	87
	PF 5045.88	51	12.18	160	149	6	85
	Maluka	48	12.20	125	149	6	89
۱۵-آذر ماه	Global	41	12.28	144	128	5	74
	Regent	41	12.28	144	141	7	85
	Tower	46	1.7	144	143	6	83
	PF 7045.91	48	12.20	143	139	6	83
	PF 5045.88	47	12.20	143	154	8	80
	Maluka	23	12.20	128	146	6	83

اعدادی که در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، قادر اختلاف معنی دار در سطح ۵٪ بر اساس آزمون دانکن می باشند.

Means in each column having similar letter (s), are not significantly different at the 5% level (DMR-Test)

## جدول ۷- ضرایب همبستگی ساده بین صفات مورد آزمون در ارقام کلزا

Table 7. Simple correlation coefficients among different traits of rapeseed cultivars

صفت Trait	عملکرد دانه GY	عملکرد روغن OY	درصد روغن O%	تعداد شاخه فرعی No. of s.b.	وزن هزار دانه 1000 SW	ارتفاع اولین کپسول FPH	ارتفاع بوته PH
Seed yield	عملکرد دانه	1	0.99**	-0.151 <sup>ns</sup>	0.114 <sup>ns</sup>	-0.143 <sup>ns</sup>	0.345** 0.471**
Oil yield	عملکرد روغن		1	-0.012 <sup>ns</sup>	0.097 <sup>ns</sup>	-0.165 <sup>ns</sup>	0.323** 0.469**
Oil Percent	درصد روغن			1	-0.082 <sup>ns</sup>	-0.159 <sup>ns</sup>	-0.172 <sup>ns</sup> -0.060 <sup>ns</sup>
No. of sub branch	تعداد شاخه فرعی				1	-0.154 <sup>ns</sup>	0.355** 0.347**
1000 seed weight	وزن هزار دانه					1	-0.044* 0.147 <sup>ns</sup>
The hight of first pod	ارتفاع اولین کپسول						1 0.904**
Plant height	ارتفاع بوته						1

ns, \* و \*\* : به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال ۵٪ و ۱٪.

ns, \* and \*\* : Non significant, significant at the 5 and 1% levels of probability respectively.

گل دهی و پر شدن کپسول با افزایش دما، تنش رطوبت و حمله آفات به ویژه شته مواده شود و در نتیجه تعداد غنچه، تعداد کپسول و عملکرد دانه به شدت کاهش یافت و سبب افزایش دفعات آبیاری و جین علفهای هرز و مبارزه با آفات گردید. از طرفی مرحله گل دهی و پر شدن کپسول ارقام دیررس با افزایش دما و خشکی در ماههای اسفند و فروردین روبرو شد که موجب اثر بر اجزاء عملکرد دانه و کاهش عملکرد دانه گردید. بنابراین ارقام دیررس و کشت دیرهنگام در این استان توصیه نمی شود. لذا با توجه به نتایج حاصل از این بررسی می توان اظهار داشت که مناسب ترین تاریخ کاشت در منطقه نیمه اول آبان ماه و مناسب ترین ارقام، دو رقم متوسط رس ۴۵/۹۱ و PF۷۰۴۵ و PF۵۰/۸۸ می باشند.

(Mendham et al., 1990) در تاسمانی نشان دادند که تسريع نمو توام با کاهش یافتن رشد گیاه در بعد از گل دهی به ویژه در ژنوتیپ های دیررس عامل اصلی کاهش عملکرد دانه می شود. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش و تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور مشخص گردید که تأخیر در کاشت کلزا موجب کاهش عملکرد دانه می شود. لذا دست یابی به تاریخ کاشت مناسب باعث می شود که گیاه از آب و مواد غذایی بیشتری استفاده نماید و فرصت کافی جهت تکمیل کلیه مراحل رشد خود را داشته باشد.

به طور کلی کشت دیرهنگام در استان بوشهر باعث گردید که گیاه در حساس ترین مرحله رشد یعنی

## References

- بوستانی، س. ۱۳۷۴. گزارش پژوهشی بخش تحقیقات نهال و بذر استان بوشهر. انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی بوشهر.
- شیرانی راد، ا.م.، و.م. احمدی. ۱۳۷۴. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر صفات زراعی دو رقم کلزای پاییزه. مجله نهال و بذر جلد ۱۱ شماره ۲ صفحه ۴۹.

دی کیمبر، دی. آی. مک گرگور. ۱۳۷۸. فیزیولوژی، زراعت، بهنژادی و تکنولوژی زیستی ترجمه: عزیزی، م. ا. سلطانی، س. خاوری. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

Bakhtiar, B, Mohsen, Atta, Ghulam- Habib and Atta-M Habib 1992. Effect of sowing dates on seed yield of rapeseed and mustard under rainfed conditions. Indian Journal of Agricultural Research, Lahor.

Cannell, R. Q. and R. K. Belford, 1980. Effects of waterlogging at different stages of development on the growth and yield of winter oilseed rape (*Brassica napus L.*). J. of the Sci. of Food and Agriculture **31**: 963-965.

Ghosh, DC, D. Dayal, and R. C. Kilo, 1994. Effect of sowing planting, density tillage, mulching and fertilizser application on the performance of rainfed rapeseed in rice fallows. Indian J. of Agric. Research 1998-**39**: 2, 75-78.

Ivanova, R., B. Yankov, and Ch. Yancheva. 1995. Effect of plant date and rate on yield and quality of rapeseed grown biomass. Bulgarian J. of Agricul. Sci. **1**: 4, 423-427.

Kanchan, B. AK. Mohapatra, and K. Barak. 1998. Effect of dates of sowing and varieties on incidence of aphid on rapeseed and mustard . Environment and Ecology, **16**: 3, 713-715.

Kuchtova, P. and P. Vasak, J. 1998. Dynamics in creation and reduction of generative organs on winter rapeseed. Rosling Olesite , **19**: 2, 437-446.

Leto, C. and A. Carruba. 1995. Effect of sowing date and cultivation on phenology and yield of autumn- sown oilseed rape. Rivista- Diagronomia **29**: 72-78.

Morrison, M. J., P. B. E. McVetty, and C. F. Shaykewich, 1989. The determination and verification of a baseline temperature for the growth of Westar summer rape. Can. J. of Pl. Sci. **65**: 455-464.

Mendham, N. J., J. Russel, and N. K. Jarosz, 1990. Response to sowing time of three contrasting Australian cultivars of oil seed rape. J. of Agric. Sci. Cambridge **114**: 275-283.

Pradhan, A. C., D. C. Ghosh, and SK. Sarkar, 1997. Effect of sowing time and nutrient managment on growth and yield of rapeseed . Indian – Agriculturist **41**: 2 , 123-129.

Phadke, K., SK. Prasad. 1987. Effect of sowing date on aphid incidence and yield in some varieties of rapeseed and mustard . J. of Aphidology 1987, **1**: 1-2, 23-28.

Ustimenko, Bakumovski, G. V. 1983. Plant growing in tropics and subtropics. Mir Publisher page: 390.

## Determination of the most suitable sowing date for rapeseed in Bushehr province cultivars

N. Kazerani<sup>1</sup>, M. R. Ahmadi<sup>2</sup>

### ABSTRACT

To determine the most suitable sowing date for rapeseed cultivars this study was carried out in Busheshr Agriculture Research Center, Borazjan in 1997-1998 cropping season using a strip plot design four replications. Rapeseed cultivars were: Global, Regent, Tower, Pf7045/91, Pf5045/88 and Maluka with which were sown on four different dates with fifteen days interval (oct.20, nov.5, No. 20 and dec.5). Each highest (1509 plot was four row (3m), with 50cm row distances. Results showed that mean seed yield was kg/ha) when sown on oct.20. Interaction between sowing date and cultivars indicated that Pf7045/91 and Pf5045/88 sown on oct. 20, produced the highest mean seed yield of 2010 and 1840 kg/ha, respectively. Results of correlation studies indicated that grain yield had a positive and significant relation with oil yield, plant height and height of first pod. The heighest correlation was determined between seed yield and oil yield( $r=0.99$ ) and there was no significant correlation between the other traits.

Key words: Sowing date, Grain yield , Oil yield, Rapeseed, Cultivars.

---

1- BSc. in Agron., Research Center of Ag. Bushehr, Borazjan.  
2- Scientific member, Seed & Plant Improv. Institute, Karaj, Iran.