

گروه‌بندی ژنوتیپ‌های موتانت برنج (*Oryza sativa* L.) در شرایط تنش خشکی Classification of mutant rice (*Oryza sativa* L.) genotypes under drought stress conditions

پیمان شریفی^۱، هاشم امین پناه^۲ و علی اکبر عبادی^۳

چکیده

شریفی، پ.، ه. امین پناه و ع. ا. عبادی. ۱۳۹۶. گروه‌بندی ژنوتیپ‌های موتانت برنج (*Oryza sativa* L.) در شرایط تنش خشکی. مجله علوم زراعی ایران. ۱۹(۲): ۱۶۴-۱۴۸.

تحقیق حاضر به صورت دو آزمایش جداگانه تحت شرایط تنش خشکی و آبیاری معمول، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال زراعی ۹۴-۱۳۹۳ در مؤسسه تحقیقات برنج کشور در رشت اجرا شد. مواد گیاهی مورد استفاده شامل ۱۴ لاین موتانت برنج (هفت لاین از رقم هاشمی، شش لاین از رقم طارم‌محلی و یک لاین از رقم خزر) و چهار رقم هاشمی، طارم‌محلی، خزر و گیلازه بودند. تجزیه به عامل‌ها، در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی پنج و چهار عامل اصلی را شناسایی کرد که به ترتیب ۸۱/۵ و ۷۹/۳ درصد تغییرات صفات را توجیه کردند. نتایج این تجزیه نشان داد که در هر دو شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی، انتخاب بوته‌هایی با باروری خوشه و طول خوشه بالاتر و طول میانگره و ارتفاع بوته کوتاه می‌تواند به افزایش عملکرد دانه بیانجامد. ژنوتیپ‌ها بر اساس تجزیه خوشه‌ای در هر دو شرایط در پنج گروه دسته‌بندی شدند. تجزیه تابع تشخیص صحت صددرصدی گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها را در تجزیه خوشه‌ای نشان داد. نتایج حاصل از تجزیه‌های مختلف، لاین‌های TM6-230-VE-8-4-1، TM6-250-10-7-1، TM6-B-2-1-E و HM5-250-E-1-1 را با عملکرد دانه بیشتر در شرایط تنش خشکی (۲۲۲۷/۶ کیلوگرم در هکتار) و صفات مطلوبی مانند باروری خوشه بالا (۸۰/۹) و طول خروج خوشه از غلاف پایین (۶/۳ سانتی‌متر) به‌عنوان ژنوتیپ‌های برتر شناسایی کردند. میانگین عملکرد دانه ژنوتیپ‌های یاد شده در شرایط آبیاری معمول، ۴۷۳۹/۹ کیلوگرم در هکتار بود. کاهش عملکرد دانه ژنوتیپ‌های مذکور بر اثر تنش خشکی، ۵۳ درصد و برای کلیه ژنوتیپ‌ها، ۶۰ درصد بود. بنابراین، ژنوتیپ‌های منتخب یاد شده می‌توانند در پیشبرد برنامه‌های اصلاحی در توسعه ارقام جدید برنج با تحمل بیشتر به تنش خشکی، مورد توجه قرار داده شوند.

واژه‌های کلیدی: برنج، تجزیه تشخیصی، تجزیه خوشه‌ای، تجزیه به عامل‌ها و تنش خشکی.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

۱- دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی. عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. (مکاتبه کننده)

(پست الکترونیک: peyman.sharifi@gmail.com)

۲- دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی.

۳- استادیار مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مقدمه

برنج گیاهی با قابلیت تولید محصول بالا و یک غله عمده غذایی در بین گیاهان زراعی است که بیش از ۵۰ درصد مردم جهان به نوعی به آن وابسته هستند (Guimarães *et al.*, 2016). تنش خشکی یکی از رایج ترین تنش های غیرزیستی است که بخش زیادی از مناطق تحت کشت برنج را تهدید می کند، بنابراین، ارزیابی ژنوتیپ های برنج از نظر میزان تحمل و یا حساسیت به تنش خشکی و معرفی ارقام برتر از اهمیت بالایی برخوردار است (Venuprasad *et al.*, 2008).

برای تولید لاین های موتانت از عوامل جهش زای (موتاژن) شیمیایی و فیزیکی مختلفی استفاده می شود. گاهی به دلیل شدت فعالیت های اصلاحی و به دنبال آن فرسایش شدید، منابع ژنتیکی کاهش یافته و یا یک صفت خاص در گیاهان وجود ندارد که در این صورت، تنها راه ممکن برای دستیابی به تنوع و بهبود ذخایر ژنتیکی، استفاده از موتاسیون یا جهش با استفاده از عوامل شیمیایی و یا فیزیکی (مانند انرژی هسته ای) است (Yilmaz and Boydak, 2006). در سال های اخیر لاین هایی از برنج با هدف ایجاد پاکوتاهی و زودرسی (Domingo *et al.*, 2007)، افزایش وزن هزار دانه (Jeng *et al.*, 2006)، بهبود کیفیت دانه (El-Degwy, 2013) و افزایش تحمل به خشکی (Luzi-Kihupi *et al.*, 2009) و افزایش تحمل به خشکی (Cha-um *et al.*, 2012) با استفاده از موتاژن های شیمیایی و فیزیکی، شناسایی و معرفی شده اند.

تجزیه به عامل ها یکی از روش های آماری چند متغیره است که از آن جهت استخراج زیر مجموعه ای از متغیرهای همسان، کاهش تعداد زیادی از صفات به تعداد کمی از عامل ها و تشریح همبستگی بین متغیرها استفاده می شود. میزان اشتراک در تجزیه به عامل ها، بخشی از واریانس یک متغیر است که به عامل های مشترک مربوط می شود و هرچه مقدار آن بیشتر باشد، نشان دهنده دقت بیشتر در استخراج

عامل های مشترک به عنوان عوامل تأثیرگذار بر متغیر مربوطه می باشد (Jackson, 1991). قربانی و همکاران (Ghorbani *et al.*, 2001) با استفاده از تجزیه به عامل ها در برنج نشان دادند که سه عامل اصلی و مستقل ۷۷/۷ درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه کردند. رحیم سروش و همکاران (Rahim Souroush *et al.*, 2005) با ارزیابی ۳۶ ژنوتیپ برنج نشان دادند که شش عامل اول ۸۳/۶ درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه کردند. شریفی و همکاران (Sharifi *et al.*, 2014) نشان دادند که پنج عامل اول ۸۱/۱ درصد از کل تنوع صفات را در ژنوتیپ های برنج توجیه کردند.

تجزیه خوشه ای روش آماری چند متغیره دیگری است که در آن گروه بندی افراد بر اساس میزان تفاوت یا تشابه آنها انجام می شود. بهپوری و همکاران (Behpouri *et al.*, 2007) اظهار داشتند که بهترین گروه بندی ژنوتیپ های برنج با استفاده از روش های حداقل واریانس وارد و دورترین همسایه ها انجام شد. آنها با استفاده از روش های یاد شده، ۱۰۰ ژنوتیپ برنج مورد ارزیابی را در نه گروه دسته بندی کردند. آگاهی و همکاران (Agahi *et al.*, 2012) با استفاده از تجزیه خوشه ای، ارقام برنج را در چهار گروه طبقه بندی کردند. در آزمایشی دیگر، ۴۴ ژنوتیپ برنج بر اساس صفات مورفولوژیک و شاخص های تحمل به خشکی در مرحله گیاهچه ای و رویشی، به پنج گروه تقسیم شدند (Thi Thu Ha *et al.*, 2016). گومارز و همکاران (Guimarães *et al.*, 2016)، ۴۱ ژنوتیپ برنج را در شرایط بدون تنش و تنش خشکی در مرحله زایشی مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از تجزیه خوشه ای، ژنوتیپ ها را در شرایط بدون تنش و تنش خشکی به ترتیب در شش و هفت گروه دسته بندی کردند. راجیو و همکاران (Rajiv *et al.*, 2010) با مقایسه موقعیت ژنوتیپ های برنج در نمودار پراکندگی تجزیه تابع تشخیص در شرایط بدون تنش و تنش خشکی،

ژنوتیپ، به‌طور کامل قطع و جهت جلوگیری از ورود آب باران از پناهگاه (شلتز) استفاده شد. مساحت هر کرت آزمایشی ۱۲ مترمربع بود. گیاهچه‌های ژنوتیپ‌های برنج پس از رویاندن در خزانه، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت، در مرحله ۴-۵ برگگی به تعداد ۲-۳ عدد در هر کپه با فاصله ۲۵ در ۲۵ سانتی‌متر در زمین اصلی نشاکاری شدند. کلیه عملیات زراعی از قبیل آبیاری، کوددهی، مبارزه با علف‌های هرز و مبارزه با آفات و بیماری‌ها مطابق توصیه‌های فنی موسسه تحقیقات برنج انجام شد. صفات ارتفاع بوته، طول و عرض برگ پرچم، تعداد پنجه بارور، طول خوشه، طول خروج خوشه از غلاف، تعداد دانه‌های پر و پوک در خوشه و طول و عرض شلتوک در زمان مقتضی اندازه‌گیری شدند. برای اندازه‌گیری صفات یاد شده از میانگین ۱۰ بوته از هر کرت مربوط به هر ژنوتیپ در هر کدام از تکرارها بر اساس سیستم بین‌المللی استاندارد (SES, 2002) استفاده شد. مساحت برگ پرچم (حاصل ضرب طول و عرض برگ پرچم در ضریب ۰/۷۵) و میزان باروری خوشه (نسبت تعداد دانه پر به تعداد کل دانه‌ها) محاسبه و شکل دانه نیز اندازه‌گیری شدند. محصول هر کرت در زمان رسیدگی کامل از سطح ۱۰ مترمربع از هر واحد آزمایشی پس از حذف حاشیه، برداشت و بر اساس رطوبت ۱۴ درصد به عنوان عملکرد دانه در نظر گرفته شد.

تجزیه به عامل‌ها با استفاده از روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و چرخش عامل‌ها به روش وریماکس (Varimax) انجام شد. میزان اشتراک و واریانس توجیه‌شده توسط عوامل به وسیله بیشترین ضریب همبستگی تخمین زده شد. اختصاص صفات یا متغیرها به عوامل مستقل و مختلف با توجه به مقدار ضرایب عاملی، بعد از چرخش وریماکس عامل‌ها صورت گرفت. ضرایب عاملی برای هر صفت با قدرمطلق بزرگتر از ۰/۵ به عنوان ضریب معنی‌دار برای آن عامل مستقل در نظر گرفته شد (Zarea Chahkahi, 2010). در

ژنوتیپ‌های حساس و متحمل به خشکی را از نظر مجموع صفات مورد مطالعه شناسایی نمودند.

با توجه به اهمیت معرفی ارقام متحمل به تنش خشکی، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و گروه‌بندی لاین‌های موتانت برنج بر اساس صفات مهم زراعی جهت شناسایی و انتخاب لاین‌های برتر در شرایط بدون تنش و تنش خشکی و شناسایی صفات مرتبط با تحمل تنش خشکی با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره بود.

مواد و روش‌ها

آزمایش حاضر در بهار سال ۱۳۹۳ در مؤسسه تحقیقات برنج کشور در رشت (با عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۲۸ دقیقه شمالی، طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۲۸ دقیقه شرقی) به صورت دو آزمایش جداگانه و در دو شرایط بدون تنش (آبیاری معمول) و تنش خشکی اجرا شد. در هر آزمایش ۱۴ لاین موتانت (هفت لاین موتانت از رقم هاشمی، شش لاین موتانت از رقم طارم محلی و یک لاین موتانت از رقم خزر) و چهار رقم هاشمی، طارم محلی، خزر و گیلانه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به اینکه رقم گیلانه جدیداً معرفی شده و اطلاعاتی از لحاظ تحمل آن به خشکی در دست نیست، هدف از قرار دادن این رقم در آزمایش، ارزیابی تحمل آن به تنش خشکی و مقایسه آن با لاین‌های موتانت و سایر ارقام از نظر تحمل به خشکی بود. لاین‌های موتانت مورد بررسی حاصل طرح تحقیقاتی مشترک با پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران جهت تولید ارقام برنج متحمل به تنش خشکی بودند که با استفاده از اشعه گاما با دز ۲۵۰ گری بدست آمدند. اسامی والدین لاین‌های موتانت در جدول یک ارائه شده است.

در آزمایش مربوط به تنش خشکی انتهای فصل، آبیاری در مراحل آغازش جوانه اولیه خوشه برای هر

نخواهد داشت (Zarea Chahkahi, 2010). برای اطمینان از مناسب بودن داده‌ها برای تحلیل عاملی از آزمون بارتلت نیز استفاده شد. این آزمون فرضیه تعلق ماتریس همبستگی‌های مشاهده شده را به جامعه‌ای با متغیرهای ناهمبسته می‌آزماید. تجزیه به عامل‌ها قبل از تجزیه خوشه‌ای انجام شد تا اهمیت متغیرهایی که در گروه‌ها نقش داشتند، روشن شود (Jackson, 1991) و سپس تجزیه خوشه‌ای برای گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها انجام شد. در ارزیابی ژنوتیپ‌های مربوط به هر کدام از گروه‌ها در تجزیه خوشه‌ای، از نتایج تجزیه به عامل‌ها استفاده شد.

این روش، علامت ضریب عاملی مشخص‌کننده رابطه خطی آن با صفات دیگر در هر عامل اصلی می‌باشد. تعداد عامل‌ها با توجه به مقدار ویژه هر عامل مشخص شد و عامل‌هایی که مقدار ویژه آنها بیشتر از یک بود، به عنوان عامل‌های منتخب در نظر گرفته شدند (Allahgholipour and Mohamad-Salehi, 2004). از آماره KMO (Kaiser Meyer Olkin) برای تشخیص مطلوبیت تجزیه عاملی استفاده شد. مقادیر کوچک این آماره (کمتر از ۰/۵) بیانگر آن است که همبستگی بین زوج متغیرها نمی‌تواند توسط متغیرهای دیگر تبیین شود، بنابراین استفاده از تحلیل عاملی مطلوبیت لازم را

جدول ۱- اسامی و نام والد ژنوتیپ‌های موتانت برنج مورد استفاده در آزمایش

Table 1. Name and parent of mutant rice genotypes

شماره ژنوتیپ No. of Genotype	کد ژنوتیپ Code of genotype	والد Parent
1	TM6-230-VE-7-5-1	Tarom طاروم محلی
2	TM6-230-VE-8-4-1	Tarom طاروم محلی
3	TM6-250-10-7-1	Tarom طاروم محلی
4	TM6-B-2-1-E	Tarom طاروم محلی
5	TM6-B-7-1	Tarom طاروم محلی
6	TM6-B-19-2	Tarom طاروم محلی
7	HM5-250-E-1-1	Hashemi هاشمی
8	HM5-250-E-3-2	Hashemi هاشمی
9	HM5-250-7-1	Hashemi هاشمی
10	HM5-250-7-6	Hashemi هاشمی
11	HM5-300-E-1	Hashemi هاشمی
12	HM5-300-3-1	Hashemi هاشمی
13	HM5-300-5-1	Hashemi هاشمی
14	KM5-200-4-2-E	Khazar خزر
15		Khazar خزر
16		Hashemi هاشمی
17		Tarom طاروم محلی
18		Gilaneh گیلاوه

T: Tarom; H: Hashemi; K: Khazar; M: Mutation generation

T: طاروم محلی؛ H: هاشمی؛ K: خزر؛ M: نسل موتاسیون

محاسبات آماری مربوط به تجزیه به عامل‌ها، تابع تشخیص و تجزیه خوشه‌ای با استفاده از نرم‌افزار SPSS 17 (SPSS, 2008) و به صورت مجزا در شرایط بدون تنش و تنش خشکی انجام شد. برای محاسبه ضرایب T^2 کاذب، F کاذب و شاخص ریشه انحراف استاندارد میانگین مربعات (Root Mean Square Standard

Deviation, RMSSTD)، جهت تعیین تعداد کلاستر مناسب در تجزیه خوشه‌ای به روش حداقل واریانس وارد (Ward's Minimum Variance)، از نرم‌افزار Systat (Systat, 2014) استفاده شد. وجود پیک در آماره F کاذب، جهش ناگهانی در مقدار T^2 و شیب تند از تعداد کلاستر زیاد به کم در شاخص RMSSTD

گرفت. عامل دوم صفات طول برگ پرچم، طول خوشه و عرض دانه را در برداشت و در مجموع ۱۵/۰۳ درصد از تغییرات داده‌ها را توجیه نمود. عامل سوم با توجیه ۱۵/۰۱ درصد از تغییرات داده‌ها شامل صفات ارتفاع بوته، طول میانگره، تعداد پنجه و عملکرد دانه بود. صفاتی که در این عامل قرار گرفتند، همبستگی معنی‌داری با عملکرد دانه داشتند (Allahgholipour and Mohamad-Salehi, 2004). عامل چهارم ۱۲/۸۲ درصد از تغییرات داده‌ها را توجیه کرد و شامل صفات طول دانه و شکل دانه بود. عامل پنجم نیز با توجیه ۱۱/۴۷ درصد از تغییرات داده‌ها، شامل صفات طول خروج خوشه از غلاف و تعداد دانه پر بود (جدول ۲). در تطابق با نتایج تحقیق حاضر محققان دیگری نیز در آزمایش روی گیاه برنج در شرایط بدون تنش خشکی، از روش تجزیه به عامل‌ها جهت شناسایی روابط بین صفات و کاهش تعداد صفات همبسته با عملکرد و تشریح همبستگی بین متغیرها استفاده نمودند و تعداد سه (Ghorbani *et al.*, 2011)، پنج (Agahi *et al.*, 2012; Sharifi *et al.*, 2011) و شش (Rahim Souroush *et al.*, 2005) عامل اصلی و مستقل را شناسایی کردند که بیشترین درصد از تغییرات کل داده‌ها را توجیه کردند.

تجزیه به عامل‌ها در شرایط تنش خشکی، چهار عامل را شناسایی نمود که در مجموع ۷۹/۳ درصد از تغییرات کل داده‌ها را توجیه نمودند (جدول ۳). عامل اول به‌تنهایی ۲۷/۵۲ درصد از کل واریانس داده‌ها را توجیه کرد. در این عامل ضرایب عاملی مثبت و معنی‌دار متعلق به عملکرد دانه، عرض دانه و درصد باروری دانه و بزرگترین ضرایب منفی متعلق به صفات شکل دانه، تعداد دانه پوک در خوشه و عرض برگ پرچم بود. ضرایب این عامل نشان‌دهنده تأثیر مثبت صفات عرض دانه و درصد باروری خوشه بر عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی بود. در عامل دوم که ۲۲/۹۸ درصد از تغییرات کل داده‌ها را توجیه کرد،

نشان‌دهنده تعداد مناسب کلاستر می‌باشد (Zarea Chahkahi, 2010). برای تشخیص مناسب بودن گروه‌بندی حاصل از تجزیه خوشه‌ای از تجزیه تابع تشخیص خطی فیشر نیز استفاده شد.

نتایج و بحث

با توجه به اینکه شرط لازم برای تجزیه به عامل‌ها، همبسته بودن متغیرها است، آزمون بارتلت انجام شد که در آن مربع کای معنی‌دار نشان‌دهنده حداقل شرایط لازم برای اجرای تحلیل عاملی است (Farshadfar, 2002). در هر دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی، نتایج آزمون بارتلت (به ترتیب با $۲۶۴/۴۹^{**}$ و $۲۵۶/۱۲^{**}$) معنی‌دار بود، یعنی بین متغیرها همبستگی معنی‌داری وجود داشت و بنابراین تجزیه به عامل‌ها در این دو شرایط مجاز بوده است. همچنین با توجه به اینکه میزان KMO در شرایط بدون تنش و تنش خشکی به ترتیب ۰/۷۱ و ۰/۷۵ برآورد شد، تجزیه به عامل‌ها از مطلوبیت بالایی برخوردار بوده و کاربرد تحلیل عاملی متغیرها قابل توجیه بود. بر اساس مقادیر ویژه بزرگتر از یک برای هر عامل، در شرایط بدون تنش پنج و در شرایط تنش خشکی چهار عامل انتخاب شدند (جدول‌های ۲ و ۳). در هر دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی، برای تمام صفات مورد مطالعه این شاخص بالا بود که نشان می‌دهد تعداد عامل‌های انتخاب شده، توانستند تغییرات صفات را به نحو مطلوبی توجیه نمایند.

نتایج تجزیه به عامل‌ها نشان داد که در شرایط بدون تنش، پنج عامل اصلی ۸۱/۵ درصد از تغییرات صفات را توجیه کردند (جدول ۲). عامل اول با ۲۷/۲ درصد، بیشترین سهم را در توجیه تغییرات داده‌ها به خود اختصاص داد و شامل صفات ارتفاع بوته، عرض برگ پرچم، تعداد دانه پوک و درصد باروری خوشه بود. انتخاب این صفات در عامل اول بر اساس ضریب عاملی با قدرمطلق بزرگتر از ۰/۵ برای هر صفت صورت

به انتخاب ژنوتیپ‌های برتر در شرایط تنش خشکی نمود (Ghorbani *et al.*, 2001). در عامل سوم صفاتی مانند طول دانه و شکل دانه دارای ضرایب عاملی مثبت و بالایی بودند که ۱۴/۶۵ درصد از کل تغییرات را توجیه کردند. در عامل چهارم که ۱۴/۱۴ درصد از تغییرات داده‌ها را توجیه می‌کرد، صفات تعداد پنجه، تعداد دانه پر و درصد باروری خوشه دارای ضریب عاملی مثبت بالایی بودند.

صفات ارتفاع بوته، طول میانگره، طول برگ پرچم و طول خوشه دارای بزرگترین ضرایب عاملی مثبت بود. در این عامل، صفت عرض برگ پرچم دارای ضریب عاملی منفی بالایی بود. درصد بالای توجیه تغییرات داده‌ها توسط این دو عامل نشان دهنده میزان همبستگی و مقدار توجیه صفات مورد مطالعه در ژنوتیپ‌ها توسط این دو عامل می‌باشد و به نظر می‌رسد که بر اساس این عوامل، می‌توان اقدام

جدول ۲- تجزیه عامل‌ها برای صفات گیاهی ژنوتیپ‌های برنج در شرایط بدون تنش

Table 2. Factor analysis for plant characteristics of rice genotypes in non stress condition

Plant characteristics	صفات گیاهی	بار عامل‌های چرخش‌یافته Rotated component matrix					میزان اشتراک Communalities
		1	2	3	4	5	
Plant height	ارتفاع بوته	0.765	0.217	-0.515	-0.068	0.001	0.90
Internode length	طول میانگره	0.178	0.159	-0.803	-0.016	0.066	0.71
Flag leaf length	طول برگ پرچم	-0.366	0.691	0.062	-0.049	0.120	0.63
Flag leaf width	عرض برگ پرچم	-0.949	0.042	-0.002	-0.080	0.047	0.91
No. of tillers	تعداد پنجه	0.401	0.288	0.700	0.188	-0.326	0.88
Panicle length	طول خوشه	0.211	0.732	-0.256	0.076	0.208	0.70
Panicle exertion	خروج خوشه از غلاف	0.035	-0.101	0.000	-0.023	0.803	0.66
No. of filled grains	تعداد دانه پر	0.128	-0.288	0.022	-0.020	-0.765	0.69
No. of unfilled grains	تعداد دانه یوک	-0.940	0.197	-0.091	0.063	-0.065	0.94
Panicle fertility	درصد باروری خوشه	0.917	-0.248	0.114	-0.074	-0.099	0.93
Grain length	طول دانه	0.107	-0.246	0.102	0.936	0.098	0.97
Grain width	عرض دانه	0.381	-0.712	0.284	0.028	0.300	0.83
Grain shape	شکل دانه	-0.181	0.281	-0.109	0.911	-0.124	0.97
Grain yield	عملکرد دانه	0.126	-0.307	0.713	-0.151	0.276	0.72
Eigen values	مقادیر ویژه	3.80	2.10	2.10	1.79	1.61	
% of Variance	درصد واریانس	27.17	15.03	15.01	12.82	11.47	
Cumulative variance(%)	درصد واریانس تجمعی	27.17	42.21	57.22	70.04	81.52	

عملکرد دانه بیانجامد. در شرایط تنش خشکی، ارتفاع بوته و طول و عرض برگ پرچم دارای ضرایب منفی در عامل اول بودند و از آنجا که ضرایب عاملی برای این متغیرها متفاوت از عملکرد بودند، به نظر می‌رسد که در گیاه در پاسخ به تنش خشکی، تغییرات مورفولوژیکی مانند کاهش ارتفاع بوته و کاهش سطح برگ اتفاق افتاده باشد که هر

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه به عامل‌ها در محیط‌های بدون تنش و تنش خشکی، در انتخاب گیاهان در دو محیط ابتدا باید به صفاتی مانند درصد باروری خوشه و طول خوشه توجه نمود. بعلاوه در هر دو شرایط، ارتفاع بوته و طول میانگره بر عملکرد دانه اثر منفی داشتند، بنابراین انتخاب بوته‌هایی با طول میانگره و ارتفاع بوته کوتاه‌تر می‌تواند به افزایش

۹ (HM5-250-7-1)، ۱۰ (HM5-250-7-6)، ۲ (TM6-)،
 ۱۲ (230-VE-8-4-1) و (HM5-300-3-1)، در گروه دوم
 ژنوتیپ‌های ۸ (HM5-250-E-3-2)، ۱۳ (HM5-300-5-
 1) و ۱۴ (KM5-200-4-2-E)، در گروه سوم ژنوتیپ‌های
 ۱ (TM6-230-VE-7-5-1)، ۴ (TM6-B-2-1-E)،
 ۳ (TM6-250-10-7-1)، ۵ (TM6-B-7-1) و ۱۸
 (گیلان)، در گروه چهارم ژنوتیپ‌های ۱۱ (HM5-300-
 E-1)، ۱۵ (خزر)، ۶ (TM6-B-19-2) و ۱۶ (هاشمی) و
 در گروه پنجم ژنوتیپ ۱۷ (طارم محلی) قرار گرفتند
 (شکل ۱).

دو از راهکارهای مقابله گیاه با تنش خشکی محسوب
 می‌شوند (Blum and Sullivan, 1986).
 برای حصول اطمینان از نقطه برش دندروگرام
 و تعیین تعداد واقعی گروه‌ها از تغییرات آماره‌های
 F کاذب، T^2 کاذب هتلینگ و شاخص ریشه انحراف
 استاندارد میانگین مربعات (RMSSTD) استفاده شد
 و بر اساس این شاخص‌ها مناسب‌ترین تعداد گروه‌ها
 پنج عدد بود. نتایج تجزیه خوشه‌ای به روش
 حداقل واریانس وارد در شرایط بدون تنش نشان داد
 که در گروه اول ژنوتیپ‌های ۷ (HM5-250-E-1-1)،

جدول ۳- تجزیه عامل‌ها برای صفات گیاهی ژنوتیپ‌های برنج در شرایط تنش خشکی

Table 3. Factor analysis for plant characteristics of rice genotypes in drought stress condition


Plant characteristics	صفات گیاهی	بار عامل‌های چرخش یافته Rotated component matrix				میزان اشتراک Communalities
		1	2	3	4	
Plant height	ارتفاع بوته	-0.033	0.799	-0.086	-0.006	0.65
Internode length	طول میانگره	-0.3	0.847	-0.028	0.203	0.85
Flag leaf length	طول برگ پرچم	-0.305	0.628	0.152	-0.283	0.59
Flag leaf width	عرض برگ پرچم	-0.435	-0.67	-0.167	0.111	0.68
No. of tillers	تعداد پنجه	-0.195	-0.315	0.313	0.685	0.70
Panicle length	طول خوشه	-0.103	0.826	-0.131	0.106	0.72
Panicle exertion	خروج خوشه از غلاف	0.12	0.195	-0.773	-0.306	0.74
No. of filled grains	تعداد دانه پر	0.2	0.239	-0.022	0.871	0.86
No. of unfilled grains	تعداد دانه پوک	-0.792	-0.043	-0.423	-0.333	0.92
Panicle fertility	درصد باروری خوشه	0.68	0.101	0.321	0.631	0.97
Grain length	طول دانه	0.331	0.104	0.884	-0.03	0.90
Grain width	عرض دانه	0.951	-0.096	0.113	0.005	0.93
Grain shape	شکل دانه	-0.841	0.121	0.447	-0.026	0.92
Grain yield	عملکرد دانه	0.751	-0.307	0.052	-0.047	0.66
Eigen values	مقادیر ویژه	3.85	3.22	2.05	1.98	
% of variance	درصد واریانس	27.52	22.98	14.66	14.14	
Cumulative variance(%)	درصد واریانس تجمعی	27.52	50.50	65.16	79.29	

پرچم و تعداد دانه پوک در خوشه بودند. ژنوتیپ‌های
 گروه سوم، دارای بیشترین مقادیر صفات تعداد پنجه،
 طول خروج خوشه از غلاف، درصد باروری خوشه،
 عرض دانه و عملکرد دانه بودند. بعلاوه ژنوتیپ‌های این
 گروه کمترین مقادیر صفات نامطلوبی چون ارتفاع

نتایج بررسی میانگین صفات در هر کدام از گروه‌ها
 در شرایط بدون تنش (جدول ۴) نشان داد که
 ژنوتیپ‌های گروه اول دارای بیشترین درصد باروری
 خوشه در مقایسه با سایر ژنوتیپ‌ها بودند. ژنوتیپ‌های
 گروه دوم دارای بیشترین طول میانگره، عرض برگ

و دوم (به عنوان عامل‌های تأثیرگذار بر عملکرد دانه در شرایط بدون تنش)، ژنوتیپ‌های حاضر در این گروه با داشتن کمترین مقادیر سه صفت فوق و اختلاف با سایر ژنوتیپ‌ها از لحاظ عملکرد دانه، ارتفاع بوته کمتر و باروری خوشه، دارای اهمیت اصلاحی شناخته شدند.

بوته، طول میانگره و تعداد دانه پوک در خوشه را داشتند. با توجه به همبستگی منفی و معنی‌دار بین عملکرد دانه و صفات ارتفاع بوته، طول میانگره و تعداد دانه پوک در خوشه (داده‌ها گزارش نشده‌اند) و همچنین قرار گرفتن بیشتر این صفات در دو عامل اول



شکل ۱- دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه‌ای برای ۱۸ ژنوتیپ برنج در شرایط بدون تنش با استفاده از روش وارد (اسامی ژنوتیپ‌های برنج در جدول ۱ ارائه شده است)

Fig. 1. Dendrogram derived from cluster analysis for 18 rice genotypes based on studied traits under non stress condition using Ward method (name of rice genotypes has been shown in table 1)

اله‌قلی‌پور و همکاران (Allahgholipour *et al.*, 2004) اقدام به مقایسه میانگین صفات در هر کدام از کلاسترها با سایر کلاسترها و میانگین کل نمودند و بدین طریق مشخصه‌های مهم هر کدام از گروه‌ها را مشخص نمودند.

نتایج تجزیه خوشه‌ای در شرایط تنش خشکی نیز نشان داد که در گروه اول ژنوتیپ‌های ۸ (HM5-250-E-3-2)، ۹ (HM5-250-7-1)، ۱۰ (E-3-2)، ۱۱ (HM5-250-7-6)، ۱۲ (HM5-300-3-1)، ۱۳ (گیلانسه)، ۱۴ (هاشمی) و ۱۵ (گروه دوم ژنوتیپ‌های ۱۱ (HM5-300-E-1)، ۱۶ (طارم محلی)، ۱۷ (TM6-B-7-1)، ۱۸ (TM6-B-19-2) و ۱۹


ژنوتیپ‌های گروه چهارم، بیشترین مقادیر صفات طول برگ پرچم، طول خوشه، طول دانه و شکل دانه را دارا بودند. همچنین با توجه به متوسط طول دانه در ارقام دسته چهارم (۱۰/۲ میلی‌متر) و بازارپسندی آن در ایران، این ژنوتیپ‌ها از ظرفیت بالقوه خوبی جهت تلاقی برای دستیابی به ژنوتیپ‌های دانه‌بلند برخوردار می‌باشند (جدول ۴). در تطابق با نتیجه تحقیق حاضر، بهپوری و همکاران (Behpouri *et al.*, 2007) با استفاده از روش حداقل واریانس وارد اقدام به گروه‌بندی ژنوتیپ‌های برنج به ترتیب در نه و چهار گروه نمودند. در تطابق با نتیجه تحقیق حاضر،

۱ (TM6-230-VE-7-5-1) و در گروه چهارم ژنوتیپ ۳ (HM5-300-5-1)، در گروه سوم ژنوتیپ های ۲ (TM6-)، ۴ (TM6-B-2-1-E)، ۷ (HM5-250-E-1-1) و در گروه پنجم ژنوتیپ های ۱۴ (KM5-200-4-2-E) و ۱۵ (خزر) قرار گرفتند (شکل ۲).

جدول ۴- میانگین صفات گیاهی ژنوتیپ های برنج در دسته های حاصل از تجزیه خوشه ای به روش وارد در شرایط بدون تنش

Table 4. Mean of plant characteristics of rice genotypes clusters using Ward's method in non stress condition

Plant characteristics	صفات گیاهی	دسته Clusters					کل Total
		1	2	3	4	5	
Plant height(cm)	ارتفاع بوته	150.6	145.2	136.4	151.3	168.7	146.9
Internode length(cm)	طول میانگره	43.1	50.1	39.3	44.2	44.7	43.6
Flag leaf length(cm)	طول برگ پرچم	27.5	30.2	29.3	31.3	29.2	29.4
Flag leaf width(cm)	عرض برگ پرچم	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1
No. of tillers	تعداد پنجه	17.7	17.1	18.5	17.9	18.3	17.9
Panicle length	طول خوشه	28.8	28.8	26.4	29.8	25.8	28.2
Panicle exsertion(cm)	خروج خوشه از غلاف	8.2	9.4	11.9	8.2	10.7	9.6
No. of filled grains	تعداد دانه پر	111.5	106.1	113.9	112.0	115.7	111.6
No. of unfilled grains	تعداد دانه پوک	11.2	17.8	13.1	17.3	16.0	14.4
Panicle fertility(%)	درصد باروری خوشه	90.9	86.2	90.0	86.7	87.8	88.8
Grain length(mm)	طول دانه	9.6	10.1	10.1	10.2	9.1	9.9
Grain width(mm)	عرض دانه	2.5	2.5	2.6	2.5	2.3	2.5
Grain shape	شکل دانه	3.9	4.1	3.9	4.2	3.9	3.9
Grain yield(kg.ha ⁻¹)	عملکرد دانه	4620.8	4426.6	4838.9	4126.3	3596.7	4482.2
Genotypes No.	شماره ژنوتیپ ها	2, 7, 9, 10, 12	8, 13, 14	1, 3, 4, 5, 18	6, 11, 15, 16	17	
No. of genotypes	تعداد ژنوتیپ ها	5	3	5	4	1	18



شکل ۲- دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای برای ۱۸ ژنوتیپ برنج در شرایط تنش خشکی با استفاده از روش وارد (اسامی ژنوتیپ های برنج در جدول ۱ ارائه شده است)

Fig. 2. Dendrogram derived from cluster analysis for 18 rice genotypes based on studied traits under drought stress condition using Ward method (name of rice genotypes has been shown in table 1)

ژنوتیپ های واقع در گروه اول بیشترین مقدار شکل دانه را داشتند. این ژنوتیپ ها همچنین کمترین میزان طول

ارزیابی میانگین صفات در هر کدام از گروه ها در شرایط تنش خشکی (جدول ۵) نشان داد که

دست یافت. در تطابق با این نتیجه، گومارز و همکاران (Guimarães *et al.*, 2010) نیز همبستگی مثبت بین عملکرد دانه و درصد باروری خوشه را در شرایط تنش خشکی گزارش نمودند. آنها اظهار داشتند که باروری خوشه چه در شرایط تنش خشکی نه تنها نشان دهنده شدت تنش کم آبی است، بلکه به عنوان مهم ترین عامل تعیین کننده عملکرد دانه نیز می باشد. در ژنوتیپ های گروه اخیر علاوه بر صفات فوق، طول خروج خوشه از غلاف نیز پایین تر از میانگین کل ژنوتیپ ها بود. در این راستا بارناباس و همکاران (Barnabás *et al.*, 2008) اظهار داشتند که افزایش طول خروج خوشه از غلاف و شکوفایی بساک از شاخص هایی هستند که باعث حساسیت گیاه به تنش خشکی در مرحله خوشه دهی می شوند، بنابراین می توان نتیجه گرفت یکی از سازوکارهای مقابله ژنوتیپ های اخیر با تنش خشکی، کاهش طول خروج خوشه از غلاف بوده است. البته کاهش طول خروج خوشه از غلاف باعث افزایش عقیمی خوشه چه ها می شود، زیرا خوشه چه های درون غلاف نمی توانند گرده افشانی خود را تکمیل نمایند و پوک باقی می ماند (Guimarães *et al.*, 2016). در ژنوتیپ های گروه سوم همچنین میزان طول و عرض برگ پرچم کمتر از میانگین بود. در این راستا اظهار شده است که گیاهان کوچک با سطح برگ کمتر و شاخص سطح برگ پایین تر در مناطق کم آب، به طور نسبی آب کمتری مصرف می کنند و کاهش شاخص سطح برگ می تواند یکی از سازوکارهای تحمل آنها به تنش کمبود آب باشد (Blum and Sullivan, 1986). با استفاده از تجزیه به عامل ها نیز ملاحظه شد که در شرایط تنش خشکی، طول و عرض برگ پرچم دارای ضرایب منفی در عامل اول (عملکرد دانه) بودند، بنابراین یکی از پاسخ های گیاه به تنش خشکی و افزایش تحمل آن، کاهش سطح برگ بوده است. ژنوتیپ ۱ (لاین TM6-230-VE-7-5-1) به طور مجزا در گروه چهارم قرار داشت که دارای بیشترین طول و

خروج خوشه از غلاف را داشتند. ژنوتیپ های گروه دوم از لحاظ صفات طول خروج خوشه از غلاف و تعداد دانه پر نسبت به ژنوتیپ های دیگر برتری داشتند. با وجود آنکه میانگین تعداد دانه در خوشه در ژنوتیپ های این گروه بیشتر از سایر گروه ها بود، عملکرد آن نسبت به گروه های سوم و چهارم پایین تر بود. علت این موضوع می تواند ناشی از درصد باروری پایین خوشه و به عبارتی تعداد زیادتر دانه های پوک در خوشه باشد که می تواند از تبعات تنش خشکی انتهای فصل باشد. در مجموع در گروه های اول و دوم ژنوتیپ ها دارای بیشترین تعداد دانه در خوشه و در عین حال درصد باروری خوشه پایین تری بودند. این نتیجه در تطابق با گزارش گومارز و همکاران (Guimarães *et al.*, 2016) است که اظهار نمودند در شرایط تنش خشکی در خوشه های دارای تعداد دانه بیشتر، درصد عقیمی خوشه چه ها نیز بیشتر است. این موضوع نشان می دهد که برای شرایط آب و هوایی و خاکی محل اجرای آزمایش، عدم انتقال کربوهیدرات ها در شرایط تنش خشکی به اندازه کافی پاسخگوی تقاضای مخازن ذخیره سازی کربوهیدرات ها (دانه ها) نبوده است (Guimarães *et al.*, 2016). عقیمی دانه گرده، عدم گرده افشانی و سقط جنین نیز می تواند از سایر دلایل کاهش تعداد دانه های پر در شرایط تنش خشکی باشد (Nguyen and Sutton, 2009). در گروه سوم ژنوتیپ هایی قرار داشتند که بیشترین درصد باروری خوشه را داشتند. بعلاوه عملکرد دانه ژنوتیپ های این گروه بیشتر از میانگین عملکرد آنها در شرایط تنش بود و پس از گروه چهارم در رتبه دوم از نظر عملکرد دانه قرار داشتند. این ژنوتیپ ها کمترین تعداد دانه پوک را داشتند. تمام این صفات در عامل اول (عملکرد دانه) حاصل از تجزیه به عامل ها قرار داشتند، بنابراین می توان نتیجه گرفت که با انتخاب بر اساس عامل اول در شرایط تنش خشکی می توان به ژنوتیپ هایی با عملکرد بالاتر و متحمل به تنش خشکی

واقع گروه سوم و چهارم به دلیل داشتن بیشترین طول دانه، می‌توانند در برنامه‌های اصلاحی مورد توجه قرار گیرند. ژنوتیپ‌های این دو گروه را با توجه به دارا بودن اکثر صفات مطلوب در شرایط تنش خشکی و همچنین عملکرد بالا، می‌توان ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی در نظر گرفت. کلیه ژنوتیپ‌های واقع در گروه پنجم دارای بیشترین مقادیر برخی از صفات مورفولوژیک مانند ارتفاع بوته، طول میانگره، تعداد دانه پوک در خوشه و شکل دانه و کمترین عملکرد دانه بودند. در این گروه علاوه بر کمترین میزان عملکرد دانه، میزان باروری خوشه نیز حداقل بود، بنابراین ژنوتیپ‌های واقع در این گروه، با توجه به ارزش پایین تر عملکرد و ارزش بالاتر صفات نامطلوب، جزء ژنوتیپ‌های حساس به خشکی در نظر گرفته شدند. در تطابق با این نتیجه بارناباس و همکاران (Barnabás *et al.*, 2008) اظهار داشتند که کاهش عملکرد در اثر تنش خشکی به دلیل نقصان در تشکیل بذرهاست.

عرض برگ پرچم، طول و عرض دانه و عملکرد دانه بود و از نظر این صفات نسبت به سایر ژنوتیپ‌های مورد مطالعه برتری داشت. این ژنوتیپ کمترین طول میانگره و ارتفاع بوته بعد از گروه اول را داشت. با توجه به همبستگی منفی و معنی‌دار بین ارتفاع بوته، طول میانگره و تعداد دانه پوک با عملکرد دانه، ژنوتیپ‌های واقع در گروه‌های سوم و چهارم دارای اهمیت اصلاحی از نظر پاکوتاهی و درصد باروری بالا در شرایط تنش خشکی محسوب می‌شوند. وجود ساقه‌های کوتاه و محکم باعث مقاومت بیشتر برنج در مقابل خوابیدگی بوته (ورس) می‌شود و یک گیاه پابند حساسیت بیشتری به خوابیدگی دارد. در این ارتباط مشخص شده است که ارقام پاکوتاه تنفس ساقه کمتری داشته و در نتیجه عملکرد دانه آنها بیشتر است (Guimarães *et al.*, 2010). از معیارهای بازارپسندی و از خصوصیات مهم کیفیت ظاهری دانه برنج، بیشتر بودن طول دانه‌ها و کشیده بودن آنها است. بر این اساس نیز ژنوتیپ‌های

جدول ۵- میانگین صفات گیاهی ژنوتیپ‌های برنج در دسته‌های حاصل از تجزیه خوشه‌ای به روش وارد در شرایط تنش خشکی

Table 5. Mean of plant characteristics of rice genotypes clusters using Ward's method in drought stress condition

Plant characteristics	صفات گیاهی	دسته cluster					کل Total
		1	2	3	4	5	
Plant heigh (cm)	ارتفاع بوته	128.9	137.5	131.1	129.0	141.3	133.2
Internode length(cm)	طول میانگره	41.0	39.1	36.8	31.7	42.8	39.2
Flag leaf length(cm)	طول برگ پرچم	28.8	31.4	25.6	31.7	30.9	29.2
Flag leaf width(cm)	عرض برگ پرچم	1.0	1.1	1.0	1.1	1.5	1.0
No. of tillers	تعداد پنجه	17.0	13.9	15.9	16.3	12.5	15.5
Panicle lenght	طول خوشه	27.9	27.8	27.3	24.8	29.3	27.7
Panicle exsertion(cm)	خروج خوشه از غلاف	6.0	7.4	6.3	7.0	7.2	6.6
No. of filled grains	تعداد دانه پر	78.1	80.9	76.3	51.7	56.3	74.6
No. of unfilled grains	تعداد دانه پوک	32.1	30.1	17.0	30.7	46.7	29.7
Panicle fertility(%)	درصد باروری خوشه	70.8	74.2	80.9	62.9	55.3	71.8
Grain length(mm)	طول دانه	10.0	9.8	10.1	10.4	9.6	9.9
Grain width(mm)	عرض دانه	2.3	2.5	2.6	2.7	2.2	2.4
Grain shape	شکل دانه	4.3	3.9	3.8	3.8	4.3	4.1
Grain yield(kg.ha ⁻¹)	عملکرد دانه	1656.3	1939.5	2227.6	2788.3	684.5	1816.8
Genotypes No.	شماره ژنوتیپ‌ها	8, 9, 10, 12, 16, 18	5, 6, 11, 13, 17	2, 3, 4, 7	1	14, 15	
No. of genotypes	تعداد ژنوتیپ‌ها	6	5	4	1	2	18


و ۷ (TM6-B-2-1-E)، ۴ (TM6-250-10-7-1)، ۳ (VE-8-4-1) و ۷ (HM5-250-E-1-1) دارای عملکرد بیشتری در

در آزمایش حاضر، چهار ژنوتیپ با عملکرد بالا در شرایط بدون تنش (شامل ژنوتیپ‌های ۲ (TM6-230-)

ناشی از توقف تقسیم و رشد سلولی است که در پی کاهش فشار آماس رخ می‌دهد. این موضوع به ویژه در شرایط تنش شدید که تنظیم اسمزی قادر به ثابت نگه داشتن آماس سلول نباشد، چشمگیرتر است (Jaleel *et al.*, 2009).

برای بررسی صحت گروه‌بندی‌ها علاوه بر آماره‌های F کاذب، T^2 کاذب هتلینگ و RMSSTD، از تجزیه تابع تشخیص نیز استفاده شد. از این تجزیه همچنین برای شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش خشکی نیز استفاده شد. در هر دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی، تجزیه تابع تشخیص روی پنج گروه انجام شد و نتایج نشان داد گروه‌بندی ژنوتیپ‌های برنج بر اساس دندروگرام تجزیه خوشه‌ای، ۱۰۰ درصد صحیح بود. در تطابق با نتیجه تحقیق حاضر، محققان دیگری نیز با استفاده از تجزیه تابع تشخیص صحت گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها را در تجزیه خوشه‌ای گزارش نموده‌اند (Mohammadi *et al.*, 2006; Agahi *et al.*, 2012).

شرایط تنش خشکی نیز بودند و در گروه‌های دارای عملکرد بالاتر از سایر ژنوتیپ‌ها و سایر صفات مطلوب نظیر درصد باروری خوشه بالا و دانه‌های کشیده‌تر قرار گرفتند. میانگین عملکرد این ژنوتیپ‌ها در شرایط بدون تنش و تنش خشکی به ترتیب ۴۷۳۹/۹ و ۲۲۲۷/۶ کیلوگرم در هکتار بود و کاهش عملکرد آنها در شرایط تنش خشکی ۵۳ درصد بود، در حالی که میزان کاهش عملکرد برای کلیه ژنوتیپ‌ها ۶۰ درصد بود. بنابراین حفظ پتانسیل عملکرد این ژنوتیپ‌ها در شرایط تنش خشکی در مقایسه با سایر ژنوتیپ‌ها، می‌تواند دلیلی بر تحمل ژنوتیپ‌های فوق نسبت به تنش خشکی باشد (Guimarães *et al.*, 2016). در تطابق با این نتیجه، جونگدی و همکاران (Jongdee *et al.*, 2006) اظهار داشتند که ارقام دارای عملکرد بالا در شرایط بدون تنش می‌توانند برای شرایط تنش رطوبتی نیز در نظر گرفته شده و در هر دو شرایط مورد ارزیابی قرار گیرند. تغییرات مورفولوژیکی گیاه در پاسخ به تنش کمبود آب مانند کاهش ارتفاع بوته و کاهش سطح برگ



شکل ۳- گروه‌بندی ژنوتیپ‌های برنج بر اساس روش تابع تشخیص در شرایط بدون تنش

Fig. 3. Grouping of rice genotypes using discriminant analysis in non stress condition


بدون تنش در شکل ۴ نشان داده شده است. دسته‌های دوم و سوم از همگرایی مناسبی برخوردار بودند، اما در

نتایج حاصل از توابع اول و دوم تشخیص در دسته‌بندی ژنوتیپ‌های برنج مورد مطالعه در شرایط

رابطه با مطالعات ژنتیکی تحمل به خشکی، یکی از مهم‌ترین اقدامات ایجاد جمعیت در حال تفرق و بدست آوردن نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی است و جمعیتی می‌تواند حداکثر تفرق را نشان دهد که والدین آن از نظر تحمل خشکی کاملاً متفاوت از هم باشند (تلاقی متحمل‌ترین و حساس‌ترین ژنوتیپ‌ها) (Mohammadi *et al.*, 2006)، گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها در گروه‌های مختلف باعث افزایش کارایی انتخاب والدین تلاقی‌ها می‌شود، بنابراین بیشترین هتروزیس مورد انتظار می‌تواند از تلاقی بین ژنوتیپ‌های گروه سوم با ژنوتیپ‌های گروه اول و یا پنجم حاصل شود.

دسته‌های اول و چهارم مقداری پراکنش نسبت به مرکز دسته وجود داشت. دسته پنجم در فاصله نسبتاً بیشتری از چهار دسته دیگر قرار گرفت. بیشترین فاصله بین دسته‌های دوم و پنجم و بیشترین قرابت بین دسته‌های اول و چهارم وجود داشت.

نتایج حاصل از توابع اول و دوم تشخیص در دسته‌بندی ژنوتیپ‌های برنج مورد مطالعه در شرایط تنش حاکی از همگرایی مناسب درون دسته‌های دوم و پنجم و تا حدودی سوم و پراکنش درون دسته اول نسبت به مرکز دسته بود. بیشترین فاصله بین دسته‌های چهارم و پنجم و بیشترین قرابت بین دسته‌های دوم و سوم وجود داشت (شکل ۵). با توجه به اینکه در



شکل ۴- گروه‌بندی ژنوتیپ‌های برنج بر اساس روش تابع تشخیص در شرایط تنش خشکی

Fig. 4. Grouping of rice genotypes using discriminant analysis in drought stress condition

موقعیت آنها به پایین مرکز مختصات منتقل شده باشد، حساس به خشکی و ژنوتیپ‌هایی که نزدیک محور مختصات باشند، پایدار و ژنوتیپ‌های منتقل شده به بالای محور مختصات، متحمل به تنش خشکی بودند. بر این اساس در آزمایش حاضر ژنوتیپ‌های ۲ (TM6-230-VE-8-4-1)، ۳ (TM6-250-10-7-1)، ۴ (TM6-B-2-)

تجزیه تشخیص علاوه بر استفاده در شناسایی تنوع ژنوتیپ‌ها، برای ارزیابی تحمل تنش نیز می‌تواند استفاده شود. راجیو و همکاران (Rajiv *et al.*, 2010) با مقایسه موقعیت ژنوتیپ‌های برنج در نمودار پراکنده‌گی تجزیه تشخیص در شرایط بدون تنش و تنش خشکی نشان دادند که ژنوتیپ‌هایی که در شرایط تنش خشکی

در شرایط بدون تنش، ژنوتیپ‌های واقع در گروه سوم شامل لاین‌های ۱ (TM6-230-VE-7-5-1)، ۴ (TM6-B-1) (2-1-E)، ۳ (TM6-250-10-7-1)، ۵ (TM6-B-7-1) و ۱۸ (گیلانیه)، از نظر دو عامل اول و سوم برتر بودند. در شرایط تنش خشکی نیز ژنوتیپ‌های واقع در گروه‌های سوم و چهارم شامل لاین‌های ۳ (TM6-250-10-7-1)، ۴ (TM6-B-2-1-E)، ۲ (TM6-230-VE-8-4-1) و ۷ (HM5-250-E-1-1) و ۱ (TM6-230-VE-7-5-1) با متوسط عملکرد بالا و صفات مطلوبی نظیر پاکوتاهی، درصد باروری خوشه بالا، طول خروج خوشه از غلاف پایین، از نظر دو عامل اول و دوم برتر بودند و ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی ارزیابی شدند. نتایج دیگر تحقیق حاضر این بود که ارقام هاشمی، طارم محلی، خزر و گیلانیه جزء ژنوتیپ‌های حساس به خشکی ارزیابی شدند، در حالی که لاین‌های حاصل از آنها از تحمل بیشتری به تنش خشکی برخوردار بودند. با توجه به اینکه، نتایج تجزیه تشخیص مویید وجود فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپ‌های گروه سوم با گروه‌های اول و پنجم در شرایط تنش خشکی بود، از ژنوتیپ‌های مربوط به این گروه‌ها می‌توان برای پیشبرد برنامه‌های اصلاحی در توسعه ارقام جدید استفاده کرد.

۱۱ (HM5-300-E-1)، ۱۳ (HM5-300-5-1)، ۵ (TM6-B-7-1)، ۶ (TM6-B-19-2) و ۱۷ (طارم محلی) متحمل به تنش خشکی و ژنوتیپ‌های ۸ (HM5-250-E-1) (3-2)، ۹ (HM5-250-7-1)، ۱۰ (HM5-250-7-6)، ۱۲ (HM5-300-3-1)، ۱۶ (هاشمی) و ۱۸ (گیلانیه) حساس به تنش خشکی بودند.

نتیجه‌گیری

نتایج آزمایش حاضر نشان داد که در ژنوتیپ‌های برنج مورد ارزیابی در شرایط بدون تنش (آبیاری معمول)، صفات مرتبط با عامل‌های اول و دوم شامل ارتفاع بوته، عرض برگ پرچم، تعداد دانه پوک، درصد باروری خوشه، طول میانگره، تعداد پنجه‌ها و عملکرد دانه بودند. در شرایط تنش خشکی نیز دو عامل اول و دوم شامل صفات عملکرد دانه، عرض دانه، درصد باروری خوشه، شکل دانه، تعداد دانه پوک در خوشه، عرض برگ پرچم، ارتفاع بوته، طول میانگره، طول برگ پرچم و طول خوشه بودند. بنابراین در نسل‌های اولیه اصلاحی می‌توان از عامل‌های یاد شده و صفات تشکیل‌دهنده هر کدام از آنها به عنوان معیارهای گزینش جهت بهبود ژنتیکی عملکرد دانه در برنج استفاده نمود. نتایج تجزیه خوشه‌ای نشان داد که

References

- Agahi, K., M. H. Fotoukian and Z. Younesi. 2012.** Study of genetic diversity and important correlations of agronomic traits in rice genotypes (*Oryza sativa* L.) Iran. J. Biol. 25: 1.97-110. (In Persian with English abstract).
- Allahgholipour, M., M. S. Mohammad-Salehi and A. A. Ebadi. 2004.** An evaluation of genetic diversity and classification of rice varieties. Iran. J. Agric. Sci. 35(4): 973-981. (In Persian with English abstract).
- Allahgholipour, M. and M. S. Mohamad-Salehi. 2004.** Factor and path analysis in different rice genotypes. Seed Plant J. 19(1): 76-86. (In Persian with English abstract).
- Barnabás, B., K. Jäger and A. Fehér. 2008.** The effect of drought and heat stress on reproductive processes in cereals. Plant Cell Environ. 31: 1.11-38.
- Behpouri, A., M. Kheradnam and E. Bijanzadeh. 2007.** Evaluation of genetic variation in rice (*Oryza sativa* L.)

منابع مورد استفاده

- genotypes using some of agronomic and morphological traits. J. Agric. Sci. 12: 4.799-809. (In Persian with English abstract).
- Blum, A. and C. Y. Sullivan. 1986.** The comparative drought resistance of sorghum and millet from humid and dry regions. Annal. Bot. 57: 835-846.
- Cha-um, S., S. Yooyongwech and K. Supaibulwatana. 2012.** Water-deficit tolerant classification in mutant lines of indica rice. Sci. Agric. 69(2): 135-141.
- Domingo C., F. Andrés and M. Talón. 2007.** Rice cv. Bahia mutagenized population: a new resource for rice breeding in the Mediterranean basin. Span. J. Agric. Res. 5(3): 341-347.
- El-Degwy, I. S. 2013.** Mutation induced genetic variability in rice (*Oryza sativa* L.). Int. J. Agric. Crop Sci. 5 (23): 2789-2794.
- Farshadfar, A. 2002.** Multivariate Principles and Procedures of Statistics. Tagh Bostan Press, Kermanshah, Iran. (In Persian).
- Ghorbani, H., H. A. Samizadeh Lahiji, B. Rabiei and M. Allahgholipour. 2011.** Grouping different rice genotypes using factor and cluster analyses. Sustain. Agric. Prod. Sci. 21(3): 89-104. (In Persian with English abstract).
- Guimarães, C. M., A. P. Castro, L. F. Stone and J. P. Oliveira. 2016.** Drought tolerance in upland rice: identification of genotypes and agronomic characteristics. Acta Sci. 38(1): 201-206.
- Guimarães, C. M., L. F. Stone, M. Lorieux, J. P. Oliveira, G. C. O. Alencar and R. A. A. Dias. 2010.** Infrared thermometry for drought phenotyping of inter and intra specific upland rice lines. Rev. Bras. Eng. Agríc. Amb. 4(2): 148-154.
- Jackson, J. E. 1991.** A users guide to principal components. John Wiley and Sons Publication, New York.
- Jaleel C. A., P. Manivannan, A. Wahid, M. Farooq, R. Somasundaram and R. Paneerselvam. 2009.** Drought stress in plants: a review on morphological characteristics and pigments composition. Int. J. Agric. Biol. 11: 100-105.
- Jeng, T. L., T. H. Tseng, C. S. Wang, C. L. Cheng and J. M. Sung. 2006.** Yield and grainuniformation in contrasting rice gene types suitable for different growth environments. Field Crop Res. 99: 59-66.
- Jongdee, B., G. Pantuwan, S. Fukai and K. Fischer. 2006.** Improving drought tolerance in rainfed lowland rice: an example from Thailand. Agric. Water Manage. 80(1-3): 225-240.
- Luzi-Kihupi, A., J. A. Zakayo, H. Tusekelege, M. Mkuya, N. J. M. Kibanda, K. J. Khatib and A. Maerere. 2009.** Mutation breeding for rice improvement in Tanzania. Induced Plant Mutations in the Genomics Era. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2009, 385-387.
- Mohammadi, A., E. Majidi, M. R. Bihamta and H. Heidari, 2006.** Evaluation of drought stress on agro - morphological characteristics in some wheat cultivars. Pajouhesh & Sazandeghi, 73: 184-192. (In Persian with English abstract).

- Nguyen, G. N. and B. G. Sutton. 2009.** Water deficit reduced fertility of young microspores resulting in a decline of viable mature pollen and grain set in rice. *J. Agron. Crop Sci.* 195(1): 11-18.
- Rahim Souroush, H., M. Mesbah and A. Hosseinzadeh. 2005.** Study relations among yield and yield component traits in rice. *Iran. J. Agric. Sci.* 35: 4.983-993. (In Persian with English abstract).
- Rajiv, S., P. Thivendran and S. Deivanai. 2010.** Genetic divergence of rice on some morphological and physiochemical responses to drought stress. *Pertanika J. Trop. Agric. Sci.* 33(2): 315 – 328.
- SES. 2002.** Standard Evaluation System for Rice. International Rice Research Institute, Philippines.
- Sharifi, P., H. Dehghani, A. Moumeni and M. Moghaddam. 2013.** Study genetic relations of some of rice agronomic traits with grain yield by some of multivariate analysis. *Iran. J. Crop Sci.* 44(1):169-179. (In Persian with English abstract).
- SPSS. 2008.** The SPSS System for Windows. Release 22.0. SPSS Inc., IBM Company Headquarters, USA.
- Systat. 2014.** Systat 13 Statistical Software. University of Illinois at Chicago, USA.
- Thi Thu Ha, P., D. T. Khang, P. T. Tuyen, L. T. Minh, T. N. Minh, N. T. Lang, B. C. Buu and T. D. Xuan. 2016.** Correlation among agro-morphological variation and genetic diversity of rice (*Oryza sativa* L.) under drought stress. *Int. Letter Nat. Sci.* 58: 42-53.
- Venuprasad, R., M. T. Sta Cruz, M. Amante, R. Magbanua, A. Kumar and G. N. Atlin. 2008.** Response to two cycles of divergent selection for grain yield under drought stress in four rice breeding populations. *Field Crops Res.* 107: 232–244.
- Yilmaz, A. and E. Boydak. 2006.** The effect of cobalt-60 application yield components of cotton (*Gossypium barbadense* L.). *Pak. J. Biol. Sci.* 9(15): 2761-2769.
- Zarea Chahkahi, M. A. 2010.** Multivariate analysis methods in SPSS software. Tehran University Press. (In Persian).

Classification of mutant rice (*Oryza sativa* L.) genotypes under drought stress conditions

Sharifi, P.¹, H. Aminpanah² and A. A. Ebadi³

ABSTRACT

Sharifi, P., H. Aminpanah and A. A. Ebadi. 2017. Classification of mutant rice (*Oryza sativa* L.) genotypes under drought stress conditions. *Iranian Journal of Crop Sciences*. 19(2): 148-164. (In Persian).

The present study was conducted in two separate experiments under drought stress and normal irrigated conditions using randomized complete block design with three replications at Rice Research Institute of Iran in Rasht, Guilan, Iran, during 2014-2015 growing season. Plant materials included 14 mutant lines (7 lines from Hashemi, 6 lines from Tarom and one line from Khazar) and four commercial rice cultivars (Hashemi, Tarom, Khazar and Gilaneh). Factor analysis resulted in five and four main factors for normal irrigated and drought stress conditions, which explained 81.5% and 79.3% of the total variation, respectively. The results indicated that under drought stress and normal irrigated conditions, selection of plants with high grain fertility (%) and panicle length and shorter plant height and internode length leads to increased grain yield. Cluster analysis classified the genotypes into five groups under both conditions. Discriminant function analysis indicated very high accuracy (100%) of grouping based on cluster analysis. The results of different analyses identified rice lines; TM6-230-VE-8-4-1, TM6-250-10-7-1, TM6-B-2-1-E and HM5-250-E-1-1 as superior genotypes with higher grain yield (2227.6 kg.ha⁻¹) and the other desirable traits including high grain fertility (80.9%) and low panicle exertion (6.3 cm) under drought stress condition. The average grain yield of these genotypes was 4739.9 kg.ha⁻¹ in normal irrigated condition. Reduction of grain yield due to drought stress was 53% for these genotypes, and 60% for all of genotypes. Therefore, these selected genotypes can be considered in rice breeding programs to improve drought tolerance germplasm.

Keywords: Cluster analysis, Discriminant analysis, Drought stress, Factor analysis, Grain yield, Rice

Received: April, 2017

Accepted: June, 2017

1. Associate prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran (Corresponding author) (Email: peyman.sharifi@gmail.com)

2. Associate prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

3. Assistant Prof., Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran