

استفاده از مدل‌های رگرسیونی برای شناسایی صفات گیاهی مرتب با عملکرد دانه ژنوتیپ‌های باقلا (*Vicia faba L.*)

Identification of plant characteristics related to seed yield of faba bean (*Vicia faba L.*) genotypes using regression models

صفورا جافرنوده^۱، فاطمه شیخ^۲ و افشین سلطانی^۳

چکیده

جافرنوده، ص.، ف. شیخ و ا. سلطانی. ۱۳۹۶. استفاده از مدل‌های رگرسیونی برای شناسایی صفات گیاهی مرتب با عملکرد دانه ژنوتیپ‌های باقلا (*Vicia faba L.*). مجله علوم زراعی ایران. ۱۴(۳): ۲۱۸-۲۱۰.

در برنامه‌های به نزدیکی، برآورد میزان افزایش عملکرد بر اساس تغییر در صفات مؤثر گیاهی از اهمیت بالایی برخوردار است که با استفاده از مدل سازی رگرسیونی می‌توان آنها را شناسایی کرد. به همین منظور ۵۲ ژنوتیپ متنوع باقلا در یک آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در بهار سال ۱۳۹۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه رگرسیونی نشان داد که عملکرد دانه می‌تواند از ۱۶۶۵ کیلوگرم در هکتار تا ۲۸۸۰ کیلوگرم در هکتار قرار گیرد. نتایج تجزیه رگرسیونی نشان داد که عملکرد دانه از اتفاقع بوت، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و تعداد روز تا گل دهی، می‌توانند باعث افزایش عملکرد دانه ژنوتیپ‌های باقلا شوند. نتایج نشان داد که اثر مشت مطلوب‌سازی صفات یاد شده با دامنه افزایش عملکرد دانه مشاهده شده در آزمایش مزرعه‌ای، مطابقت داشته و بین صفات نیز همبستگی منفی وجود نداشت. سهیم هر یک از صفات در افزایش عملکرد برای اتفاقع بوت، تعداد غلاف در بوته ۳۴۴ کیلوگرم در هکتار، تعداد دانه در غلاف ۳۲۷ کیلوگرم در هکتار و تعداد روز تا گل دهی ۴۱ کیلوگرم در هکتار بود. نتایج این آزمایش نشان داد که با استفاده از مدل سازی رگرسیونی می‌توان سودمندی برنامه‌های به نزدیکی باقلا را در منطقه اجرای آزمایش بهبود داد.

واژه‌های کلیدی: اتفاقع بوت، باقلا، رگرسیون گام به گام، ژنوتیپ و همبستگی صفات.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی شماره ۰۳-۹۳۰۵-۰۵۷-۰۳-۰۵۷-۰۷۱۹ این مقاله مخصوص تحقیقات اصلاح و نهال و بندر گرگان - گلستان می‌باشد.
۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۲- استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
۳- استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (مکاتبه کننده) (پست الکترونیک: afsoltani@yahoo.com)

دانه لاین‌های نخود با صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، عملکرد ماده خشک، ارتفاع بوته، تعداد شاخه‌های فرعی و شاخص برداشت، همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود داشت. در آزمایش کیان‌بخت و همکاران (2014) (Kiyankhah et al., 2014) عملکرد دانه باقلا همبستگی مثبت و معنی‌داری با عملکرد ماده خشک ($r=0.91^{**}$ ، تعداد غلاف سبز ($r=0.91^{**}$ ، تعداد غلاف در بوته ($r=0.92^{**}$ ، ارتفاع بوته ($r=0.83^{**}$) و تعداد شاخه در بوته ($r=0.72^{**}$) وجود داشت. احمد و همکاران (Ahmed et al., 2010) نیز گزارش کردند که در گیاه باقلا، افزایش عملکرد دانه خشک و دانه سبز تحت تأثیر متقابل اجزای عملکرد، به خصوص تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته و وزن دانه می‌باشد. در آزمایش نین‌هیوس و سینگ (Nienhuis and Singh, 1988)، بین عملکرد دانه لوپیا با تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود داشت. بین عملکرد دانه انواع حبوبات (لوپیا قرمز، لوپیا سفید، عدس) و تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف رابطه مثبتی گزارش شد (Ebrahimi et al., 2011).

برای تجزیه و تحلیل اجزای عملکرد روش‌های مختلف وجود دارد که انتخاب روش مناسب بستگی به هدف تحقیق دارد. یکی از این روش‌ها، تجزیه رگرسیون گام به گام است. شناسایی صفات مناسب می‌تواند بنای انتخاب در برنامه‌های اصلاحی باشد و برای افزایش عملکرد دانه مورد استفاده قرار گیرد. پیرزاده مقدم و همکاران (Pirzadeh Moghaddam et al., 2014) در ارزیابی صفات مؤثر بر عملکرد دانه نخود با استفاده از تجزیه رگرسیون گام به گام گزارش کردند که صفات شاخص برداشت، روز تا غلاف‌دهی، تعداد شاخه‌های اولیه و تعداد دانه در بوته، مؤثرترین صفات بر عملکرد دانه نخود است که ۵۷ درصد از تغییرات عملکرد دانه

مقدمه

باقلا (Vicia faba L.) با تأمین پروتئین و املالع معدنی مانند کلسیم و دوپامین، نقش مهمی در تغذیه انسان دارد. وجود ژرم پلاسم غنی باقلا در خزانه‌های ژنی کشور، معرفی تیپ مطلوب با قابلیت برداشت ماشینی و مقاوم به بیماری‌ها با عملکرد دانه بالا را امکان‌پذیر می‌کند. باقلا گیاه بسیار مناسی برای تناوب با غلات محسوب شده و علاوه بر افزودن نیتروژن به خاک (بیش از ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار)، قابلیت کشت و تولید محصول در اراضی کم بازده را داشته و باعث شکسته شدن چرخه بسیاری از بیماری‌های شایع در غلات می‌شود. در صورتی که جمعیت نماتدهای خاک در اثر افزایش سهم غلات در تناوب، افزایش یابد، قرار دادن باقلا در تناوب، باعث کاهش جمعیت نماتدها و آفات شده و باعث کاهش مصرف سموم شیمیایی می‌شود (Singh et al., 2013). خزانه‌های ژنی متنوعی از لاین‌های جدید باقلا طی سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۴ وارد ایران شده‌اند (Sheikh, and Sekhavat, 2017). بین این لاین‌ها تنوع زیادی از لحاظ مقاومت به بیماری‌ها، فرم بوته، تعداد غلاف در بوته، قابلیت برداشت ماشینی، میزان پروتئین دانه، عدم وجود مواد ضد تغذیه‌ای در دانه و وزن صد دانه، وجود دارد. شناسایی تیپ مطلوب و تنوع بالای ژنوتیپ‌های جدید این امکان را می‌دهد که از این مجموعه متنوع، ژنوتیپ‌هایی انتخاب شوند که با شرایط اقلیمی و زراعی کشور تطابق بیشتری داشته و پتانسیل تولید محصول بیشتری را داشته باشند. در نتیجه با معرفی ارقام سازگار و پرمحصول می‌توان سطح زیر کشت، عملکرد در واحد سطح و تولید این محصول را در کشور افزایش داد.

فیزیولوژیست‌ها و متخصصان اصلاح نباتات در پی شناسایی صفاتی هستند که باعث تولید عملکرد بالاتر در ارقام جدید، نسبت به ارقام قدیم شوند. در مورد روابط و همبستگی بین صفات، تحقیقات متعددی انجام شده است. نتایج آزمایش کامل و مرادی

به عنوان صفات مؤثر در افزایش عملکرد دانه شناخته شدند (Amiri *et al.*, 2009). در آزمایش یوسل و همکاران (Yucel *et al.*, 2006) همبستگی مثبت و معنی‌داری بین عملکرد دانه نخود با صفات ارتفاع بوته، ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین، تعداد شاخه‌های ثانویه، تعداد غلاف پر و تعداد دانه به دست آمد. در آزمایش نصری و همکاران (Nasri *et al.*, 2012) صفات شاخص برداشت، وزن صد دانه و تعداد دانه در بوته به عنوان صفات تأثیرگذار وارد مدل حاصل از رگرسیون گام به گام شدند. در نتایج آزمایش ترک و همکاران (Turk *et al.*, 2008) صفات شاخص برداشت، عملکرد زیست توده و ارتفاع بوته وارد مدل رگرسیون گام به گام شدند که ۹۵ درصد از تغییرات عملکرد را در ماشک توجیه کردند.

را توجیه می‌کشد. در آزمایش کشاورزی و همکاران (Keshavarznia *et al.*, 2013) صفات تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه، تعداد دانه در غلاف و تعداد گل و در شرایط عدم تنفس، صفات تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه و تعداد دانه در غلاف، بیشترین نقش را در عملکرد دانه لوییا داشتند. بر اساس نتایج آزمایش آنها، وزن صد دانه، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف در دو محیط تنفس خشکی و عدم تنفس، بیشترین اثر را بر عملکرد دانه داشتند. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام در گیاه ذرت نشان داد که صفات وزن هزار دانه و درصد چوب بلال با ضرایب منفی و عمق دانه، وضعیت استقرار و ارتفاع بوته با ضرایب مثبت، ۵۲ درصد از کل تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند و

جدول ۱- اسماء و منشاء ژنوتیپ‌های باقلایی مورد ارزیابی

Table 1. Name and origin of faba bean genotypes

ردیف No.	کد ژنوتیپ Genotype code	منشاء Origin	ردیف No.	کد ژنوتیپ Genotype code	منشاء Origin
1	GF-10	مصر Egypt	27	GF-517-2	ایران-گرگان Iran
2	GF-12	ICARDA ایکاردا	28	GF-518	ایران-گرگان Iran
3	GF-25	ICARDA ایکاردا	29	GF-519	ایران-گرگان Iran
4	GF-40	ICARDA ایکاردا	30	GF-520-1	ایران-گرگان Iran
5	GF-57	ICARDA ایکاردا	31	GF-520-2	ایران-گرگان Iran
6	GF-58	ICARDA ایکاردا	32	GF-521	ایران-گرگان Iran
7	GF-62	ICARDA ایکاردا	33	GF-522	ایران-گرگان Iran
8	GF-94	ICARDA ایکاردا	34	GF-523	ایران-گرگان Iran
9	GF-96	ICARDA ایکاردا	35	GF-524	ایران-گرگان Iran
10	GF-98	ICARDA ایکاردا	36	GF-525	ایران-گرگان Iran
11	GF-104	ICARDA ایکاردا	37	GF-247-1	ایکاردا ICARDA
12	GF-112	ICARDA ایکاردا	38	GF-247-2	ایکاردا ICARDA
13	GF-114	ICARDA ایکاردا	39	GF-249-1	ایکاردا ICARDA
14	GF-115	ICARDA ایکاردا	40	GF-249-2	ایکاردا ICARDA
15	GF-125	ICARDA ایکاردا	41	GF-256-1	ایکاردا ICARDA
16	GF-139	ICARDA ایکاردا	42	GF-256-2	ایکاردا ICARDA
17	GF-145	ICARDA ایکاردا	43	GF-257-1	ایکاردا ICARDA
18	GF-148	ICARDA ایکاردا	44	GF-257-2	ایکاردا ICARDA
19	GF-161	ICARDA ایکاردا	45	GF-288	ایکاردا ICARDA
20	GF-175	ICARDA ایکاردا	46	GF-333	ایکاردا ICARDA
21	GF-180	ICARDA ایکاردا	47	GF-332	ایکاردا ICARDA
22	GF-204	ICARDA ایکاردا	48	GF-331	ایکاردا ICARDA
23	GF-514-1	ایران-گرگان Iran	49	GF-20	گرگان Gorgan
24	GF-514-2	ایران-گرگان Iran	50	GF-31	ایکاردا ICARDA
25	GF-506	ایران-گرگان Iran	51	GF-234	اکوادور Ecuador
26	GF-517-1	ایران-گرگان Iran	52	GF-235	فرانسه France

به منظور تعیین صفاتی که سهم بیشتری در تغییرات عملکرد دانه دارند، استفاده شد. این روش از جمله روش‌های مرسوم برای انتخاب زیرمجموعه‌ای از متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر یک متغیر تابع می‌باشد (Johnson and Wichern, 1996). روش رگرسیون گام به گام روش تغییریافته از گرینش پیش روند است که در آن در هر گام، کلیه متغیرهای مستقل وارد شده به مدل مجدد از طریق آماره F جزء مربوطه، ارزیابی می‌شود (Rezaei and Soltani, 2008). از رگرسیون مرحله‌ای جهت گرینش متغیرهای با ارزش از میان تعداد زیادی صفت اندازه‌گیری شده به منظور تعیین صفاتی که بیشترین سهم را در توجیه عملکرد دارند، استفاده می‌شود (Johnson and Wichern, 1996). با استفاده از تجزیه رگرسیون گام به گام می‌توان اثر صفات غیر مؤثر یا کم اثر روی عملکرد را در مدل رگرسیونی حذف نموده و تنها صفاتی را که میزان قابل ملاحظه‌ای از تغییرات عملکرد را توجیه می‌کنند، شناسایی کرد (Agrama, 1996).

مقادیر حداقل، حداً کثر، متوسط و سطح معنی‌داری ۱۱ صفت برگزیده و مؤثر بر عملکرد دانه در جدول ۲ ارائه شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SAS و دستورات مربوط به روش‌های نرم‌افزار (Soltani, 2007) انجام شد. در این روش کلیه صفات مؤثر بر عملکرد به عنوان متغیرهای مستقل و عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و در نهایت بهترین مدل‌های رگرسیونی یا معادله‌های تولید شامل ۱ تا m متغیر (در اینجا برابر با ۱۱) مشخص می‌شوند. در هر مرحله انتخاب، بهترین مدل رگرسیونی بر اساس بالاترین R^2 صورت می‌گیرد (Rezaei and Soltani, 2008).

با توجه به اینکه با افزایش تعداد متغیرها (بیشتر از چهار)، تغییرات R^2 معنی‌دار نبود، از مدل رگرسیونی چهار متغیره جهت ارزیابی بیشتر ژنوتیپ‌ها استفاده شد. پس از آن همبستگی بین صفات منتخب و میزان

ژنوتیپ‌های گوناگونی از گیاه باقلا وجود دارد که تها عدد اندکی از آن‌ها در منطقه گرگان کشت می‌شوند، ضمن اینکه مطالعات کافی روی پتانسیل تولید آنها انجام نشده است. در این تحقیق ۵۲ ژنوتیپ جدید باقلا از نظر عملکرد دانه و صفات مرتبط با عملکرد با اهداف؛ برآورد میزان افزایش عملکرد از طریق تغییر در صفات گیاهی، شناسایی صفات برتر مرتبط با عملکرد و تعیین سهم صفات در افزایش عملکرد دانه مورد بررسی قرار گرفتند.

مواد و روش‌ها

در این آزمایش تنوع ژنتیکی و روابط میان عملکرد دانه با صفات کمی و مورفو‌لوژیکی در ۵۲ ژنوتیپ باقلا (*Vicia faba* L.) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. کشت بذر ژنوتیپ‌ها در بهار سال ۱۳۹۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. کد ژنوتیپ‌های مورد ارزیابی و منشأ آنها در جدول ۱ ارائه شده است.

هر کرت شامل چهار خط کاشت دو متری بود. فاصله بین تکرارها سه متر و فاصله بین کرت‌ها نیز یک متر (نکاشت) در نظر گرفته شد. براساس نتایج آزمون تجزیه خاک، ۲۵ کیلوگرم در هکتار کود اوره در زمان کاشت به خاک اضافه شد. به دلیل کم بودن میزان بارش، پنج نوبت آبیاری در مراحل سبز شدن، رشد رویشی، قبل از گل‌دهی، گل‌دهی و غلاف‌دهی، انجام شد. از زمان کاشت تا برداشت ضمن انجام عملیات زراعی، یادداشت برداری‌های لازم در مراحل مختلف رشد و نمو بوته‌ها انجام شد. در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک، صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، عملکرد غلاف سبز، وزن ماده خشک، طول غلاف و وزن صد دانه انجام شد.

در این تحقیق از تجزیه رگرسیون گام به گام

" استفاده از مدل‌های رگرسیونی برای ..."

افزایش عملکرد (درصد) ناشی از آن صفت نسبت به کل افزایش عملکرد، محاسبه شد.

نتایج و بحث

بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول ۲) بین ژنوتیپ‌ها، از نظر اکثر صفات مورد بررسی (به استثنای روز تا غلاف‌دهی و روز تا رسیدگی) تفاوت معنی‌داری وجود داشت. با توجه به این که شرایط محیطی و زراعی برای کلیه ژنوتیپ‌ها یکسان بود، تفاوت در صفات اندازه گیری شده، نشان دهنده تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‌های باقلایی مورد ارزیابی است.

افزایش عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از آن مشخصات صفات به صورت مقادیر متوسط و بهترین حالت که می‌تواند در مدل رگرسیونی عملکرد قرار گیرد، وارد مدل تولید چهار متغیره شدند. بهترین حالت برای صفات با اثر مثبت (مانند ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف)، مقدار حداقل و برای صفات منفی (مانند روز تا گل‌دهی)، بهترین حالت، مقدار حداقل است. با توجه به ضریب رگرسیونی هر صفت در معادله عملکرد در حالت مقدار متوسط و بهترین حالت و تفاضل این دو، مقدار افزایش عملکرد ناشی از اثر بهینه آن صفت مشخص شده و سپس میزان

جدول ۲- صفات گیاهی مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های باقلایی

Table 2. Plant characteristics related to seed yield in faba bean genotypes

Plant characteristics	صفات گیاهی	واحد	متوسط	حداقل	حداکثر	سطح معنی‌داری	
		Unit	Mean	Minimum	Maximum	pr > F	
Day to emergence	روز تا میزباندن	Day	روز	26.6	24	32	0.025°
Day to flowering	روز تا گل‌دهی	Day	روز	98	96	122	<0.0001°°
Day to pod setting	روز تا غلاف‌دهی	Day	روز	138.1	132	145	0.52ns
Day to maturity	روز تا رسیدگی	Day	روز	179.2	170	183	0.32ns
Plant height	ارتفاع بوته	cm	سانتی‌متر	85.4	64	109	<0.0001°°
No. Pod.plant ⁻¹	تعداد غلاف در بوته	No.	عدد	11.6	7	29.9	<0.0001°°
No. Seed.pod ⁻¹	تعداد دانه در غلاف	No.	عدد	3.1	2.1	5.4	<0.0001°°
Pod length	طول غلاف	cm	سانتی‌متر	11.1	5.3	20	<0.0001°°
100 seed weight	وزن ۱۰۰ دانه	g	گرم	119.7	44.4	179.2	<0.0001°°
Biological yield	عملکرد زیست توده	kg.ha ⁻¹	کیلوگرم در هکتار	3789	2000	6600	<0.0001°°
Seed yield	عملکرد دانه	kg.ha ⁻¹	کیلوگرم در هکتار	1665	610	3360	<0.0001°°

صفات مؤثر بر عملکرد دانه ۶۴ ژنوتیپ باقلایی دریافتند که تعداد دانه در غلاف، عملکرد غلاف، ارتفاع بوته و وزن صد دانه مهم‌ترین صفات در تعیین عملکرد دانه بودند.

نتایج نشان داد که حداقل زمان تا مرحله گل‌دهی ۹۶ وحداکثر زمان تا این مرحله ۱۲۲ روز و میانگین زمان لازم برای رسیدن به مرحله گل‌دهی در ژنوتیپ‌های باقلایی ۹۸ روز بود. این صفت با عملکرد دانه رابطه منفی داشت، به عبارت دیگر ژنوتیپ‌هایی که دیرتر وارد مرحله گل‌دهی شدند، عملکرد دانه کمتری داشتند. به نظر می‌رسد در ژنوتیپ‌هایی که گل‌دهی

در تجزیه اولیه، عملکرد زیست توده بیشترین اثر را بر عملکرد دانه داشت، اما به دلیل این که اندازه گیری این صفت برای اصلاح‌گران مشکل است، با کنار گذاشتن این صفت و تجزیه و تحلیل مجدد، رابطه ۱ به دست آمد.

$$Y = 1216.83 - 20.47 R1 + 20.68 PH + 19.79 NPP +$$

رابطه ۱

: عملکرد دانه بر حسب کیلوگرم در هکتار، R1: روز تا گل‌دهی، PH: ارتفاع بوته، NPP: تعداد غلاف در بوته، NSP: تعداد دانه در غلاف می‌باشند. شیخ و سخاوت (Sheikh and Sekhavat, 2017) با ارزیابی

مهم‌ترین جزء عملکرد دانه در باقلاء محسوب می‌شود (Al-Rifaee *et al.*, 2004; Golchin *et al.*, 2013). تنوع بالایی بین ژنوتیپ‌های باقلایی مورد بررسی از لحاظ تعداد غلاف در بوته مشاهده شد (جدول ۲) که این موضوع باتسایع تحقیقات پیلbeam و همکاران (1992) و آلباری و شتیا (Al Barri and Shtaya, 2013) نیز مطابقت دارد. نتایج نشان داد که تغییرات تعداد دانه در غلاف بین ۲/۱ تا ۵/۴ و میانگین آن ۳/۱ عدد بود (جدول ۲). تعداد دانه در غلاف نیز از مهم‌ترین اجزای عملکرد باقلاء محسوب می‌شود. همبستگی مثبت و معنی‌داری بین عملکرد دانه و تعداد دانه در غلاف وجود دارد. عبدالملک و آبوانجا (Abedmlula and Abuanja, 2007) اظهار داشتند که صفت تعداد دانه در غلاف به مقدار زیادی تحت تأثیر عوامل ژنتیکی است. یکی از معیارهای انتخاب ژنوتیپ‌هایی با عملکرد دانه بالا، صفت تعداد دانه در غلاف است. تعداد دانه در غلاف صفتی وابسته به ژنوتیپ بوده و تا حد زیادی مستقل از عوامل محیطی است این صفت به ندرت تحت تأثیر شرایط محیطی تغییر می‌کند (Abdalla *et al.*, 2015; Coelho and Pinto 1989; Berhe *et al.*, 1998; ضرایب همبستگی بین صفات مدل رگرسیونی عملکرد دانه، در جدول ۳ ارائه شده است. از میان چهار صفت موجود در معادله تولید، بین روز تا گل‌دهی و تعداد غلاف در بوته همبستگی مثبت و معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد وجود داشت. بین صفات تعداد غلاف در بوته و دانه در غلاف رابطه مثبت و معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. اجزای عملکرد مستقل از یکدیگر نیستند و افزایش یک جزء به مقدار معین اغلب باعث کاهش در یکی از اجزای عملکرد می‌شود. هر چند که همبستگی رابطه خطی بین صفات را نشان می‌دهد، با این وجود تا حدودی می‌توان به روابط بین اجزای عملکرد پی برداشت. وجود همبستگی بین صفات مختلف گیاهی و

آن‌ها دیرتر شروع می‌شود، در اثر مصادف شدن بخشی از دوره پرشدن دانه با آب و هوای گرم فصل بهار، عملکرد دانه کاهش می‌یابد. در مقابل ژنوتیپ‌هایی که سریع تر وارد مرحله زایشی می‌شوند به دلیل این که دوره رشد آنها سریع تر تکمیل می‌شود، احتمال این که با تنفس گرما و خشکی انتهای فصل (گرمای اوخر خرداد و اواسط تیرماه) مواجه شوند، کمتر است. در ژنوتیپ‌هایی که زودتر وارد مرحله زایشی می‌شوند، دوره گل‌دهی تا انتهای فصل رشد حفظ شده و به همین دلیل عملکرد دانه آنها بالاتر خواهد بود. نتایج نشان داد که کمترین ارتفاع بوته ۶۴ و بیش ترین مقدار آن ۱۰۹ سانتی متر بود. میانگین ارتفاع بوته در ژنوتیپ‌های باقلاء ۸۵/۴ سانتی متر بود. در گیاه باقلاء ارتفاع بوته با تولید گل و عملکرد رابطه مستقیم دارد (Hassan, 1984). افزایش ارتفاع بوته نشان‌دهنده رشد رویشی مناسب گیاه و استفاده بهتر آن از شرایط محیطی است و به همین علت می‌تواند بر عملکرد دانه اثر مثبت داشته باشد. تفاوت ارتفاع بوته بین ژنوتیپ‌های باقلاء در اثر تفاوت ژنتیکی آنها در استفاده از منابع از قبیل عناصر غذایی و رطوبت و تابش خورشیدی است. وجود تنوع در ارتفاع بوته ژنوتیپ‌های باقلاء توسط سایر پژوهش‌گران نیز گزارش شده است (Ghareeb Zeinab and Helal, 2013; Al Barri, and Shtaya, 2014).

نتایج نشان داد که تعداد غلاف در بوته از ۷ تا ۲۹/۹ عدد در بوته متغیر و میانگین آن در ژنوتیپ‌های باقلاء ۱۱/۶ عدد بود. اجزای عملکرد دانه در باقلاء عبارتند از؛ تعداد بوته در مترمربع، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن دانه. تعداد غلاف در بوته در حبوبات نقش چشمگیری در ظرفیت عملکرد دانه دارد. محمدال و همکاران (Mohdal *et al.*, 2004) گزارش کردند که تعداد غلاف در بوته مهم‌ترین جزء عملکرد دانه در باقلاء است. تعداد غلاف در بوته بیش ترین سهم را در تغییرات عملکرد دانه داشته و معمولاً

جدول ۳- ضرایب همبستگی بین صفات گیاهی و عملکرد دانه ژنتیپ‌های باقالا

Table 3. Correlation coefficients between plant characteristics and seed yield of faba bean genotypes

Plant characteristics	صفات گیاهی روز تا گل دهی Day to flowering	تعداد غلاف در بوته ارتفاع بوته Plant height	ارتفاع بوته No. Pod.plant ⁻¹	تعداد دانه در غلاف No. Seed.pod ⁻¹
روز تا گل دهی Day to flowering	1			
ارتفاع بوته Plant height	-0.05 ^{ns}	1		
تعداد غلاف در بوته No. Pod.plant ⁻¹	0.18*	-0.04 ^{ns}	1	
تعداد دانه در غلاف No. Seed.pod ⁻¹	0.13 ^{ns}	0.11 ^{ns}	0.28**	1

ns, *, ** : به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

: Not significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

درصد افزایش عملکرد) برآورد شد. ضریب رگرسیونی برای صفت تعداد غلاف در بوته ۱۹/۷۹ بود (رابطه ۱). مقدار افزایش عملکرد ناشی از بهبود این صفت ۳۴۴/۱ کیلوگرم در هکتار (معدل ۲۸/۳۲ درصد از کل افزایش عملکرد) برآورد شد. ضریب رگرسیون برای صفت تعداد دانه در غلاف ۱۴۵/۵۱ بود که مقدار افزایش عملکرد ناشی از این صفت ۳۲۷/۴ کیلوگرم در هکتار (معدل ۲۶/۹۴ درصد بهبود عملکرد) برآورد شد. ضریب رگرسیونی برای صفت روز تا گل دهی ۲۰/۴۷- بود. منفی بودن ضریب روز تا گل دهی نشان می‌دهد که مقادیر اندک آن مطلوب می‌باشد، بنابراین مقدار بهینه این صفت، معدل مقدار حداقل آن بود (جدول ۴). ضرایب رگرسیونی مربوط به این صفت در دو حالت بهترین و متوسط، در رابطه ۱ قرار داده شد. افزایش عملکرد ناشی از تفاصل عملکرد حالت بهترین و میانگین این صفت، ۴۱/۱ کیلوگرم در هکتار (معدل ۳/۳۸ درصد از کل افزایش عملکرد) برآورد شد. نتایج تجزیه رگرسیونی نشان داد در صورتی که صفات مؤثر بر عملکرد در بهترین حالت خود باشند، عملکرد تیپ مطلوب نسبت به عملکرد میانگین، به میزان ۱۲۱۵/۲ کیلوگرم در هکتار قابل افزایش بوده و از میانگین ۱۶۶۴/۷ به ۲۸۷۹/۹ کیلوگرم در هکتار، خواهد رسید. در تایید این نتایج اضافه می‌شود که بیشترین ارتفاع

برآیند آن‌ها، تعیین کننده کمیت و کیفیت محصول بوده و با ارزیابی همبستگی بین صفات می‌توان بهبود کمیت و کیفیت محصول دست پیدا کرد (Koushki *et al.*, 2016). با استفاده از اطلاعات حاصل از تجزیه همبستگی بین صفات می‌توان بر مبنای بعضی صفات به عنوان شاخص انتخاب، نسبت به گرینش برای صفات دیگر اقدام نمود. همبستگی بین صفات در اصلاح نباتات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عدم وجود همبستگی بین دو صفت بدین معنی است که می‌توان صفتی را بهبود بخشید، بدون اینکه هیچ اثری بر صفت دیگر داشته باشد (Faraji *et al.*, 2012).

مقادیر متوسط، حداقل، حداقل و بهترین مقدار صفات که می‌تواند در مدل رگرسیونی عملکرد دانه قرار گیرد، در جدول ۴ ارائه شده است. بهترین حالت برای صفات با اثر مثبت شامل حداقل ارتفاع بوته، حداقل تعداد غلاف در بوته و حداقل تعداد دانه در غلاف بوده و برای صفت منفی روز تا گل دهی، بهترین حالت، مقدار حداقل است.

برای ارتفاع بوته ژنتیپ‌های باقالا که ضریب رگرسیونی آن ۲۰/۶۸ بودست آمد (رابطه ۱)، میزان عملکرد در حالت‌های میانگین (حالت موجود) و بهینه (ایده‌آل) محاسبه و مقدار افزایش عملکرد ناشی از تفاصل آن‌ها ۴۱/۳۵ کیلوگرم در هکتار (معدل ۵۰/۲۵ کیلوگرم در هکتار)

جدول ۴- میزان عملکرد دانه ژنتیپ‌های باقالا در حالت‌های متوسط و بهترین مقادیر صفات همراه با مقدار و درصد تغییر عملکرد برای هر صفت

Table 4. Seed yield of faba bean genotypes in the mean and the best amount of each characteristics along with the amount and percentage of variation in seed yield

صفات گیاهی Plant characteristics	ضریب Coefficients	صفات مستقل Independent characteristics					عملکرد دانه Seed yield			
		میانگین Mean	حداقل Min.	حداکثر Max.	بهترین Best	میانگین Mean	بهترین Best	مقدار عملکرد kg.ha ⁻¹	میزان تغییرات Variation (%)	
عرض از مبدأ Intercept	1216.83	-	-	-	-	1216.83	1216.83	-	-	
روز تا گل‌دهی Day to flowering	-20.47	98.01	96	122	96	-2006.26	-1965.12	41.14	3.38	
ارتفاع بوته Plant height	20.68	85.4	64	109.7	109.7	1766.07	2268.59	502.52	41.35	
تعداد غلاف در بوته No. Pod.plant ⁻¹	19.79	11.61	7	29	29	229.76	573.91	344.15	28.32	
تعداد دانه در غلاف No. Seed.pod ⁻¹	145.51	3.15	2.10	5.4	5.4	458.35	785.75	327.4	26.94	
عملکرد دانه Seed yield	-	1664.5	610	3360	-	1664.75	2879.96	1215.21	100	

باقلا داشتند. با تعیین سهم نسبی هر صفت در میزان عملکرد دانه باقلا در منطقه اجرای آزمایش مشخص شد که صفات روز تا گل دهی ۳/۲۸ درصد، ارتفاع بوته ۴۱/۳۵ درصد، تعداد غلاف در بوته ۲۸/۳۲ درصد و تعداد دانه در غلاف ۲۶/۹۴ درصد از تغییرات عملکرد ژنتیکی بین صفات دچار تغییرات شود، می‌توان از آن به نفع افزایش عملکرد بهره‌برداری کرد. نتایج روش مورد استفاده در این تحقیق به علت اینکه به تفاوت‌های ژنتیکی بین ارقام توجه دارد، می‌تواند برای متخصصان اصلاح نباتات در جهت بهبود تیپ مطلوب گیاهان زراعی مورد استفاده قرار گیرد. بدینهی است در صورتی که هدف اصلی تعیین تیپ مطلوب باقلا برای منطقه گرگان باشد، بهتر است تعداد بیشتری از ژنتیک‌ها در طی چند سال مورد ارزیابی قرار گیرند.

بوته مربوط به لاین F6 latt/7/08، بیشترین تعداد دانه در غلاف مربوط به ژنوتیپ ۵ (حاصل از تلاقی برکت \times New momomoth) و بیشترین تعداد غلاف در بوته مربوط به ژنوتیپ Flip03-61FB بود، ضمن اینکه بیشترین عملکرد دانه نیز از همین ژنوتیپ (Flip03-61FB) که بیشترین تعداد غلاف در بوته را داشت، به دست آمد (جدول مقایسه میانگین‌ها ارائه نشده است).

نتیجه‌گیری

در این تحقیق با استفاده از مدل رگرسیونی به تعیین صفات مؤثر بر عملکرد دانه باقلا پرداخته شد. طبق نتایج به دست آمده، چهار صفت ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و روز تا گل دهی، بیشترین سهم را در تغییرات عملکرد دانه ژنوتیپ‌های

References

منابع مورد استفاده

- Abdalla, A.A., M.F., Ahmed, M.B., Taha and A.M., Naim. 2015.** Effects of different environments on yield components of faba bean (*Vicia faba* L.). Int. J. Agric. Forest. 5: 1-9.
- Agrama, H.A.S. 1996.** Sequential path analysis of grain yield and its components in maize. Plant Breed. 115: 343-346.
- Amiri, S., S. Nourmohamadi, A.A. Jafari and R. Chukan. 2009.** Correlation, regression and path analysis for grain yield and yield components on early maturing hybrids of grain corn. J. Plant Prod. 16(20): 99-112. (In Persian).
- Ahmed, A.M.O., S.O. Yagoub and A. Olway. 2010.** Seed yielding of faba bean (*Vicia faba* L) cultivars grown in southern Sudan environment (*malakal locality*). J. Boil. Sci. 6(6): 1042-1046
- Al-Rifaee, M., M.A. Turk and A.R.M. Tawara. 2004.** Effect of seed size and plant population density on yield and yield components of local faba bean (*Vicia faba* L. Major). Int. J. Agric. Biol. 6: 294-299.
- AbedImula, A.A. and I.K. Abuanga. 2007.** Genotypic responses, yield stability and association between characters among some of Sudanese faba bean (*Vicia faba* L.) genotypes under heat stress. Int. Agric. Res. Dev. 1-7.
- Al Barri, T. and J.Y. Shtaya. 2013.** Phenotypic characterization of faba bean (*Vicia faba* L.) landraces grown in Palestine. J. Agric. Sci. 5: 110-117.
- Berhe, A., B. Geletu and M. Dejene. 1998.** Associations of some characters with seed yield in local varieties of faba bean. Afr. J. Agric. Res. 6: 197-204.
- Coelho, J.C. and P.A. Pinto. 1989.** Plant density effects on growth and development of winter faba bean (*Vicia*

faba var. *Minor*). *Fabis Newsl.* 25: 26-30.

- Ebrahimi, M., M. Pouryousef, M. Rastgoo and C. Saba. 2011.** The effect of planting date, plant density and weeds on growth indices of soybean (*Glycine max L.*). *J. plant Protection* 26 (2): 178-190.
- Faraji, A., A. Raisi, S. Hezarjeribi and S. Mobasher. 2012.** Oil Crops. Noruzi First edition. Seed and Plant Improvement Institute. 542p. (In Persian).
- Ghareeb Zeinab, E. and A. G. Helal. 2014.** Diallel analysis and separation of genetic variance components in eight faba bean genotypes. *Ann. Agric. Sci.* 59: 147-154.
- Golchin, E., E. Zeinali and K. Pouri. 2013.** Studying grain and green pod yield, and grain yield components as affected by inter- and intra- row spacing in faba bean cv Barakat. *Iran. J. Pulses Res.* 4(1): 9-20.
- Hassan, M.S. 1984.** Introduction of broad beans (*Vicia faba L.*) into the central clay plains of the Sudan. *Acta. Hort.* 19: 199-207.
- Johnson, R.A. and D. W. Wichern. 1996.** Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice Hall. New Dehli, India.
- Kamel, M. and C. Moradi. 2008.** Determining seed traits of 36 lines of chickpea (*Cicer arietinum L.*) in the provinces of North West Iran in dryland conditions. *Seed Plant J.* 24 (2): 347-357.
- Keshavarznia, R., B. Mohamadi Nargesi, and A. Abbasi. 2013.** Bean genetic diversity based on morphological traits under normal and drought stress condition. *Iran. J. Crop Sci.* 44 (2): 305-315.
- Koushki, M.H., B. Asadi, H.R. Dori, A. Molaei, M. Kamel and M.B. Khorshidi Benam. 2016.** Correlation and relationship between grain yield and other quantitative traits white beans in 5 regions of the country. The Sixth National Conference. Legums Iran. Lorestan, Iran. 6 sep. 2016. (In Persian with English abstract).
- Kiyanbakht, M., E. Zeinali, A. Siahmarguee, F. Sheikh and G.M. Pouri. 2014.** Effect of sowing date on grain yield and yield components and green pod yield of three faba bean cultivars in Gorgan climatic conditions. *Electronic J. Crop Prod. (EJCP)*. 8(1): 99-119. (In Persian with English abstract).
- Mohdal, A.R., T. Munira and M. Tahawa. 2004.** Effect of seed size and plant population density on yield and yield components of local faba bean (*Vicia faba L. Major*). *J. Agric. Biol.* 6: 294-299.
- Nienhuis, J. and S.D. Singh. 1988.** Genetic of seed yield and its components in common bean (*Phaseolus vulgaris L.*) of Middle American Origin. *Plant Breed.* 101: 143-163.
- Nasri, R., A. Heidari Moghadam, A. Siadat, F. Paknejad and M. Sadeghi Shoa. 2012.** Path analysis of traits correlation and supplemental irrigation on yield and yield components of chickpea in Ilam. *J. Plant Breed.* 8(2): 161-172.
- Pilbeam, C.J., J.K. Aktase, P.D. Hebblethwaite and S. D. Wright. 1992.** Yield production in two contrasting form of spring-sown faba bean in relation to water supply. *Field Crops Res.* 29: 273-287.
- Pirzadeh Moghaddam, M., A. Bagheri, S. Malekzadeh-Shafaroudi and A. Ganjeali. 2014.** Multivariate statistical analysis in chickpea (*Cicer arietinum L.*) under limited irrigation. *Iran. J. Pulses Res.* 5(2): 99-110. (In Persian with English abstract).

- Rezaei, A. and A. Soltani.** 2008. Introduction to Applied Regression Analysis. Isfahan University Press. Isfahan, Iran. (In Persian).
- Soltani A.** 2007. Application of SAS in Statistical Analysis. JDM Press, Mashhad, Iran. (In Persian).
- Sheikh, F. and R., Sekhavat.** 2017. Preliminary evaluation of faba bean (*Vicia faba* L.) lines. Agricultural Research Education Extension Organization. Seed and Plant Improvement Institute. (In Persian).
- Singh, A. K., R.C. Bharati, N.C. Manibhushan and A. Pedpati.** 2013. An assessment of faba bean (*Vicia faba* L.) current status and future prospect Afr. J. Agric. Res. 50: 6634-6641.
- Turk, M., N. Çelik, G. Bayram and E. Budakli.** 2008. Relationships between seed yield and yield components in Narbon bean (*Vicia narbonensis* L.) by path analysis. Bang. J. Bot. 37(1): 27-32.
- Yucel, D. O., A.E. Anlarsal and C. Yucel.** 2006. Genetic variability, correlation and path analysis of yield and yield components in chickpea (*cicer arietinum* L.). Turk. J. Agric. Forest. 30: 183-188.

Identification of plant characteristics related to seed yield of faba bean (*Vicia faba* L.) genotypes using regression models

Jafarnodeh, S.¹, F. Sheikh² and A. Soltani³

ABSTRACT

Jafarnodeh, S., F. Sheikh and A. Soltani. 2017. Identification of plant characteristics related to seed yield of faba bean (*Vicia faba* L.) genotypes using regression models. *Iranian Journal of Crop Sciences*. 19(3): 208-219. (In Persian).

Quantification of plant characteristics associated with yield increase is important in crop breeding programs. Regression models can be used for this purpose. Different genotypes of faba bean were evaluated using a randomized complete block design with three replications in 2014-2015 in Agriculture Research Station of Gorgan, Gorgan, Iran. Regression model revealed that faba bean seed yield can be increased from 1665 kg.ha⁻¹ to 2880 kg.ha⁻¹ (1215 kg.ha⁻¹ increase). It was found that this increase can be achieved by manipulation of four plant traits, i.e., plant height, pod number per plant, seed number per pod, and days to flowering. There was no significant negative correlation between the traits. Optimizing of these traits, within the observed range in the field experiment, can increase faba bean seed yield by 1215 kg.ha⁻¹. The contribution of each trait in this increase was estimated: plant height by 503 kg.ha⁻¹, pod number per plant by 344 kg.ha⁻¹, seed number per pod by 327 kg.ha⁻¹ and days to flowering by 41 kg.ha⁻¹. It was concluded that using regression models would be helpful for increasing the efficiency of faba bean breeding programs in Gorgan, Iran.

Key words: Correlation, Faba bean, Genotype, Plant height and Stepwise regression

Received: May 2017

Accepted: October 2017

1. Former MSc. Student, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran

2. Assistant Prof., Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran

3. Professors, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran (Corresponding author)
(Email: afsoltani@yahoo.com)