

## اثر دوره‌های کنترل علف‌های هرز بر ساختار و توزیع سطح برگ در لایه‌های مختلف پوشش گیاهی ذرت (*Zea mays* L.)

### Effect of weed free periods on canopy structure and leaf area distribution in maize (*Zea mays* L.)

سعید رضا یعقوبی<sup>۱</sup>، همت ا... پیردشتی<sup>۲</sup>، مرجانه حبیبی سواد کوهی<sup>۳</sup> و شب‌نم قدمیاری<sup>۴</sup>

#### چکیده

یعقوبی، س. ر.، همت پیردشتی، م. حبیبی سواد کوهی و ش. قدمیاری. ۱۳۸۸. اثر دوره‌های کنترل علف‌های هرز بر ساختار و توزیع سطح برگ در لایه‌های مختلف پوشش گیاهی ذرت (*Zea mays* L.). مجله علوم زراعی ایران: ۱۱ (۱): ۱۵-۲۴.

به منظور بررسی اثر دوره‌های مختلف کنترل علف‌های هرز بر ساختار و توزیع سطح برگ ذرت (*Zea mays* L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران در سال زراعی ۱۳۸۵ به اجرا گذاشته شد. تیمارهای آزمایش شامل وجین دستی علف‌های هرز مزرعه تا مراحل چهار، شش، هشت و ده برگی و ظهور گل تاجی در ذرت بود. بعد از رسیدن مراحل ذکر شده، وجین متوقف شده و علف‌های هرز تا زمان برداشت ذرت همراه با آن رشد کردند. کرت‌های عاری از علف‌هرز (وجین کامل) و تداخل تمام فصل ذرت با علف‌های هرز (بدون وجین) نیز به عنوان تیمارهای شاهد در نظر گرفته شدند. داده‌های این آزمایش از طریق اندازه‌گیری سطح برگ ذرت در لایه‌های مختلف پوشش گیاهی (۰-۰/۵، ۰-۱، ۱-۱/۵، ۱-۲، ۲-۱/۵ و بیش از ۲ متر) و ارتفاع بوته در مرحله خمیری دانه ذرت و عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در مرحله رسیدگی دانه ذرت بدست آمدند. نتایج بدست آمده نشان دهنده تاثیر معنی دار دوره‌های کنترل علف‌های هرز بر شاخص سطح برگ کل، شاخص سطح برگ لایه‌های مختلف پوشش گیاهی و ارتفاع بوته ذرت بود. با کوتاه‌تر شدن طول دوره کنترل علف‌های هرز (وجین تا مرحله ۶ برگی)، شاخص سطح برگ، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت به طور معنی داری کاهش یافت. افزایش طول دوره کنترل علف‌های هرز تا مراحل بعد از ۶ برگی، تاثیر معنی داری بر ارتفاع بوته و شاخص سطح برگ لایه‌های مختلف پوشش گیاهی ذرت نداشت ولی با کاهش طول دوره کنترل علف‌های هرز به کمتر از مرحله ۴ برگی، ارتفاع بوته کاهش یافت و بیشترین سطح برگ ذرت در لایه‌های بالاتر پوشش گیاهی آن بدست آمد. در تداخل تمام فصل، ضمن کاهش ارتفاع بوته ذرت بیشترین سطح برگ در آخرین لایه پوشش گیاهی این تیمار (۱-۰/۵ متری) مشاهده شد. به نظر می‌رسد که با کاهش طول دوره کنترل علف‌های هرز و افزایش فشار رقابت از سوی آنها، بیشترین سطح برگ ذرت در لایه‌های ۱-۱/۵ متری پوشش گیاهی مستقر می‌شود تا با سایه اندازی بر علف‌های هرز غلبه نموده و سطح برگ و در نتیجه عملکرد آن حفظ شود.

واژه‌های کلیدی: ذرت، ساختار پوشش گیاهی شاخص سطح برگ، علف هرز، عملکرد و لایه‌های پوشش گیاهی.

تاریخ دریافت: ۱۳۸۷/۴/۱۷

۱- دانشجوی دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس (مکاتبه کننده)

۲- استادیار مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران

۳- دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه مازندران

۴- دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تبریز

## مقدمه

در سیستم های زراعی رقابت بین گونه‌ای ناشی از علف‌های هرز، مهم ترین عامل افت عملکرد در سیستم‌های زراعی است (Bond and Grundy, 2001) و توام با آثار منفی برای گیاه زراعی و علف‌های هرز بوده (Tremmel and Bazzaz, 1993) و بر رشد، تولید و بقای هر گیاه تاثیر مستقیم دارد (Knezevic *et al.*, 2001). علت تفاوت در قدرت رقابت بین گیاهان مربوط به عوامل مختلفی مانند سرعت جوانه زنی، میزان استقرار گیاه، سیستم رشد رویشی، ظرفیت و تعداد پنجه زنی (Lemerle *et al.*, 1996; Dianat *et al.*, 2005) ارتفاع بوته، حجم پوشش گیاهی، شاخص سطح برگ (Lindquist and Mortensen, 1998; Lindquist *et al.*, 1998) و میزان رشد سطح برگ (Kropff *et al.*, 1992, Begna *et al.*, 2001) و سرعت گسترش ریشه‌ها (Ni *et al.*, 2000) می باشد. برنامه های مدیریتی علف‌های هرز باید به صورتی باشد که باعث افزایش توانایی رقابت گیاهان زراعی از طریق تسریع در زمان سبز شدن و استقرار گیاهچه، افزایش ارتفاع و تسریع در گسترش پوشش گیاهی شود (Swanton and wise, 1991). در این میان ساختار پوشش گیاهی که نفوذ نور و توزیع آن در تاج پوشش را تحت تاثیر قرار می دهد و به عنوان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در قدرت رقابت گیاه برای نور مطرح می باشد (Dianat *et al.*, 2005)، نسبت به سایر عوامل کمتر مورد توجه قرار گرفته است (Seavers and Wright, 1999).

در یک آزمایش بر روی قدرت رقابت سیب زمینی و علف‌های هرز مشاهده شد که نتیجه رقابت کاملاً بستگی به توزیع عمودی برگ در پوشش گیاهی سیب زمینی دارد که الگوی جذب نور را تعیین کرده و در اثر رقابت، چگالی سطح برگ (Leaf Area Density) در ارتفاعات بالاتری قرار می گیرد (Haj Seyyed Hadi *et al.*, 2006). در آزمایشی دیگر

درباره قدرت رقابت ذرت و تاج خروس مشاهده شد که زمان ظهور و تراکم بوته تاج خروس روی سطح برگ در طبقات مختلف پوشش گیاهی ذرت تاثیر معنی داری داشت به طوری که با تاخیر در زمان کنترل تاج خروس، سطح برگ بیشتری به طبقات بالایی پوشش گیاهی به ویژه لایه ۱۲۰-۸۰ سانتی متری اختصاص یافت. از طرف دیگر سطح برگ در لایه های زیر ۸۰ سانتی متری، کاهش بیشتری نسبت به لایه های بالای پوشش گیاهی ذرت نشان داد و لایه‌های ۱۶۰-۱۲۰ و بالاتر از ۱۶۰ سانتی متر، کمترین کاهش را نسبت به شاهد نشان دادند. علت این پدیده کاهش نور رسیده به لایه‌های پائین تر پوشش گیاهی و اختصاص کمتر ماده خشک و در نتیجه کمتر شدن سطح برگ در این لایه ها عنوان شد (Rahimi *et al.*, 2006). نتایج سایر تحقیقات نشان داد که گیاهان گاوپنبه‌ای که در شرایط بدون رقابت و نور کافی رشد کرده بودند، بیشترین مقدار سطح برگ را به لایه های پائینی پوشش گیاهی و شاخه های فرعی اختصاص دادند، در صورتی که بوته‌هایی که در شرایط رقابت و کمبود نور رشد کرده بودند، تعداد برگ و ساقه کمتری داشتند و تعداد این برگ ها در لایه های بالایی پوشش گیاهی که نور بیشتری در دسترس بود، بیشتر بود (Steinmaus and Norris, 2002). هدف از انجام این آزمایش بررسی چگونگی و میزان تاثیر تغییر دوره های مختلف کنترل جمعیت طبیعی علف‌های هرز و تاخیر در زمان ظهور آنها در مراحل مختلف رشد ذرت بر ساختار پوشش گیاهی، سطح برگ در لایه های مختلف پوشش گیاهی، ارتفاع بوته و عملکرد اقتصادی و بیولوژیک ذرت در منطقه مورد مطالعه بود.

## مواد و روش ها

این آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران واقع در کیلومتر ۹ جاده خزرآباد (ساری) انجام گرفت. خاک مزرعه از

آبیاری مزرعه به صورت شیاری با فواصل ۱۰ روز یکبار انجام گرفت.

در مرحله خمیری نرم دانه ذرت تعداد ۴ بوته از هر کرت با در نظر گرفتن اثر حاشیه کف بر و به آزمایشگاه انتقال داده شده و ارتفاع آنها اندازه گیری شد. سپس بوته‌ها به بخش‌های ۰/۵-، ۱-، ۰/۵-، ۱-، ۱/۵-، ۲-، ۱/۵-، بیش از ۲ متری از پائین به بالا (سطح زمین به بالاترین نقطه پوشش گیاهی) تقسیم شده و با استفاده از دستگاه اندازه گیری سطح برگ (Li Core 3000, USA)، مساحت برگ‌های هر بخش (لایه‌های مختلف پوشش گیاهی)، اندازه گیری شد. (McLachlan et al., 1993; Haj Seyyed Hadi et al., 2006; Rahimi et al., 2006). برای اندازه گیری عملکرد بیولوژیک، در مرحله رسیدگی دانه، بوته‌های ذرت به مساحت ۲ متر مربع از هر کرت کف بر شده و بعد از خشکانیدن در آون، عملکرد بیولوژیک آنها اندازه گیری شد. عملکرد دانه نیز به همین صورت با در نظر گرفتن ۱۴ درصد رطوبت دانه اندازه گیری شد. داده‌های حاصل از آزمایش با استفاده از نرم افزار آماری SAS تجزیه واریانس شدند. مقایسه میانگین داده‌ها به روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح معنی داری پنج درصد انجام گرفت.

### نتایج و بحث

حضور علف‌های هرز در بین گیاهان زراعی باعث ایجاد رقابت بر سر منابع حیاتی شده و باعث کاهش میزان سهم گیاهان زراعی از این منابع و در نتیجه کاهش رشد و نمو و در نهایت افت عملکرد آنها می‌شود. نتایج آزمایش نشان دهنده تاثیر معنی دار دوره‌های عاری از علف‌های هرز بر شاخص سطح برگ ذرت بود ( $P < 0.01$ ) (جدول ۱). بیشترین مقدار شاخص سطح برگ ذرت در تیمار کنترل تمام فصل علف‌های هرز در حدود ۳/۹ و کمترین مقدار آن در تداخل تمام فصل با علف‌های هرز در حدود ۱/۴ بدست آمد (جدول ۲). دوره‌های مختلف کنترل علف‌های هرز تاثیر معنی داری

نوع لوم رسی با pH خنثی و مواد آلی در حد ۱/۸ درصد بود. این آزمایش که در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا گذاشته شد، دارای پنج تیمار کنترل علف‌های هرز تا مراحل ۴، ۶، ۸ و ۱۰ برگی و ظهور گل تاجی در ذرت و دو تیمار شاهد تداخل (بدون وجین) و کنترل تمام فصل (وجین کامل) علف‌های هرز بود. تمامی علف‌های هرز تا مراحل ذکر شده به طور کامل و به صورت دستی وجین شده و بعد از رسیدن به مراحل یاد شده، وجین متوقف و علف‌های هرز تا زمان برداشت ذرت همراه با آن رشد کردند. گونه‌های مختلف علف‌های هرز در مزرعه آزمایشی، از جمعیت طبیعی علف‌های هرز منطقه که از بانک بذر طبیعی خاک به وجود آمده بودند، برای اعمال شرایط رقابت با گیاه زراعی ذرت استفاده گردید. علف‌های هرز شایع مزرعه عبارت بودند از گاوپنبه (*Abutilon theophrasti* L.)، قیاق (*Sorghum halepense* L.)، تاج خروس (*Amaranthus retroflexus* L.)، پیچک صحرائی (*Convolvulus arvensis* L.)، سلمه تره (*Chenopodium album* L.) و سوروف (*Echinochloa colonum* L.).

بعد از آماده سازی زمین شامل شخم، تسطیح، ایجاد جوی پشته‌ها و مرز بندی، در اواسط اردیبهشت ماه بذر ضد عفونی شده ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ به صورت دستی کاشته شد. هر کرت به طول ۴ متر شامل ۵ ردیف کاشت با فواصل ۷۵ سانتی متر بود. بعد از سبز شدن گیاهچه‌های ذرت، با انجام تنک، تراکم بوته‌ها به ۱۰ بوته در متر مربع رسانده شد. برای حصول عملکرد مناسب، ۵۰ کیلوگرم در هکتار فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل در مرحله قبل از کاشت و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع اوره در سه تقسیط یک سوم قبل از کاشت، یک سوم در مرحله ۶ تا ۷ برگی و بقیه آن در مرحله قبل از ظهور گل تاجی مصرف گردید. در این آزمایش از هیچ نوع علف کشی استفاده نشد.

بر شاخص سطح برگ لایه های مختلف پوشش گیاهی داشت ( $P < 0.01$ ) (جدول ۱).

در کنترل تمام فصل (وجین کامل) بیشترین شاخص سطح برگ در ذرت به لایه ۱-۱/۵ متری پوشش گیاهی اختصاص یافته (۳۰/۳ درصد) و شاخص سطح برگ لایه های بالایی و پایینی پوشش گیاهی به تدریج کاهش یافت به طوری که شاخص سطح برگ در بالاترین لایه پوشش گیاهی (بیش از ۲ متر) ۶/۸ درصد و در پائین ترین لایه، ۱۲/۵ درصد از شاخص سطح برگ کل بود. به نظر می رسد که در حالت بدون رقابت خارجی، بیشترین مقدار سطح برگ گیاه زراعی به بخش های میانی پوشش گیاهی اختصاص می یابد (جدول ۲). نتایج برخی تحقیقات پیشین نیز تائید کننده نتایج حاضر بوده اند (Tremmal and Bazzaz, 1993; Hirose and Werger, 1995). نتیجه یک آزمایش بر روی تداخل ذرت و یک گونه تاج خروس (*Amaranthus palmeri* S.) نشان داد که در شرایط بدون رقابت، بیشترین سطح برگ ذرت به لایه ۱-۱/۵ متری پوشش گیاهی اختصاص یافت (Massinga et al., 2003).

با کاهش طول دوره کنترل تا مراحل ظهور گل تاجی، ۸ و ۱۰ برگی ذرت، تقریباً هیچ تغییری در مقدار شاخص سطح برگ و سطح برگ لایه های مختلف پوشش گیاهی مشاهده نشد. با کاهش طول دوره کنترل علف های هرز تا مرحله ۶ برگی، میزان شاخص سطح برگ در لایه بیش از دو متری پوشش گیاهی به کمتر از یک درصد و در تیمار کنترل علف های هرز تا مرحله ۴ برگی، عملاً به صفر درصد رسیده و در لایه ۱/۵-۲ متری پوشش گیاهی در همین تیمار، به ۱/۱ درصد رسید. در تیمار تداخل تمام فصل علف های هرز با ذرت، شاخص سطح برگ در لایه های بیش از دو متر، ۱/۵-۲ و ۱-۱/۵ متر پوشش گیاهی به طور کامل حذف شدند (جدول ۲). به نظر می رسد که علت حذف لایه های پوشش گیاهی ذکر شده در پی کاهش طول دوره کنترل علف های هرز، به دلیل کاهش در ارتفاع

بوته ذرت بوده است به طوری که در تیمار تداخل تمام فصل، لایه های بیش از دو متر، ۱/۵-۲ و ۱-۱/۵ متر پوشش گیاهی به طور کامل حذف شدند و بیشترین سطح برگ ذرت در بالاترین لایه که در تیمارهای کنترل تا ۶ و ۴ برگی لایه ۱-۱/۵ متری (۴۲ درصد) و در تیمار تداخل تمام فصل لایه ۱-۰/۵ متری (۷۵/۳ درصد) بود، بدست آمد. البته با افزایش تراکم برگ در لایه های ذکر شده، طول میانگروه ها نیز در این لایه ها کاهش یافت (اطلاعات نشان داده نشده است).

نتایج یک آزمایش بر روی گندم نشان داد که بالاترین شاخص سطح برگ در گندم رقم مهدوی (با قدرت رقابت بالا)، در شرایط بدون رقابت در لایه ۹۰-۷۵ سانتی متری مشاهده شد و در شرایط رقابت با چاودار (*Secale cereale*)، بیشترین شاخص سطح برگ آن در لایه ۱۰۵-۹۵ سانتی متری اختصاص داده شد. در مقابل در رقم کرج ۲ (قدرت رقابت پائین)، در شرایط بدون رقابت بیشترین شاخص سطح برگ مربوط به لایه ۷۵-۶۰ سانتی متری بود، که در شرایط رقابت با چاودار به لایه ۶۰-۴۵ سانتی متری کاهش یافت (Dianat et al., 2005).

نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده اهمیت لایه های بالایی پوشش گیاهی در شرایط رقابت با سایر گیاهان است. نتایج برخی از تحقیقات نشان داده است که اهمیت برگ های موجود در هر لایه از پوشش گیاهی با لایه های دیگر متفاوت بوده و کاهش کارایی آنها به هر دلیل می تواند اثرات متفاوتی بر عملکرد و سایر صفات بگذارد (Cirovic and Jovic, 1992).

با کاهش طول دوره کنترل علف های هرز به کمتر از مرحله ۶ برگی ذرت، رقابت برای نور به علت تغییر در میزان و کیفیت نور ورودی به داخل پوشش گیاهی تشدید می شود (Teasdale, 1995; Rajcan et al., 2004) در چنین شرایطی در گیاه زراعی سطح برگ بیشتری به لایه های بالایی پوشش گیاهی اختصاص یافته و با افزایش ارتفاع بوته، دسترسی به نور افزایش می یابد. از

علف‌های هرز و گیاه‌های زراعی در اول فصل از نظر ارتفاع تفاوتی با هم ندارند ولی با گذشت زمان این تفاوت بیشتر شده و باعث ایجاد برتری بین علف‌های هرز و گیاه‌های زراعی می‌شود (Yenish and Young, 2004, Abdollahi and Bararpoor, 2006). در آزمایش حاضر ارتفاع بوته ذرت با کاهش طول دوره کنترل به کمتر از مرحله ۶ برگی، کاهش معنی‌داری داشت (جدول ۲). به نظر می‌رسد که علت اصلی کاهش ارتفاع بوته ذرت، سایه‌اندازی علف‌های هرز گاو‌پنبه بوده باشد، زیرا این علف‌های هرز تنها گونه‌ای بود که نسبت به سایر گونه‌ها بالاترین ارتفاع بوته را داشت (بیشتر از ۲/۵ متر). افزایش سریع ارتفاع بوته‌های گاو‌پنبه، باعث شد که سریع‌تر از ذرت و سایر گونه‌های علف‌های هرز به بالای پوشش گیاهی رسیده و با توجه به پهن و افقی بودن برگ‌های آن سایه‌اندازی شدیدی روی ذرت و گونه‌ها ایجاد شده و از افزایش ارتفاع آنها جلوگیری شد (اطلاعات نشان داده نشده). بنابراین نتایج می‌توان نتیجه گرفت که طول مدتی که مزرعه گیاه‌های زراعی باید عاری از علف‌های هرز باشد، به ارتفاع بوته و سطح برگ علف‌های هرز بستگی دارد که با نتایج تحقیقات گذشته نیز مطابقت دارد (Weaver et al., 1992, Bukun, 2004).

نتایج یک آزمایش روی رقابت گاو‌پنبه و سویا نشان داد که افزایش طول دوره کنترل و تاخیر در سبز شدن گاو‌پنبه تا ۱۰ هفته بعد از کاشت سویا، تأثیری بر ارتفاع بوته‌های سویا نداشت ولی با افزایش طول دوره کنترل و تسریع در سبز شدن گیاهچه‌های گاو‌پنبه، ارتفاع بوته سویا کاهش یافت (Abdollahi and Bararpoor, 2006). نتایج آزمایشی در مورد رقابت پنبه و گاو‌پنبه نشان داد که ظهور گیاهچه‌های گاو‌پنبه بعد از حدود ۴ هفته بعد از کاشت، تأثیر معنی‌داری بر ارتفاع بوته پنبه نداشت (Bailey et al., 2003). نتایج آزمایش دیگری در مورد رقابت پنبه و علف‌های هرز نشان داد که با افزایش طول مدت حضور علف‌های هرز، ارتفاع بوته پنبه کاهش یافت (Bukun, 2004). در یک آزمایش مشاهده شد که

طرف دیگر در پی تشدید رقابت علف‌های هرز و استهلاک بیشتر در نور رسیده به لایه‌های پائینی پوشش گیاهی، برگ‌های گیاه‌های زراعی در لایه مزبور دچار پیری زودرس می‌شوند (Hall et al., 1992) که این موضوع نیز باعث کاهش کارایی برگ‌های موجود در لایه‌های پائینی پوشش گیاهی می‌شود.

نتایج حاصل از آزمایش حاضر نشان داد که علف‌های هرز گاو‌پنبه گونه‌ای بود که بیشترین فشار رقابتی را بر ذرت داشت، زیرا با افزایش سریع ارتفاع آن نسبت به ذرت و سایر گونه‌های هرز، در بالای پوشش گیاهی ظاهر شده و با ایجاد سایه‌اندازی باعث کاهش شاخص سطح برگ ذرت گردید (اطلاعات نشان داده نشده). نتایج یک تحقیق نشان داده است که به ازای افزایش تراکم گاو‌پنبه به میزان ۰/۲۵ عدد در هر متر طول ردیف، شاخص سطح برگ سویا حدود ۱۴ درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت (Abdollahi and Bararpoor, 2006). با توجه به اینکه ذرت گیاهی رشد محدود بوده است (Gupta, 2004) و رشد رویشی و افزایشی شاخص سطح برگ آن در مرحله رویشی انجام می‌شود، حضور و رقابت گونه‌های هرزی که توانایی افزایش سریع ارتفاع بوته و افزایش سریع سطح برگ در طی مرحله رشد رویشی ذرت را دارند، حتی اگر باعث کاهش شاخص سطح برگ ذرت نشوند، باعث تغییر در ساختار آن خواهد شد. در مقابل با افزایش طول دوره کنترل و به تاخیر افتادن زمان ظهور علف‌های هرز، به دلیل سایه‌اندازی بیشتر گیاه‌های هرز پی‌بسته شدن پوشش گیاهی، قدرت رقابت علف‌های هرز کاهش یافته و تا جایی ادامه می‌یابد که اساساً قدرت رقابت با گیاه‌های زراعی را از دست داده و تأثیری بر آن نمی‌گذارد (Marttin et al., 2001, Amador-Ramirez, 2002).

نسبت ارتفاع گیاه‌های زراعی و علف‌های هرز یکی دیگر از عوامل برتری گیاهان نسبت به یکدیگر می‌باشد (Berti and Sattin, 1996; Aguyoh and Masiunas, 2003) زیرا

جدول ۱- نتایج تجزیه واریانس صفات گیاهی ذرت تحت تاثیر طول دوره کنترل علف های هرز

Table 1. Analysis of variance in maize traits under different weed- free periods

S.O.V	منابع تغییر	درجه آزادی df	درصد LAI در لایه های تاج پوشش ذرت of LAI in different canopy layers (%)					شاخص سطح برگ کل Total LAI	عملکرد دانه Grain Yield	عملکرد بیولوژیک Biologic Yield	ارتفاع بوته Plant height
			0-0.5 (m)	0.5-1 (m)	1-1.5 (m)	1.5-2 (m)	>2 (m)				
Block	بلوک	2	3.43 <sup>ns</sup>	0.19 <sup>ns</sup>	3.5 <sup>ns</sup>	1.07 <sup>ns</sup>	0.135 <sup>ns</sup>	0.031 <sup>ns</sup>	0.84 <sup>ns</sup>	4785 <sup>*</sup>	0.015 <sup>ns</sup>
Weed-free periods	طول دوره کنترل	6	110 <sup>**</sup>	811 <sup>**</sup>	616 <sup>**</sup>	149 <sup>**</sup>	17 <sup>**</sup>	2.64 <sup>**</sup>	33.5 <sup>**</sup>	784498 <sup>**</sup>	0.79 <sup>**</sup>
Error	خطای آزمایش	12	1.9	3.99	6	2.03	0.04	0.056	0.427	2196	0.027
C.V (%)	ضریب تغییرات (درصد)		7.9	5.1	8.4	11	10.4	7.7	7.7	4.5	9

ns: غیر معنی دار

\*, \*\*, \* به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

ns: Non-significant

\* and \*\* significant at 5% and 1% probability levels, respectively

جدول ۲- مقایسه میانگین صفات گیاهی ذرت تحت تاثیر دوره های مختلف کنترل علف های هرز

Table 2. Mean comparison of maize traits under different weed- free periods

طول دوره کنترل Weed control period	درصد LAI در لایه های پوشش گیاهی ذرت (متر) of LAI in different canopy layers (%)					شاخص سطح برگ کل Total LAI	عملکرد دانه Grain Yield (ton.ha <sup>-1</sup> )	عملکرد بیولوژیک Biologic Yield (ton.ha <sup>-1</sup> )	ارتفاع بوته Plant height (m)
	0-0.5 (m)	0.5-1 (m)	1-1.5 (m)	1.5-2 (m)	>2 (m)				
WFH کنترل تمام فصل	12.5 c	26.9 d	30.3 b	23.4 a	6.8 a	3.9 a	10.3 a	1603 a	2.3 a
WFT کنترل تا ظهور گل تاجی	16.2 b	35.2 c	29.7 bc	15.9 b	2.89 b	3.62 a	9.5 a	1551 ab	2 a
WFV10 کنترل تا ۱۰ برگی	11.9 c	33.2 c	40.6 a	12.4 cd	1.7 c	3.76 a	9.7 a	1593 a	2.1 a
WFV8 کنترل تا ۸ برگی	10.4 c	29.4 d	44.1 a	14.6 bc	1.3 d	3.73 a	9.2 a	1490 b	2.2 a
WFV6 کنترل تا ۶ برگی	19 ab	30 d	40 a	10.4 d	0.72 e	2.56 b	6.9 b	983 c	1.83 ab
FV4 کنترل تا ۴ برگی	22.2 a	34.7 c	42 a	10.5 d	0 f	2.48 b	5.7 c	810 d	1.68 b
WIH تداخل تمام فصل	24.6 a	75.3 a	0 d	0 e	0 f	1.4 c	1.2 d	280 e	0.74 c

در هر ستون میانگین هایی که دارای حرف مشترک هستند، بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطوح احتمال پنج درصد تفاوت معنی داری ندارند

WFH, Weed Free till Harvest, WFT, Weed Free till Tasseling, WFV4, V6, V8, and V10, Weed Free till 4, 6, 8 and 10 leaf stages, WIH, Weed Infest till Harvest

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% level using Duncan's Multiple Range Test

رقابت تمام دوره علف‌های هرز سلمه تره با ذرت باعث کاهش عملکرد دانه ذرت تا حدود ۷۵ درصد گردید. با افزایش طول دوره کنترل و تاخیر در سبز شدن سلمه تره تا مرحله ۴ و ۵ برگی ذرت، عملکرد ذرت در حدود ۹/۳ درصد کاهش یافت و با افزایش طول دوره کنترل تا ۷ و ۸ برگی، عملکرد آن کاهش نداشت (Mahmoodi et al., 2004). در آزمایشی دیگری مشاهده شد که وزن خشک اندام هوایی در نخود با کاهش طول دوره کنترل علف‌های هرز کاهش یافت (Mohammadi et al., 2004).

### نتیجه‌گیری

نتایج آزمایش حاضر نشان داد که در صورت کنترل علف‌های هرز تا مرحله ۶ تا ۷ برگی ذرت، تغییرات معنی‌داری در شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، عملکرد اقتصادی و بیولوژیک ذرت در اثر ظهور علف‌های هرز از این مرحله به بعد ایجاد نخواهد شد. به عبارت دیگر ظهور علف‌های هرز از مرحله مذکور به بعد، تاثیری بر صفات ذکر شده ذرت ندارد ولی ممکن است باعث تغییر در ساختار پوشش گیاهی آن شود و شاید بتوان آنرا به عنوان اولین عکس‌العمل گیاه زراعی به رقابت علف‌های هرز تلقی نمود. نتایج این آزمایش نشان داد که با کاهش طول دوره کنترل علف‌های هرز یا تسریع در زمان سبز شدن علف‌های هرز، بیشترین درصد شاخص سطح برگ از لایه‌های پائینی پوشش گیاهی به لایه‌های بالایی اختصاص می‌یابد. علت این موضوع بیشتر مربوط به کاهش ارتفاع بوته ذرت در شرایط رقابت با علف‌های هرز مخصوصاً گونه‌های با ارتفاع بلند مانند گاوپنبه است که در پی آن لایه‌های بالایی پوشش گیاهی ذرت کاهش یافته ولی اختصاص شاخص سطح برگ بیشتر به بالاترین لایه، باعث افزایش امکان بهره‌برداری از تابش فراهم می‌شود.

اگرچه رقابت علف‌های هرز مانع رشد نخود شد ولی با تولید اندام‌های باریک‌تر و بلندتر در نخود دسترسی به منابع نوری امکانپذیر شد (Mohammadi et al., 2004). آزمایشی در مورد رقابت گندم پا بلند و علف‌های هرز دانه تسیحی (*Aegilops cylindrical*) نشان داد که گندم پا دارا بودن ارتفاع بیشتر بوته نسبت به علف‌های هرز، از قدرت رقابتی بیشتری برخوردار بود، به طوری که زیست توده علف‌های هرز دانه تسیحی به میزان ۱۶ تا ۴۶ درصد و زیست توده خوشه آن در حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافت (Yenish and Young, 2004). در مجموع به نظر می‌رسد که تغییرات ارتفاع بوته گیاه زراعی در اثر رقابت علف‌های هرز به تراکم و گونه علف‌های هرز بستگی دارد (Dianat et al., 2005; Holt, 1995). نتایج آزمایش حاضر نشان داد که عملکرد اقتصادی و بیولوژیک ذرت تحت تاثیر دوره‌های مختلف کنترل علف‌های هرز قرار داشته و با کاهش طول دوره کنترل علف‌های هرز به بعد از ۶ برگی، افت عملکرد معنی‌داری مشاهده نشد ولی با کاهش طول دوره کنترل علف‌های هرز و تسریع ظهور گیاهچه آنها به قبل از مرحله ۶ برگی ذرت، عملکرد دانه آن کاهش معنی‌داری داشته و از حدود ۹ تن در هکتار به حدود ۶ تن در تیمارهای کنترل علف‌های هرز تا ۴ و ۶ برگی رسید (جدول ۲). عملکرد بیولوژیک ذرت نیز همانند عملکرد دانه تحت تاثیر دوره‌های مختلف کنترل علف‌های هرز قرار گرفت، اما افت عملکرد بیولوژیک در تیمار کنترل تا ۸ برگی (زودتر از عملکرد دانه) مشاهده شد. این طور به نظر می‌رسد که با تشدید رقابت علف‌های هرز، ابتدا عملکرد بیولوژیک کاهش یافته و با افزایش شدت رقابت، از سطح برگ و عملکرد دانه کاسته می‌شود. نتایج تحقیقات قبلی در مورد ذرت نشان داد که کنترل علف‌های هرز تا حدود ۶ و ۸ برگی، تاثیر معنی‌داری بر عملکرد دانه آن نداشت ولی با کاهش طول دوره کنترل علف‌های هرز به قبل از مرحله ذکر شده، عملکرد دانه کاهش معنی‌داری یافت (Hall et al., 1992). در آزمایش دیگری مشاهده شد که

## References

## منابع مورد استفاده

- Abdollahi, A. and M.T. Bararpoor. 2006.** Effect of velvetleaf (*Abutilon theophrasti*) density interference with soybean (*Glycine max* L.) growth and yield. J. of Agric. Sci. and Nat. Resour. 13:32-40. (In Persian with English abstract).
- Agyuoh, J.N., and J.B. Masiunas. 2003.** Interference of redroot pigweed (*Amaranthus retroflexus*) with snap beans. Weed Sci. 51:202-207.
- Amador-Ramirez, M.D. 2002.** Critical period of weed control in transplanted chili pepper. Weed Res. 42:203-209.
- Bailey, W.A., S.D. Askew, S. Dorai-Raj, and J.W. Wilcut. 2003.** Velvetleaf (*Abutilon theophrasti*) interference and seed production dynamics in cotton. Weed Sci. 51:94-101.
- Begna, S.H., R.I. Hamilton, L.M. Dwyer, D.W. Stewart, D. Cloutier, L. Assemet, K. Foroutan-Pour, and D.L. Smith. 2001.** Weed biomass production response to plant spacing and corn (*Zea mays*) hybrids differing in canopy architecture. Weed Technol. 15:647-653.
- Berti, A. and M. Sattin. (1996).** Effect of weed position on yield loss in soybean and comparison between relative weed cover and other regression models. Weed Res. 36: 249-258.
- Bond, W. and A.C. Grundy. 2001.** Non-chemical weed management in organic farming systems. Weed Res. 41:383-405.
- Bukun, B. 2004.** Critical periods for control in cotton in Turkey. Weed Res. 44: 404-412.
- Cirovic, M., and B. Jovic. 1992.** Effects of assimilation area reduction on productivity in maize. Agric. Sci. 94:10-15.
- Dianat, M., H. Rahimian Mashhadi, H.M. Alizadeh, and E. Zand. 2005.** Evaluation of important traits in competitive ability of wheat cultivars (*Triticum aestivum* L.) against rye (*Secale cereale*). Pajouhesh and Sazandegi. 71:58-66. (In Persian with English abstract).
- Gupta, O.P. 2004.** Modern weed management; with special reference to agriculture in the tropics and subtropics. Third edition. Dr. Updesh Purohit for Agrobios (India), Jodhpur. pp 19-49.
- Haj Seyyed Hadi, M.R., E. Zand, M. Nassiri Mahallati, H. Rahimian Mashhadi, and G. Noormohamadi. (ed.) 2006. (Ed.)** Proc. of the Iranian Weed Science Congress, 1<sup>st</sup>, Tehran, 25-26 Jan. 2006, Iranian Society of Weed Sci., Tehran, Iran. (In Persian).
- Hall, M.R., C.J. Swanton, and G.N. Anderson. 1992.** The critical period of weed control in grain corn (*Zea mays* L.). Weed Sci. 40:441-447.
- Hirose, T. and M.J.A. Werger. 1995.** Canopy structure and photon flux partitioning among species in an herbaceous plant community. Ecology. 76:466-474.
- Holt, S.J. 1995.** Plant response to light: a potential tool for weed management. Weed Sci. 43:474-482.
- Kiniry, J.R. 1990.** Seed weight response to decreased seed number in maize. Agron. J. 82:98-102.
- Knezevic, S.T., R.L. Vanderlip, and M.J. Horak. 2001.** Relative time of redroot pigweed emergence affects dry matter partitioning. Weed Sci. 49:617-621.
- Kropff, M.J., C.J.T. Spitters, B.J. Schnieders, W. Joenje, and W. De-Groot. 1992.** An ecophysiological model for interspecific competition, applied to the influence of *Chenopodium album* L. on sugar beet. II. Model evaluation. Weed Res. 32:451-463.
- Lemerle, D., B. Verbeek, R.D. Cousens, and N. Coombes. 1996.** The potential for selecting wheat varieties strongly competitive against weeds. Weed Res. 36:505-513.

- Lindquist, J.L. and D.A. Mortensen. 1998.** Tolerance and velvetleaf (*Abutilon theophrasti* L.) suppressive ability of two old and two modern corn (*Zea mays* L.) hybrids. *Weed Sci.* 46:569-574.
- Lindquist, J.L., D.A. Mortensen, and B.E. Johnson. 1998.** Mechanisms of corn tolerance and velvetleaf suppressive ability. *Agron. J.* 90:787-792.
- Mahmoudi, S., D Mazaheri, H. Rahimian Mashhadi, M.R. Chaichi, and M.A. Baghestani. 2004.** Evaluation of empirical models based upon weed density, time of emergence and relative leaf area to predict corn (*zea mays* L.) yield loss caused by common lambsquarters (*Chenopodium album* L.) interference. *J. of Agric. Sci. and Nat. Resour.* 11:161-169. (In Persian with English abstract).
- Marttin S.G., R.C. Van Acker, and L.F. Friesen. 2001.** Critical period of weed control in spring canola. *Weed Sci.* 49:326-333.
- Massinga, R.A., R.S. Currie, and T.P. Trooien. 2003.** Water use and light interception under Palmer amaranth (*Amaranthus palmeri*) and corn competition *Weed Sci.* 51:523-531.
- McLachlan, S.M., M. Tollenaar, C.J. Swanton, and S.F. Weise. 1993.** Effect of corn-induced shading on dry matter accumulation, distribution, and architecture of redroot pigweed (*Amaranthus retroflexus*). *Weed Sci.* 41: 568-573.
- Mohammadi, G.R., A. Javanshir, F. Rahim Zadeh Khoyii, A. Mohammadi, and S. Zahtab Salmasi. 2004.** The effect of weeds interference on shoot and root growth and harvest index in chickpea. *Iranian J. of Agric. Sci.* 3:51-60. (In Persian with English abstract).
- Ni, H., K. Moody, R.P. Robles, E.C. Paller, and J.S. Lales. 2000.** *Oryza sativa* plant traits conferring competitive ability against weeds. *Weed Sci.* 48:200-204.
- Rahimi, A., H. Rahimian Mashhadi, M. Aghaalikhani, and M. Karimi Kalale. 2006.** (ed.) Proc. of the Iranian Weed Science Congress, 1<sup>st</sup>, Tehran, 25-26 Jan. 2006, Iranian Society of Weed Sci., Tehran, Iran. (In Persian).
- Rajcan, I., K.J. Chandler, and C.J. Swanton. 2004.** Red-far-red ratio of reflected light: a hypothesis of why early-season weed control is important in corn. *Weed Sci.* 52:774-778.
- Seavers, G.P. and K.J. Wright. 1999.** Crop canopy development and structure influence weed suppression. *Weed Res.* 39:319-328.
- Steinmaus, S.J. and R.F. Norris. 2002.** Growth analysis and canopy architecture of velvetleaf grown under light conditions representative of irrigated Mediterranean-type agroecosystems. *Weed Sci.* 50:42-53.
- Swanton, C.J. and S.F. Weise. 1991.** Integrated weed management: The rationale and approach. *Weed Technol.* 5:657-663.
- Teasdale, J.R. 1995.** Influence of narrow row/high population corn (*Zea mays* L.) on weed control and light transmittance. *Weed Technol.* 9:113-118.
- Tremmel, D.C. and F.A. Bazzaz. 1993.** How neighbor canopy architecture affects target plant performance. *Ecology* 74:2114-2124.
- Weaver, S. E., M. J. Kropff, and R. M. W. Groeneveld. (1992).** Use of ecophysiological models for crop-weed interference: The critical period of weed interference. *Weed Sci.* 40: 302-307.
- Yenish, J.P., and F.L. Young. (2004).** Winter wheat competition against goatgrass (*Aegilops cylindrica*) as influenced by wheat plant height, seeding rate, and seed size. *Weed Sci.* 52: 996-1001.

## Effect of weed free periods on canopy structure and leaf area distribution in maize (*Zea mays* L.)

Yaghoubi S. R.<sup>1</sup>, H. Pirdashti<sup>2</sup>, M. Habibi Savadkouhi<sup>3</sup> and Sh. Ghadamyarie<sup>4</sup>

### ABSTRACT

Yaghoubi, S. R., H. Pirdashti, M. Habibi Savadkouhi and Sh. Ghadamyarie. 2009. Effect of weed free periods on canopy structure and leaf area distribution in maize (*Zea mays* L.). **Iranian Journal of Crop Sciences**. 11 (1):15-24 (In Persian).

In order to investigate the effect of different weed free periods on maize canopy structure and leaf area distribution, an experiment was conducted using a randomized complete block design with three replications at Sari Agricultural and Natural Resources Campus, the University of Mazandaran in 2006 cropping season. The treatments were weed control till 4, 6, 8 and 10 leaf and tasseling stages of maize. Following these stages weeds were let to grow and compete with maize crop until harvest. Full season weed free and full season weed infestation were the two control treatments. Maize leaf area was measured in five canopy layers (0-0.5, 0.5-1, 1-1.5, 1.5-2 and >2 m). Maize plant height was measured at dough grain stage and grain yield, biological yield were also measured at the end of maize crop life cycle. Results revealed that different weed free periods had significant effects on total LAI as well as maize plant height. With shortening the weed free period to < 6-leaf stage, LAI, grain and biological yields of maize significantly reduced. Lengthening the weed free period up to 6-leaf stage had no significant effect on maize plant height and LAI in different canopy layers. However, shortening the weed free period to < 4-leaf stage reduced maize plant height and more leaf area developed in higher canopy layers. In full season weed interference treatment the greatest leaf area was recorded in 0.5-1 meter canopy layer. As weed-free period shortened the maize crop maintained its leaf area and grain yield by developing more leaf area in higher canopy layers.

**Key words:** Canopy layer, Canopy structure, Grain yield and Biologic yield, Leaf Area Index, Maize and Weed free period.

---

**Received: May, 2008**

1- Ph. D. Student, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran (Corresponding author)

2- Assistant Prof., Sari Agricultural and Natural Resources Campus, The University of Mazandaran, Sari, Iran

3- Former M.Sc. Student, Sari Agricultural and Natural Resources Campus, The University of Mazandaran, Sari, Iran

4- Former M.Sc. Student, The University of Tabriz, Tabriz, Iran