

اثر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد گل و اجزای آن در بابونه آلمانی (*Matricaria recutita*)

Effects different planting time and nitrogen fertilizer rates on flower yield and its components in German chamomile (*Matricaria recutita*)

حسین زینلی، محمد باقری خولنجانی، محمد رضا گلپور، مهرداد جعفر پور و امیرحسین شیرانی راد

چکیده

زینلی، ح.، م. باقری خولنجانی، م. ر. گلپور، م. جعفر پور و ا. ح. شیرانی راد. اثر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد گل و اجزای آن در بابونه آلمانی (*Matricaria recutita*). مجله علوم زراعی ایران. () - .

بابونه یکی از گیاهان مهم دارویی است که به عنوان چای و اجزاء مهم ادویه جات و داروهای گیاهی استفاده شده است. منظور بررسی اثرات مختلف تاریخ کاشت و کود نیتروژن روی عملکرد و اجزای عملکرد گل در بابونه آلمانی، آزمایشی در سال در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد خوراسگان بصورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی با دو عامل و سه تکرار به اجرا در آمد. سطوح تاریخ کاشت به ترتیب اسفند، اول فروردین و فروردین و سطوح کودی اوره به ترتیب ۱ و کیلوگرم در هکتار بودند. صفات تعداد گل، وزن تر و خشک گل در بوته، تعداد روز تا غنچه دهی و روز تا و در صد گل دهی، تعداد ساقه فرعی گل دهنده، ارتفاع و قطر ساقه و تعداد پنجه در بوته اندازه گیری و ثبت گردید. نشان داد که بالاترین تعداد گل، وزن تر و خشک گل در بوته، تعداد روز تا غنچه دهی و روز تا و در صد گل دهی و مقدار اسانس به تاریخ کاشت اول و کمترین آنها به تاریخ کاشت اسفند و فروردین متعلق بود. نتایج نشان داد که با افزایش کود نیتروژن تعداد گل در بوته و وزن تر و خشک گل، ارتفاع گیاه، تعداد پنجه گل دهنده و مقدار اسانس نیز افزایش می یابد. بالاترین تعداد گل و وزن خشک و تر گل در بوته در تاریخ کاشت اسفند و میزان کیلوگرم در هکتار کود اوره بدست آمد. رگرسیون مرحله ای نیز نشان داد که بیشترین ضرایب رگرسیونی بین اجزای عملکرد گل در بوته با تعداد روز تا غنچه دهی، تعداد گل در بوته و ارتفاع گیاه وجود داشت.

واژه های کلیدی: بابونه، تاریخ کاشت، کود اوره، عملکرد گل، اسانس

تاریخ دریافت: / /

- استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان (مکاتبه کننده)

- مربی دانشگاه آزاد اسلامی اردستان

- استادیار دانشگاه آزاد خوراسگان

- استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

ماده موثره نیز می انجامد. نتایج مشابهی توسط فرانز و کریش (Franz and Kirsch, 1974) و میواد و همکاران (Meawad *et al.*, 1984) نیز گزارش شده است. لچامو و ومل (Letchamo and Vomel, 1989) در بررسی خود اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر روی ژنوتیپ های مختلف را مورد ارزیابی قرار دادند و گزارش کردند که مصرف نیتروژن در مراحل مختلف رشد اثر مثبتی بر روی عملکرد ژنوتیپ های بابونه و طعم و عطر ماده موثره آنها دارد، ولی واکنش ژنوتیپ های مختلف به نیتروژن متفاوت است.

میواد و همکاران (Meawad *et al.*, 1984) نیز در بررسی های خود افزایش غلظت نیتروژن را بر میزان عملکرد روغن بابونه موثر اعلام کردند و مقدار مناسب آن را برای حصول عملکرد مطلوب ۶۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص تعیین کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که افزایش نیتروژن و فسفر به تولید بیشتر اسانس و افزایش پتاسیم منجر به کاهش آن می شود. علاوه بر آن، بررسی آن ها نشان داد که تقویت زمین با نیتروژن زیاد و پتاسیم کم میزان آلفایزبولول را بطور نسبی بیشتر کرد. بیشترین و بهترین میزان اسانس و کامازولن در سطح ۶۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص تولید شد. یک بررسی دیگر نیز بی تاثیر بودن کود های پتاسه و فسفره را بر ماده موثره گیاه مورد تایید قرار می دهد (Sheibanivaziri, 1997).

در مطالعه ای که بر روی توده بابونه اصفهان در دانشگاه جنت بلژیک انجام گرفت، اثر چهارتاریخ کاشت (اواسط فروردین، اواخر فروردین، اواسط اردیبهشت و اواخر اردیبهشت) بر عملکرد گل مورد ارزیابی قرار گرفت و گزارش شد که بهترین زمان کاشت این گیاه برای تولید حداکثر عملکرد، اواسط فروردین بود (Vildova and Stolcova, 2005).

هدف از اجرای این تحقیق، تعیین تاریخ کاشت مناسب در فصل بهار و مقدار کود نیتروژن مورد نیاز برای حصول حداکثر عملکرد گل و اسانس در گیاه

بابونه یکی از قدیمی ترین و یکی از نه گیاه دارویی مهم در دنیا است که توسط انسان شناخته شده است. این گیاه بومی اروپای جنوبی، اروپای شرقی و آسیای غربی است که در درمان بسیاری از بیماریها، صنایع غذایی و صنایع آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد (Jamshidi, 2000). با توجه به اهمیت این گیاه در سلامت جامعه و نقش آن در اشتغال زایی و ارزآوری، بررسی عوامل موثر بر عملکرد کمی و کیفی آن بسیار مهم می باشد. لازم است تا تحقیقات همه جانبه ای بر روی این گیاه در کشور انجام پذیرد. به طور کلی، عملکرد تحت تأثیر عوامل گوناگونی از جمله ژنوتیپ، تراکم و آرایش کاشت، برنامه و روش آبیاری، کودهی، تاریخ کاشت دما و نور قرار می گیرد. زمانی که گیاه بتواند از این عوامل حداکثر استفاده را به عمل آورد، بیشترین عملکرد را خواهد داشت.

مصرف مناسب کودهای شیمیایی به هنگام کاشت و رشد گیاه موجب حاصلخیزی خاک و تولید بیشتر محصول می گردد (Emam and Niknajad, 1994). کمبود نیتروژن به دلیل وظایف متعدد و با اهمیتی که نیتروژن در فرآیندهای حیاتی گیاه انجام می دهد، بیشتر از سایر عناصر گیاه را محدود می کند. نیتروژن زیاد نیز با افزایش رشد رویشی و تشدید خوابیدگی در محصول از مقاومت آن در مقابل تنشهای محیطی می کاهد (Emam and Niknajad, 1994).

آزمایش های لچامو (Letchamo, 1993) بر روی بابونه نشان داده است که با افزایش سطح کاربرد کود نیتروژن، ارتفاع گیاه، عملکرد ساقه، تعداد پنجه های گل دهنده، وزن خشک و تر علوفه، عملکرد دانه و ماده خشک گیاه، شاخه های فرعی گل دهنده شاخه های فرعی اولیه و تعداد گلها به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد، ولی هیچگونه تغییری در ترکیبات ماده موثره حاصل نمی شود. وی گزارش کرد که افزایش کود نیتروژن به افزایش عملکرد گل و درصد و مقدار

دارویی بابونه بود.

اجرا گردید. ارتفاع مزرعه از سطح دریا ۱۵۹۰ متر و طبق تقسیم بندی کوپن دارای اقلیم نیمه خشک و خشک با تابستان های گرم و خشک است. میانگین بارندگی و دمای سالیانه به ترتیب ۱۳۰ میلی متر و ۱۴ درجه سانتیگراد است. ظرفیت زراعی و پژمردگی خاک به ترتیب ۳۸ و ۹ درصد رطوبت وزنی است. زمین محل آزمایش، در سال قبل زیر کشت شبدر بود.

مواد و روش ها

این آزمایش در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان در هفت کیلومتری جاده نائین واقع در شرق اصفهان و در بخش خاتون آباد با عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۳۲ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۲۳ دقیقه شرقی

جدول ۱- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش

Table 1. Physical and chemical properties of soil in experimental field

| Soil properties | خصوصیات خاک | |
|----------------------------------|---|------------|
| Depth (cm) | عمق خاک (سانتی متر) | 0-30 |
| Texture | بافت خاک | Silty-Loam |
| Electric conductivity (mmohs/cm) | هدایت الکتریکی بر حسب میلی موس بر سانتی متر | 4 |
| Acidity | اسیدیته | 7.8 |
| Organic carbon (%) | درصد کربن آلی | 1.5% |
| Nitrogen (%) | درصد نیتروژن | 0.02% |
| P _{ava} (ppm) | فسفر قابل جذب | 20 |
| K _{ava} (ppm) | پتاسیم قابل جذب | 504 |

گیاهان بود. سه هفته پس از وجین اول، وجین نوبت دوم انجام شد. در این مرحله نیز علفهای هرز وجین و فواصل بوته ها بر روی ردیف و بین ردیف ها تنظیم شد. در مدت کاشت و داشت بابونه هیچگونه آفت یا بیماری در مزرعه مشاهده نشد. برداشت گلها با دست انجام و پس از انتقال به انبار در سایه و دور از نور خورشید خشک گردید.

اندازه گیری صفات

در مرحله گل دهی کامل با رعایت حاشیه، ده بوته از وسط هر کرت انتخاب و صفاتی از قبیل تعداد ساقه فرعی، ارتفاع ساقه، تعداد روز تا غنچه دهی، روز تا ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد گلدهی، قطر ساقه و تعداد پنجه در گیاه اندازه گیری شد. از آنجائیکه گلهای بابونه به تدریج می رسند، بنابراین در هر مرحله که گلها رسیدند، برداشت شده و تعداد گل و وزن تر آنها در هر چین یادداشت گردید. برای تعیین وزن خشک گلها، آنها را

عملیات تهیه بستر شامل شخم پایزه و دو دیسک عمود بر هم جهت خرد شدن کلوخه ها قبل از کاشت بود. آزمایش اثر تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر روی بابونه بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. سه تاریخ کاشت ۱۵ اسفند، اول فروردین و ۱۵ فروردین به عنوان کرت های اصلی و سه سطح کودی اوره ۷۵، ۱۵۰ و ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار به عنوان کرت های فرعی بودند.

طول و عرض هر کرت سه متر بود. کاشت بذر دستی و در ردیف انجام گرفت. فاصله بین دو ردیف ۳۰ و بین دو بوته روی ردیف ۱۰ سانتی متر بود. توزیع کود اوره پس از مرحله سه برگی در هر تاریخ کاشت انجام شد. آبیاری تا مرحله سبز شدن هر سه روز یکبار و پس از استقرار گیاه، آبیاری های بعدی بفاصله هر شش روز یکبار انجام گرفت. سه هفته پس از کاشت، وجین نوبت اول انجام شد، که همزمان با مرحله ۶ تا ۱۰ برگی

گل دهی در جدول ۳ نشان داد که بیشترین و کمترین تعداد روز تا غنچه دهی و ۵۰ و ۱۰۰ در صد گل دهی به ترتیب به تاریخ کاشت ۱۵ اسفند و ۱۵ فروردین مربوط است. مقایسه میانگین سطوح مختلف تاریخ کاشت برای صفات ارتفاع گیاه و تعداد ساقه گل دهنده و تعداد پنجه در گیاه نیز نشان داد که بیشترین و کمترین آنها به ترتیب به تاریخ کاشت اول فروردین و ۱۵ فروردین مربوط است. مقدار وزن اسانس در تاریخ کاشت اول ۰/۱۴ گرم در ۱۰۰ گرم ماده خشک گل و در تاریخ کاشت دوم و سوم به ترتیب به مقدار ۰/۱۱ گرم در ۱۰۰ گرم ماده خشک گل بود و تفاوت معنی داری بین دو تاریخ کاشت اول و ۱۵ فروردین وجود نداشت (جدول ۳).

مقایسه میانگین سطوح کود نیتروژن برای تعداد گل در بوته نشان داد که بیشترین تعداد گل در بوته با ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار اوره بدست آمد (جدول ۳). در صورتیکه اثر کود نیتروژن بر روی وزن تر و وزن خشک گل در بوته، تعداد روز تا غنچه دهی و تا ۱۰۰ در صد گل دهی و ارتفاع گیاه، تعداد ساقه گل دهنده، تعداد پنجه در گیاه معنی دار نبود. بالاترین میزان وزنی اسانس در سطح کودی ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار اوره بدست آمد و میزان اسانس در دو سطح کودی نیتروژن ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی داری نداشت.

مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر تعداد گل در بوته و مقدار وزنی اسانس در جدول ۴ ارائه شده است، بیشترین تعداد گل در بوته و مقدار تولید وزنی اسانس متعلق به تاریخ کاشت ۱۵ اسفند و ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن بود. مقایسه میانگین ها نشان می دهد که تولید وزنی اسانس در تاریخ کاشت اول در هر سطح کودی نیتروژن بالاتر از دو تاریخ کاشت دیگر بود. کمترین میزان اسانس در تاریخ کاشت ۱۵ فروردین و ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار اوره حاصل شد (جدول ۴).

تجزیه رگرسیون مرحله ای عملکرد گل خشک

به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد در آون تهویه دار خشک و بلافاصله پس از خروج از آون توزین گردیدند. اسانس گیری در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و با استفاده از روش تقطیر با آب و با دستگاه کلونجر به مدت دو ساعت انجام گرفت. اسانس پس از آب گیری با سولفات سدیم انیدر با ترازی دقیق ۰/۰۱ میلی گرم توزین گردید.

داده های حاصل بر اساس موازین طرح آزمایشی مورد استفاده تجزیه واریانس شدند. برای مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد استفاده گردید. برای انجام محاسبات آماری از برنامه های کامپیوتری SAS و MSTATc استفاده شد.

نتایج و بحث

تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر تاریخ کاشت بر تعداد گل، وزن تر و وزن خشک گل در بوته، تعداد روز تا غنچه دهی، تا ۵۰ و ۱۰۰ در صد گل دهی، ارتفاع و تعداد پنجه در گیاه و مقدار اسانس معنی دار بود (جدول ۲). اثر کود نیتروژن نیز بر تعداد گل در بوته، تعداد روز تا ۵۰ در صد گل دهی و مقدار اسانس معنی دار بود (جدول ۲). اثر متقابل کود نیتروژن × تاریخ کاشت نیز بر تعداد گل و تعداد پنجه در بوته و مقدار اسانس معنی دار بود (جدول ۲).

مقایسه میانگین سطوح مختلف تاریخ کاشت برای صفات مورد بررسی در جدول ۳ نشان داده شده است. مقایسه میانگین تعداد گل و وزن تر و وزن خشک گل در بوته نشان داد که بیشترین تعداد گل در بوته، وزن تر گل و وزن خشک گل در بوته به تاریخ کاشت ۱۵ اسفند و کمترین تعداد گل و وزن تر گل در بوته مربوط به اول فروردین و وزن خشک در بوته به تاریخ کاشت ۱۵ فروردین تعلق داشت (جدول ۳).

مقایسه میانگین سطوح مختلف تاریخ کاشت برای صفات تعداد روز تا غنچه دهی و ۵۰ و ۱۰۰ در صد

جدول ۲- خلاصه تجزیه واریانس برای صفات مختلف در بابونه آلمانی تحت تاثیر سطوح مختلف تاریخ کاشت و کود نیتروژن

Table 2: Summary analysis of variance for different traits in German chamomile as affected by different planting dates and nitrogen fertilizer rates

| S.O.V. | منابع تغییرات | تعداد گل در بوته No. of flower/ plant | وزن تر گل در بوته | وزن خشک گل در بوته | روز تا غنچه دهی | روز تا ۵۰ درصد گل دهی | روز تا ۱۰۰ درصد گل دهی | ارتفاع گیاه | تعداد ساقه های گل دهنده | تعداد پنجه در گیاه | اسانس |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | Fresh weight of flower / plant | Dry weight of flower/ plant | روز تا غنچه دهی Days to budding | Days to 50% of flowering | Days to 100% of flowering | Plant height | No. of flowering stems | No. of tiller / plant | Essential oil |
| Replication | تکرار | 729.04 ^{ns} | 50.47 ^{ns} | 10.96 ^{ns} | 4.92 ^{ns} | 16.33 ^{ns} | 1.92 ^{ns} | 125.5 ^{ns} 1 | 0.32 ^{ns} | 0.22 ^{ns} | 0.0002 ^{ns} |
| Planting date (P) | تاریخ کاشت | 410530.70 ^{**} | 4589.49 ^{**} | 875.47 ^{**} | 611.59 ^{**} | 161.78 ^{**} | 228.26 ^{**} | 951.56 ^{**} | 1.45 ^{ns} | 2.26 [*] | 0.0002 [*] |
| Error a | خطای الف | 12403.75 | 285.69 | 10.94 | 17.20 | 6.44 | 8.15 | 37.19 | 2.34 | 1.21 | 0.0004 |
| Nitrogen fertilization (N) | کود نیتروژن | 57248.94 ^{**} | 220.62 ^{ns} | 36.34 ^{ns} | 0.26 ^{ns} | 17.44 ^{**} | 4.59 ^{ns} | 1.56 ^{ns} | 4.29 ^{ns} | 0.50 ^{ns} | 0.0019 [*] |
| P×N | تاریخ کاشت × کود نیتروژن | 63382.15 ^{**} | 593.95 ^{ns} | 8.18 ^{ns} | 6.37 ^{ns} | 3.94 ^{ns} | 5.48 ^{ns} | 19.11 ^{ns} | 1.73 ^{ns} | 1.89 [*] | 0.0140 ^{**} |
| Error b | خطای ب | 8648.07 | 296.89 | 15.19 | 2.55 | 2.85 | 1.91 | 26.27 | 2.30 | 0.39 | 0.0004 |

* و **: معنی دار در سطوح احتمال ۵ و ۱ درصد.

ns: غیر معنی دار

* and **: Significant at the 5% and 1 % levels of probability, respectively.

Ns: Non-significant

جدول ۳- مقایسه میانگین اثر اصلی سطوح مختلف تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر صفات مختلف بابونه آلمانی

Table 3. Mean comparison of main effects of different levels of planting dates and nitrogen fertilizer on different traits in German chamomile

| تاریخ کاشت Planting time | تعداد گل در بوته No. of flowers/plant | وزن تر گل در بوته (گرم) Fresh weight of flowers/plant (g) | وزن خشک گل در بوته (گرم) Dry weight of flowers/plant (g) | روز تا غنچه دهی Days to budding | روز تا ۵۰ درصد گل دهی Days to 50 % of flowering | روز تا ۱۰۰ درصد گل دهی Days to 100 % of flowering | ارتفاع گیاه (سانتی متر) Plant height (cm) | ساقه های گل دهنده No. of flowering stems | تعداد پنجه در گیاه No. of tillers/plant | اسانس (گرم) Essential oil (gr) |
|-----------------------------|--|--|---|------------------------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------|
| | | کود نیتروژن Nitrogen fertilization | | | | | | | | |
| 5 March اسفند ۱۵ | 1329.33a | 131.61a | 35.54a | 59.11a | 70.67a | 81.78a | 58.13d | 11.18a | 6.54a | 0.14a |
| 20 March اول فروردین | 910.11c | 92.09b | 18.99b | 44.89b | 63.55b | 73.11b | 65.24a | 11.88a | 7.47a | 0.11b |
| 5 April ۱۵ فروردین | 1048.78b | 92.91b | 17.96b | 44.78b | 63.11b | 73.00b | 44.97c | 11.18a | 7.34b | 0.11b |
| 75 kg/ha | 1103.44b | 104.75a | 21.89a | 49.44a | 65.33b | 75.44a | 55.67a | 10.79a | 7.32b | 0.11b |
| 150 kg/ha | 1112.89ab | 101.03a | 24.89a | 49.78a | 67.33a | 76.78a | 56.20a | 11.30a | 7.17a | 0.11b |
| 225 kg/ha | 225 a | 110.84a | 25.71a | 49.56a | 64.67a | 75.67a | 56.49a | 12.16a | 6.86a | 0.14a |

میانگین های، در هر ستون و برای هر تیمار، که دارای حداقل یک حرف مشابه هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۵ درصد تفاوت معنی داری ندارند

Means, in each column and for each treatment, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level using Duncan's Multiple Rang Test

جدول ۴- اثر متقابل تاریخ کاشت × کود نیتروژن بر روی صفات مختلف در بابونه آلمانی

Table 5: Mean comparison of planting dates × fertilization interaction on different traits in German chamomile

| Planting date | تاریخ کاشت | کود نیتروژن | تعداد گل در بوته | وزن تر گل در بوته (گرم) | وزن خشک گل در بوته (گرم) | روز تا غنچه دهی | روز تا ۵۰٪ گلدهی | روز تا ۱۰۰٪ گلدهی | ارتفاع گیاه | تعداد ساقه های گل دهنده | تعداد پنجه در گیاه | اسانس (گرم) |
|---------------|-------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Nitrogen fertilization Kg/ha | | Fresh weight of flower/plant (g) | Dry weight of flower/plant (g) | | | | Plant height (cm) | No. of flowering stems | No. of tiller/plant | Essential oil (g) |
| 5 March | ۱۵ اسفند | 75 | 1225.67b | 117.62a | 32.26a | 60.66a | 71.67a | 82.67a | 55.67a | 0.16ab | 5.77a | 10.23a |
| | | 150 | 1196.33bc | 131.67a | 35.59a | 58.67a | 71.33a | 81.33a | 59.07a | 0.16ab | 7.44a | 12.00a |
| | | 225 | 1566.00a | 145.54a | 38.75a | 58.00a | 69.00a | 81.33a | 59.67a | 0.19a | 6.47a | 11.33a |
| 20 March | اول فروردین | 75 | 1060.67bc | 108.75a | 16.87a | 44.00a | 62.00a | 72.67a | 67.27a | 0.14bc | 8.07a | 11.50a |
| | | 150 | 818.33c | 82.83a | 21.25a | 44.67a | 65.67a | 74.34a | 65.73a | 0.15abc | 7.07a | 11.53a |
| | | 225 | 851.33de | 84.71a | 18.86a | 46.00a | 63.00a | 72.33a | 62.73a | 0.15cd | 7.27a | 12.60a |
| 4 April | ۱۵ فروردین | 75 | 1024.00cd | 87.88a | 16.54a | 43.67a | 62.33a | 71.00a | 44.07a | 0.11cd | 8.13a | 10.63a |
| | | 150 | 1024.00cd | 88.59a | 17.83a | 46.00a | 65.00a | 74.67a | 43.80a | 0.12cd | 7.05a | 10.37a |
| | | 225 | 1098.33bc | 102.27a | 19.51a | 44.67a | 62.00a | 73.33a | 47.07a | 0.09d | 6.85a | 12.53a |

میانگین هایی، در هر ستون، که دارای حداقل یک حرف مشابه هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۵ درصد تفاوت معنی داری ندارند

Means, in each column and for each treatment, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level-Using Duncan's Multiple Rang Test

جدول ۵. تجزیه رگرسیون مرحله ای بین عملکرد گل خشک در بوته با تعداد روز تا غنچه دهی، تعداد گل در هر بوته و ارتفاع گیاه در بابونه آلمانی

Table 6: Stepwise regression analysis between yield of dry flower per plant with days to budding, number of flowers/plant and plant height in German chamomile

| Traits | صفات | ضریب ثابت Intercept | ضرایب رگرسیون Coefficient of regression | | | ضریب تشخیص تجمعی Cumulative R ² |
|----------------------|-----------------------|------------------------|--|------|------|---|
| | | | b1 | b2 | b3 | |
| Days to budding | تعداد روز تا غنچه دهی | -28.61 | 1.06 | | | 0.73 |
| No. of flowers/plant | تعداد گل در هر بوته | -30.18 | 1.01 | 0.78 | | 0.81 |
| Plant height | ارتفاع گیاه | -37.43 | 0.02 | 0.73 | 0.15 | 0.84** |

** : Significant at the 1% probability level.

** : معنی دار در سطح احتمال ۱٪

تعداد گل در بوته در بابونه می شود. مقایسه میانگین سطوح تاریخ کاشت نشان داد که بیشترین تعداد روز تا غنچه دهی و تا ۵۰ و ۱۰۰ در صد گل دهی نیز به تاریخ کاشت اول متعلق بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که در تاریخ کاشت اول (۱۵ اسفند) به خاطر رشد رویشی بیشتر، میزان عملکرد تر و خشک گل در بوته نیز به طور قابل ملاحظه ای از دو تاریخ کاشت اول فروردین و ۱۵ فروردین بیشتر بود (جدول ۳). این نتایج با نتایج برخی از محققان مطابقت دارد (Hajseyedhadi *et al.*, 2004; Vildova and Stolcova, 2005; Salamon, 1992; مطالعه انجام شده در نپال نشان داد که تأخیر در کاشت موجب کاهش تعداد روز از کاشت تا سبز شدن، ظهور جوانه گل، غنچه دهی، گلدهی، درصد اسانس و عملکرد گل گردید (Salamon, 1992a&b). در واقع تأخیر در کاشت و برخورد مرحله گلدهی با دماهای بالاتر از ۲۳ درجه سانتیگراد در مورد بابونه موجب عدم باروری گلچه ها و در نتیجه کاهش عملکرد گل می شود. تأخیر در کاشت نیز با کاهش طول دوره رشد رویشی و تسریع نمو حاصل از افزایش دما سبب کاهش تجمع ماده خشک در اندامهای رویشی و زایشی، نقصان تعداد گل و در نهایت عملکرد گل و اسانس می شود (Salamon, 1992a&b) بیشترین میزان عملکرد گل و اسانس را به ترتیب از تاریخ کاشت ۱۵ اسفند و برابر ۱۹۱۰ کیلوگرم در هکتار عملکرد گل و ۱/۰۳ درصد اسانس گزارش کرده که با نتایج این گزارش

در بوته به عنوان متغیر تابع و بقیه صفات مورد بررسی به عنوان متغیر مستقل نشان داد که تعداد روز تا ۵۰ در صد غنچه دهی، تعداد گل در بوته و ارتفاع گیاه که به ترتیب وارد مدل شدند و به تنهایی هر کدام ۷۳، ۸ و ۳ در صد از تغییرات مشاهده شده را توضیح می دهند. ضرایب رگرسیون همچنین نشان می دهد که بیشترین ضرایب رگرسیون به ترتیب به تعداد گل در بوته و ارتفاع گیاه مربوط بود. این ضرایب نشان می دهد که در صورت بررسی در مورد تیمارهای مختلف به تغییرات این دو صفت با عملکرد وزن گل خشک در بوته باید توجه ویژه ای مبذول شود (جدول ۵).

مطالعات مختلفی در زمینه عوامل موثر نظیر نور، تاریخ کاشت، مواد غذایی، کود و غیره بر کمیت فاکتورهای مورفولوژیکی و کمیت و کیفیت اسانس در بابونه آلمانی صورت گرفته است (Sheibanivaziri, 1997; Darzi, 2002; Jamshidi, 2000). مقایسه میانگین تاریخ کاشت در جدول ۳ نشان می دهد که بیشترین تعداد گل در بوته به تاریخ کاشت ۱۵ اسفند مربوط بود. علت این امر را می توان به فرصت بیشتر گیاه برای توسعه اندامهای رویشی نسبت داد، زیرا برخورد دیرتر زمان گلدهی به گرما، تعداد گل بیشتری نسبت به تاریخ کاشت های دیگر تولید شد. در واقع تأخیر در کاشت و برخورد مرحله گلدهی با دماهای بالاتر از ۲۳ درجه سانتیگراد باعث عدم باروری گلچه و در نتیجه کاهش

بابونه نتایج متفاوت بود. جوهری و همکاران (Johri *et al.*, 1992) نیز به این نتیجه رسیدند که با افزایش مقدار نیتروژن میزان گلدهی نیز در بابونه افزایش می یابد. آنها بهترین مقدار کود نیتروژن را برای عملکرد مطلوب در بابونه، برابر ۶۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص گزارش کردند. فرناندز و همکاران (Fernandez *et al.*, 1993) در کوبا اثر ترکیب کود نیتروژن، اکسید فسفر و اکسید پتاسیم را به ترتیب با مقادیر ۸۰-۶۰-۸۰، ۸۰-۶۰-۱۰۰ و ۸۰-۹۰-۹۰ کیلوگرم در هکتار بر روی گیاه بابونه بررسی کردند و بهترین نتیجه را از ترکیب کودی ۸۰-۶۰-۸۰ کیلوگرم در هکتار بدست آوردند. شیبانی وزیری (Sheibanivaziri, 1997) گزارش کرد که میزان ۶۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص یا معادل ۱۳۰ کیلوگرم کود اوره در افزایش عملکرد گیاه بابونه موثر و افزایش کود پتاسیم و فسفر را در این مورد بی تاثیر گزارش کرد. بالاترین تعداد گل در بوته و مقدار اسانس نیز به تاریخ کاشت ۱۵ اسفند و مقدار کود اوره ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار تعلق داشت.

به طور کلی، عملکرد به صورت برآیند اجزای عملکرد تعریف شده است که کاهش هر یک از اجزاء ممکن است با افزایش در سایر اجزای عملکرد جبران گردد و در نتیجه عملکرد در محدوده مشخصی حفظ شود (Viets, 1965). اجزای عملکرد گل در گیاه بابونه آلمانی عبارتند از تعداد گل، وزن گل و تعداد ساقه فرعی گل دهنده است (Letchamo, 1993; Jamshidi, 2000). در این تحقیق صفات مهم مرتبط با عملکرد گل در بابونه، تعداد روز تا غنچه دهی، تعداد گل در بوته و ارتفاع گیاه تعیین شدند.

همخوانی دارد. بنابراین استنباط می شود هرچه طول دوره رشد رویشی بیشتر و زمان برخورد دوره گل دهی با گرمای بالای ۲۳ درجه سانتی گراد دیرتر باشد، عملکرد گل و میزان اسانس نیز به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.

مقایسه میانگین سطوح کود نیتروژن نیز نشان داد که با افزایش مقدار نیتروژن، تعداد گل در بوته و مقدار وزنی اسانس به طور معنی دار در سطح سوم کود نیتروژنه (۲۲۵ کیلوگرم) بیشتر شد (جدول ۳). تعدادی از محققان نشان داده اند که افزایش سطوح کود نیتروژن به افزایش رشد اندامهای هوایی و تعداد گل منجر می شود و در نهایت موجب افزایش تجمع ماده خشک می گردد (Letchamo, 1993; Franz and Kirsch 1974).

نیتروژن نقش اصلی را در رشد و نمو بابونه آلمانی دارد و کمبود آن در هر یک از مراحل رشد با اختلال در سنتز مواد موجب کاهش تعداد گل در شاخه فرعی و در نتیجه کاهش عملکرد در بابونه می شود. بطور کلی، ارقامی از بابونه که از قدرت تولید بالا و مقاومت مطلوب نسبت به خوابیدگی برخوردار باشند، افزایش مقدار کود نیتروژن عملکرد آنها را بالا می برد (Holz and Demuth 1979; Franz and Kirsch, 1974). بطور کلی می توان گفت که کلیه اجزای عملکرد بابونه آلمانی تحت تاثیر مستقیم نیتروژن قرار می گیرند (Letchamo, 1993; Ercoli, *et al.*, 1996). بررسی های متعدد گزارش کرده اند که با افزایش مقدار کود نیتروژن، تعداد گلها در بابونه آلمانی افزایش می یابد (Meawadm *et al.*, 1984; Kirsch and Franz, 1974 and Letchamo, 1993). لچامو (Letchamo, 1993) طی بررسی های خود به این نتیجه رسید که وزن گلها در سطوح مختلف کود نیتروژن در ژنوتیپ های مختلف

References

- Darzi, M. 2002.** Evaluation of agro-ecological problems in chamomile and fennel. *Zeitung*. 152: 43-49.
- Emam, E. and M. Niknejad. 1994.** Introduction to physiological of yield crop plants. Shiraz University Press. pp. 572.

منابع مورد استفاده

- Ercoli, L., M. Mariotti A. Masion, and F. Massantini. 1996.** Effect of temperature and phosphorus and nitrogen uptake by sorghum. *Crop Sci.* 36: 348-354.
- Fernandez, R., R. Scull, J. L., Gonzales, M., Crespo, E., Sanches and C. Carballo. 1993.** Effect of fertilization on yield and quality of *Matricaria recutita* L. Aspect of mineral nutrition of the crop. 2nd. Congreso-Cubanbo-de-la ciencia-del-suelo=la-Habana-Cuba. 3: 891-894
- Franz, Ch. and C. Kirsch. 1974.** Growth and flower formation of *Matricaria chamomilla* L. is dependence on varied nitrogen and potassium nutrition (in German). *Hort. Sci.* 21:11-19.
- Hajseyedhadi, M. R., N. Khodabandeh, N. Yasa and M. Darzi. 2004.** Effects of sowing date and plant density on flower yield and active substance in chamomile. 4(3): 208-217.
- Holz, J. and G. Demuth. 1979.** Infelunence of ecological factors on the composition of the essential oil and flavonoid in *Matricaria chamomilla* of different origin (in German). *Planta Medica.* 27: 37-45.
- Jamshidi, Kh. 2000.** Effects of row spacing and plant density on quantitative aspects of chamomile flower. *Iranian J. Agric. Sci.* 31(1): 203-209.
- Johri, A. K., L. J., Srivastava., J. M., Singh and R. C. Rana. 1992.** Effect of time planting on German chamomile (*Matricaria recutita* L.). *Indian J. Agron.* 32: 302-304.
- Khajapour, M. R. 2000.** Principal of Agronomy. Jihad Daneshgahi Press. Isfahan University of Technology.
- Letchamo, W. and A. Vomel. 1989.** The relationship between ploidy levels and certain morphological characteristics of *chamomilla recutita*. *Planta Medica.* 55: 527-528.
- Letchamo, W. 1993.** Nitrogen application affects on yield and content of active substances in chamomile genotypes. Pp. 636-639. In Janick, J. E. Simon (Eds.). *New Crops.* Willey. New York.
- Meawad, A. A., A. Awad and A. Afify. 1984.** The combined effect of N- fertilization and some growth regulators on chamomile plants. *Acta Hort.* 144: 123-133.
- Salamon, I. 1992a.** Chamomile: A medicinal plant. *Herb, Spice, and Medicinal Plant Digest.* 10: 1-4.
- Salomon, I. 1992b.** Chamomile production in Czecho-Slovakia. *Focus on Herb.* 10: 1-8.
- Sheibanivaziri, M. 1997.** Study of effect of N.P.K on essential oil and chamazulene of chamomile. Ph.D. Thesis. Isfahan University of Medical Science.
- Viets, F. G. 1965.** The plant's need for and use of nitrogen. In: Bartholomew, W. V. and F. E. Clerk (Eds.). *Soil Nitrogen* , 503-549 . Amer. Soc. Agron., Inc., Publisher Madison. Wisconsin, USA.
- Vildova, A. and M. Stolcova. 2005.** Quality characterization of chamomile in organic and traditional agriculture. *International Symposium on Chamomile Research.* Presove. Slovakia. 7-10 June, 2006. pp. 130.

Effect of different planting time and nitrogen fertilizer rates on flower yield and its components in German chamomile (*Matricaria recutita*)

Zeinali, H¹., M. Bagheri Kholanjani², M. R. Golparvar³, M. Jafarpour³
and A. H. Shirani Rad⁴

ABSTRACT

Zeinali, H., M. Bagheri Kholanjani, M. R. Golparvar, M. Jafarpour and A. H. Shirani Rad. Effect of different planting time and nitrogen fertilizer rates on flower yield and its components in German chamomile (*Matricaria recutita*). **Iranian Journal of Crop Sciences. 10(3): 220-230 (in Persian).**

German chamomile a frequently used phytopharmaceutical, is used as a component of tea-mixes as well as a valuable ingredient of many galentic preparations. In order to investigate the effect of different planting date and nitrogen fertilizer rates on flower yield and its components in German chamomile (*Matricaria recutita*), an experiment was conducted in split plot arrangement –using a randomized complete block design with three replications and two factors, planting dates were March 5, March 20 and April 4, Nitrogen fertilizer rates were 75, 150 and 225 kg/ha of urea. Number of flower/plant, fresh and dry weight of flower per plant, days to budding, days to 50 and 100% of flowering, number of lateral branches, plant height, stem diameter, and number of tiller per plant were measured. Mean comparison showed that the highest and lowest number of flowers, fresh and dry weight of flower per plant, days to budding, days to 50 and 100% flowering and of essential oil content were related to planting date of March 5 and April 4, respectively. Results also indicated that by increasing nitrogen fertilizer, number of flower, fresh and dry weight of flower per plant, plant height, number of tiller, and essential oil content were increased. The highest number of flowers, fresh and dry weight of flower per plant belonged to planting date of March 5 and 225 kg/ha urea. Regression analysis showed that number of flowers per plant, days to budding and plant height were the main traits contributed to flower yield per plant.

Key words: German chamomile, Fertilizer, Urea, Planting date, Essential oil.

Received: February, 2008.

1- Assistant Prof., Agriculture and Natural Resources Research Center of Isfahan, Isfahan, Iran (Corresponding author).

2- Instructor, Islamic Azad University, Ardestan Unit, Ardestan, Iran.

3- Assistant Prof., Islamic Azad University, Khorasgan Unit, Khorasgan, Iran.

4- Assistant Prof., Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran.