

## بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورم کمپوست و کود فسفات زر در راهداری راز

Effect of mycorrhiza, vermicompost and phosphate biofertilizer application on flowering, biological yield and root colonization in fennel  
(*Foeniculum vulgare* Mill.)

درزی، امیر قلاوند، فرهاد رجالی

### چکیده

درزی، م.ت، ا.قلاوند و ف.رجالی. بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورم کمپوست و کود فسفات زر در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی با استفاده از عامل های فارج میکوریزایی (تلقیح و عدم تلقیح)، کود فسفات زیستی (کیلوگرم در هکتار) و ورمی کمپوست (تن در هکتار) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با هیجده تیمار و سه تکرار و در دو سال زراعی و به اجرا در آمد. مقایسه ای نیز بین این تیمارها با یک تیمار شاهد کود شیمیایی (NPK به میزان کیلوگرم در هکتار) به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با نوزده تیمار و سه تکرار انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که بیشترین تعداد چتر در بوته، عملکرد بیولوژیک و در همزیستی ریشه در تلقیح با میکوریزا حاصل شد. کود فسفات زیستی نیز دارای اثر معنی داری بر ویژگی های مورد بررسی بود، به طوری که بیشترین تعداد چتر در بوته و درصد همزیستی ریشه با کاربرد کیلوگرم از آن و بیشترین عملکرد بیولوژیک با کاربرد کیلوگرم از آن بدست آمد. بیشترین تعداد چتر در بوته و عملکرد بیولوژیک با کاربرد تن ورمی کمپوست و نیز بیشترین درصد همزیستی ریشه با کاربرد تن ورمی کمپوست حاصل گردید. اثر متقابل هم افزایی و مثبت نیز در بین عوامل مشاهده گردید که می توان به اثر متقابل تلقیح میکوریزایی × ورمی کمپوست بر عملکرد بیولوژیک اشاره کرد. مقایسه میانگین ها میان آن بود که از نظر تعداد چتر در بوته و عملکرد بیولوژیک تیمار کود زیستی شامل تلقیح با میکوریزا، مصرف کیلوگرم کود فسفات زر تن ورمی کمپوست و نیز از نظر درصد همزیستی ریشه، بیمار کود زر بکوریزا، مصرف کیلوگرم کود فسفات زر و تن ورم کمپوست ی داشتند.

واژه های کلیدی: راز، بکوریزا، کود فسفات زر، ورم کمپوست، گلده، عملکرد بیولوژیک و همزیستی.

تاریخ دریافت: ۱۱

- استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (مکاتبه کننده)

- دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

- استادیار، مؤسسه تحقیقات خاک و آب

در ضمن عبور از دستکاه کوارش این جانوران بوجود آید. ورم، کمپوست دارای تخلخل زیاد، قدرت جذب و نکهداری عناصر غذای بالا، تهويه و زهکش و ظرفیت بالای نکهداری آب، باشد و استفاده از آن در کشاورزی پایدار، علاوه بر افزایش جمعیت و فعالیت میکرووارگانیزم های مفید خاک (نظیر قارچ های میکوریزا و میکرووارگانیزم های حل کننده فسفات)، در جهت فراهم کردن عناصر غذایی مورد نیاز کیاه مانند بتروژن، فسفر و پتاسیم محلول عمل نموده و سبب بهبود رشد و عملکرد کیاهان زراعی شود (Arancon *et al.*, 2004). با توجه به تأکیدی که کشاورزی بدار برابر افزایش کردن پایداری عملکرد دارد، کیاهان دارو که محصولات کشاورزی برای این محسوب می شوند و به رسد که در چنبه شرایط حداکثر رشد و عملکرد از آنها حاصل گردد (Gupta *et al.*, 2002). از

باها در راسته توان به راز (Foeniculum vulgare Mill.) اشاره کرد که از اهمیت ادی در ایران و جهان برخوردار بوده و از انسان حاصل از دانه آن در صنایع مختلف داروسازی، غذا (Marotti *et al.*, 1993) و بهداشت استفاده شود (Khan *et al.*, 1992; Bajaj, 1989; Omidbaigi, 1997). باهانه در کشور ما ایران پراکنده در مناطق خراسان، تهران، کرمان، مازندران، کردستان، کرمان، کیلان و تبریز دارد و تا ارتفاع ۱۵۰۰ متر از سطح در راه طور خودرو رشد می کند (Rashed Mohassel and Nezami, 1998).

کشت رازیانه در ایران حدود ۲۰ هکتار باشد و استان های عمدۀ تولید کننده این محصول شامل همدان، خراسان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، تهران، کرمان و کلستان هستند (Darzi *et al.*, 2005).

بقات اندک در ارتباط با نقش کودهای زرده بر روی باها در راه رازیانه صورت گرفته است. در تحقیک پژوهش کاپور و همکاران (Kapoor *et al.*, 2004) نشان دادند که

در چند دهه اخیر مصرف نهاده های اراضی کشاورزی موجب معضلات زیاده ای از جمله الودک، منابع آب، افت کمی محصولات کشاورزی و کاهش میزان خاک ها گردیده است (Sharma, 2002b). کشاورزی دار مصرف کودهای زرده با هدف حذف کردن متصفح نهاده های حل مطلوب جهت غله برای مشکلات به شماره ای کودهای زرده حاوی مواد نکهدارنده ای متراکم یک چند نوع ارگانیک خاکری و بصورت فرآورده متابولیک موجودات می که به منظور بهبود حاصلخی خاک و عرضه عناصر غذایی مورد نیاز باه در یک سیستم کشاورزی دار کار روند (Saleh Rastin, 2001) که در این توان به قارچ های بکوریزای (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza) که حل کننده فسفات و ورم، کمپوست اشاره کرد. قارچ های میکوریزا، دارای رابطه همزیست با ریشه غالب کیاهان زراعی باشند و از طریق افزایش جذب عناصر غذایی مثل فسفر و برخی، صرکم مصرف، افزایش جذب آب، کاهش تاثیر منفی تنفسی و افزایش مقاومت در برابر عوامل بیماریزا، سبب بهبود در رشد و عملکرد کیاهان میزبان در سیستم کشاورزی پایدار می شوند (Sharma, 2002a).

میکرووارگانیزم که حل کننده فسفات نیز که عمدتاً میکروریزا باشند با تولید اسیدهایی ها و قارچ باشند با تولید اسیدهایی موجب افزایش حلایلیت فسفات، کم محلول نظیر سنک فسفات می باشند. همچنین بسیاری از آنها با تولید انزیم، فسفاتاز، سبب ازاد شدن فسفر از ترکیبات آن را کردن (Gyaneshwar *et al.*, 2002).

ورمی کمپوست نیز تولید شده به کمک کرم های خاکی است که درنتیجه تغییر و تبدیل و هضم ضایعات آن را (کود دام، وغیره)

کوبه ز سبب بهبود دار عملکرد بیولوژیک در باه دارو نعناع کرد (Cabello *et al.*, 2005). آنمالای و همکاران (Annamalai *et al.*, 2004) بهبود معنی دار عملکرد بیولوژیک یک که باه دارو از ره فرفون (Phyllanthus amarus) در اثر مصرف باکتری ی حل کننده فسفات در مقابله با مار شاهد بود. در خصوص اثر استفاده از ورم، کمپوست بر روی او، ی مورد بررسی در کیاهان دارویی، انور و همکاران (Anwar *et al.*, 2005) مشاهده نمودند که مصرف پنج تن در هکتار ورم، کمپوست همراه با کود NPK (N-Zn-K) و کیلوگرم در هکتار) موجب افزایش عملکرد بیولوژیک یک که باه دارو ریحان (Ocimum basilicum) مار شاهد کرد. (Pandey, 2005) در مطالعه خود که روی باه دارو درمنه (Artemisia pallens) انجام شد، نشان داد که مصرف ورم، کمپوست موجب بهبود درمان بسه با شاهد گردید. در یک بررسی که توسط آرانکون و همکاران (Arancon *et al.*, 2004) بر روی اه توت فرنگی (Fragaria ananassa) و با استفاده از مقادیر پنج و ده تن در هکتار ورمی کمپوست صورت گرفت، مشخص گردید که کاربرد مقادیر مختلف ورمی کمپوست، بطور داری تعداد گلها را در مقایسه با گیاهان شاهد افزایش داد. گزارش که مل و همکاران (Kale *et al.*, 1987) بن آن بود که استعمال ورم، کمپوست از طریق رشد ریشه در یک درصد همزایی افزایش درصد همزایی ریشه در یک پژوهش گلخانه ای (Salvia sp.) کرد. در یک پژوهش گلخانه ای که توسط سابتز و همکاران (Sainz *et al.*, 1998) بر روی یاهان شبدر قرمز (Trifolium pratense) و خوار صورت گرفت، مشخص گردید که مصرف ورم، کمپوست موجب افزایش قابل ملاحظه عملکرد بیولوژیک در همین رابطه، در مطالعه ای در که روی باه جو صورت پذیرفت، مشخص شد که

راز قارچ میکوریزا سبب افزایش دارد. تعداد چتر در بوته، یا ناس و درصد همزایی آن را که در پژوهش که توسط سوبرامانیان و همکاران (Subramanian *et al.*, 2006) بر روی انجام گرفت، مشخص گردید که همزایی یک گونه از میکوریزا، باعث افزایش دار تعداد کل در بوته در مقابله با مار، در تحقیق دیگری عنوان گردید که تلقیه دارو (Cymbopogon martinii) با گونه ای قارچ میکوریزا (Glomus aggregatum) سبب افزایش قابل توجه عملکرد بیولوژیک و درصد همزایی را گردید (Ratti *et al.*, 2001). در همین خصوصیات مطالعه دیگری بر روی نعناع (Mentha arvensis) انجام گرفت، گوپتا و همکاران (Gupta *et al.*, 2002) گزارش کردند که تلقیح گیاه نعناع با گونه ای قارچ بکوریزای VAM به طور قابل ملاحظه ای عملکرد بیولوژیک و درصد همزایی ریشه را در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده، افزایش داد. در پژوهش که روی باهان دارو (Anethum graveolens) انجام شده زیره (Trachyspermum ammi Sprague) بود، ملاحظه گردید که کاربرد دو گونه قارچ VAM طور قابل توجهی درصد همزایی ریشه و بیوماس باهان مذکور را بهبود بخشید (Kapoor *et al.*, 2002). رات و همکاران (Ratti *et al.*, 2001) در تحقیق خود مشاهده کردند که کاربرد چند سوس از باکتری ی حل کننده فسفات، عملکرد بیولوژیک را در مقابله با شاهد افزایش داد. پژوهش هازاریکا و همکاران (Hazarika *et al.*, 2000) بر روی یاه چای (Camellia sinensis) و در شرایط مزرعه ای انجام گرفت، نشان داد که کاربرد یک گونه از باکتری حل کننده فسفات در حضور سنگ فسفات بوماس و درصد کلونیزاسیون ریشه گردید. کاربرد یک میکرووارکانیزم حل کننده فسفات در یک بستر حاوی بت و ورم،

تحقیقات جنکل‌ها و مراتع کشور با عرض جغرافیایی درجه و دقیقه شمالی و طول جغرافیایی درجه و دقیقه شرقی و با ارتفاع متر از سطح دریا، به اجرا در امد. میانکین بارش سالیانه ایستگاه / میلی متر و بن دمای ان در حدود درجه سانتیکراد می‌قبل از کشت، جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه، از عمق صفر تا سانتی متری نمونه برداری بعمل امد و مشخص کردید که بافت خاک لومی رسی و pH آن برابر / (جدول). پژوهش با استفاده از ازمایش فاکتوریل سه شامل عامل تلقیح با قارچ میکوریزا (M) در دو (عدم تلقیح=M1 و تلقیح=M2)، عامل کود فسفات زیستی (P) در سه سطح (P1= و P2= و P3= کیلو گرم در هکتار) و عامل ورمی کمپوست (V) در سه (V1= و V2= و V3= تن در هکتار) در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با هیجده تیمار و سه تکرار انجام گرفت. همچنین، یک کرت به عنوان شاهد کود شیمیایی با مصرف NPK نزان و کیلو گرم در هکتار از نوع اوره، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم در هر تکرار قرار داده شد و مقایسه آن با تیمارهای کودهای زیستی نیز در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با نوزده تیمار و سه تکرار صورت گرفت. مایه تلقیح قارچ میکوریزایی VAM بنام *Glomus intraradices* که به صورت اندام فعل قارچی (شامل اسپور، هیف و ریشه) بوده از مؤسسه تحقیقات خاک و آب تهیه گردید. بمار با قارچ میکوریزا.

کاربرد ورمی کمپوست موجب بهبود چشمکشی در عملکرد بیولوژیک شد (Kumawat *et al.*, 2006). در دیگر که روی با نخود انجام شد، مشخص گردید که مصرف سه تن در هکتار ورمی کمپوست، باعث افزایش بارز عملکرد بیولوژیک در مقایسه (Jat and Ahlawt, 2004,2006) (Zaller, 2007) کمپوست موجب بهبود معنی‌دار عملکرد بیولوژیک ارقام گوجه فرنگی مار شاهد گرد. در مطالعه انجام گرفته روی ارزن مرواری (Pennisetum glaucum) بز مشخص شد که استعمال ورمی کمپوست موجب افزایش قابل توجه عملکرد بیولوژیک نسبت به شاهد گرد (Hameeda *et al.*, 2006).

از آنجا که رویکرد جهانی در تولید گیاهان دارویی به سمت استفاده از نظامهای کشاورزی پایدار و بکارگیری روش‌های آنها نظر کاربرد کودهای زیستی به منظور ارتقاء عملکرد کمپوست و کیفیت گیاهان دارویی هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی، عملکرد بیولوژیک و درصد همزدگان در گیاه دارویی رازبانه بود.

## مواد و روش‌ها

این تحقیق در طی دو سال (2008-2009) در مزرعه ایستگاه تحقیقات همند دماوند وابسته به مؤسسه

## جدول - برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش

Table 1. Some physical and chemical soil properties in experimental site

Cu	روی Zn	Mn	آهن Fe	Mg	کلسیم Ca	K	P	نیتروژن N	کربن آلی O.C	هدایت الکتریکی EC	اسیدیت pH	Texture
mg/kg												
2.60	0.68	9.9	7.4	-	-	726	16	8.19	0.70	0.92	7.3	لومی رسی Loamy-Clay

\* Available form of nutrients was measured.

\* فرم قابل جذب عناصر غذایی اندازه گیری شد.

ورمی کمپوست بکار رفته در ازمایش نبز با استفاده از کود دامی و گونه‌ای کرم خاکی بنام *Eisenia foetida* در ایستگاه خاک و آب کرج تهیه گردید که نتایج تجزیه آن در جدول ارائه شده است. بذر رازیانه مورد استفاده در این تحقیق نیز، از بخش کیاهان دارویی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب استان اصفهان فراهم گردید.

ورت تلچیق بذر انجام گرفت به طوری که هر بذر اغشته به مایه تلچیق میکوریزایی در حدود ۱۰٪ اندام فعال قارچی دریافت کرد. کود فسفات زیستی نیز که مورد تایید مؤسسه مذکور بوده، حاوی سنک فسفات (Rock Phosphate) و یک گونه از باکتری‌های *Pseudomonas striata* بود که در حل کننده فسفات بنام *Pseudomonas striata* بود که در هر کرم از آن در حدود ۱٪ باکتری فعال وجود داشت.

#### جدول - برخی خصوصیات شیمیایی ورمی کمپوست مورد استفاده

Table 2. Some chemical characteristics of used vermicompost

Cu	روی Zn	Mn	آهن Fe	Mg	کلسیم Ca	K	P	نیتروژن N	کربن آلی O.C	هدایت الکتریکی EC	اسیدیت pH
mg/kg میلی گرم در کیلوگرم									(%)	(ds/m)	
26	124	638	17000	14000	46000	4400	4600	8200	10.53	5.32	7.5

می باشد لذا فقط در سال اول ازمایش کشت گردید. همچنین بر مبنای تجزیه خاک و ورمی کمپوست تنها به میزان کیلو گرم نیتروژن از نوع کود اوره در هکتار در مرحله ساقه دهی برای کرت‌های حاوی کودهای زیستی مصرف گردید. عملیات مبارزه با علف‌های هرز مزرعه در چهار نوبت به روش مکانیکی و به وسیله دست صورت گرفت. عملیات آبیاری نیز در طول دوره رشد، روز یک بار انجام شد. در سال دوم آزمایش نب تیمارهای مصرف کود ز دقتا در کرت‌های سال

اول قرار گرفتند و کلیه عملیات مربوط به سال اول (کاشت بذر و تنک کردن بوته‌ها)، برای سال دوم نیز تکرار گردید. در این تحقیق صفات تعداد چتر در بوته، عملکرد یولوژیک و درصد همزیستی ریشه با قارچ میکوریزا مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تعیین تعداد چتر در بوته (در مرحله بردان)، دو خط کناری هر کرت آزمایشی به عنوان حاشیه در نظر گرفته شده و از دو خط میانی به تعداد بوته به طور تصادفی، انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور اندازه‌گیری عملکرد یولوژیک، بوته‌هایی از هر کرت برای

زمین محل انجام ازمایش در چند سال قبل به صورت آیش بود. توجه به شرایط اقلیمی منطقه، عملیات تهیه زمین در اسفند ماه و با مساعد شدن شرایط آب و هوا، انجام گردید. به منظور اجرای ازمایش، اندازه هر کرت به ابعاد × متر و با ردیف کاشت لحاظ گردید. فاصله بین کرت‌ها یک متر و بین تکرارها دو متر در نظر گرفته شدند. کاشت رازیانه و اعمال تیمارهای آزمایشی بعد از مساعد شدن هوا در بهار انجام به همین منظور جهت اعمال تیمارها، در کنار هر

خط کاشت، شیاری در سراسر پشته به عمق ایجاد نموده و کود فسفات زیستی و ورمی کمپوست را در داخل شیار ریخته و به وسیله شن کش روی آن ک داده شد. کاشت رازیانه در تاریخ فروردین سال و پس از اینکه بخشی از بذرهای مورد نیاز با مایه تلچیق میکوریزایی تلچیق شدند، انجام گردید و بلاfaciale آبیاری صورت گرفت. سپس در مرحله ظهور سومین برگ رشته‌ایی، تراکم کاشت براساس صد هزار بوته در هکتار ( × ) تنظیم گردید. لازم به ذکر است از آنجا که رازیانه یک گیاه چند ساله

## ج و بحث

### تعداد چتر در بوته

بج حاصل از تجزیه مرکب سال های آزمایشی بود که تاثیر عوامل تلقی بکوریزا و ورم کمپوست در سطح گلک درصد و عامل کود فسفات زن در سطح پنج درصد بر تعداد چتر در بوته معنی دار گردید اما اثرات متقابل میان عوامل تاثیر داری بر تعداد چتر در بوته نداشتند (جدول ۱). بمارها نشان داد که بین سطوح تلقی بکوریزا، باوت قابل توجه وجود دارد به طوری که تعداد چتر در بوته در تلقی بکوریزا (۱) در مقایسه با عدم تلقی (۰) در حدود ۱۰ درصد بیشتر بود (جدول ۱). توان استنباط کرد که همزمان با بکوریزا از طریق مناسب و افزایش بوماس باه رازیانه، موجبات ایع در گلده و بهبود تعداد چتر در بوته را فراهم آورد. این موضوع با تأثیر کاپور و همکاران (2004) (Kapoor et al., 2004) مطابقت دارد. آنها تعداد چتری در بوته رازی را بهبود تغذیه و تردد فسفر و افزایش عملکرد بیولوژیک در بمار بکوریزا نسبت داده اند در پژوهش دو ساله که توسط سوبرامانیان و همکاران (Subramanian et al., 2006) بر روی انجام گرفت، نزد مشاهده گردید که همزمان با کوئنه از قارچ بکوریزا افزایش بارز تعداد گلک در بوته در مقایسه با مار لرد، افزایش در این ترتیب، به بهبود جذب آب و تغذیه که در اثر همزمان با بکوریزا حاصل گردیده بود، نسبت داده شد. بمارها یا انکر آن بود که میان سطوح مختلف کود فسفات زن اختلاف معنی داری وجود دارد به نحوی که تعداد چتر در بوته در سطح سوم آن (۱)، در حدود ۱۰ درصد بیشتر از سطح اول (۰) گردید (جدول ۱). در رابطه با اثر ورم، کمپوست بر تعداد چتر در بوته نسبت نهاد نشان دهنده آن بود که

وزن خشک در داخل اون به مدت ساعت در دمای درجه سانتی کراد خشک شدند و سپس عملکرد بولوژیک بر اساس مبنی وزن خشک بوته در هر Kapoor et al., 2004; Akbarinia, 2003). جهت اندازه گیری درصد همزمان را بکوریزا، همزمان با برداشت بوتهای از ریشه، ای آنها به ویژه ریشه های مویین و نازک، برداری امده. سپس ریشه های دقت با اب مقطر شستشو شده و از محلول FAA (Formalin Acetic Acid Allcohol) برای تشییت ریشه های استفاده گردید. مراحل رنک ریشه، و سپس رنک آمیزی آنها طبق روش فرپس و هب Philips and Hayman, 1970) صورت گرفت. ابتدا برای بی رنک کردن ریشه های از محلول ده درصد KOH مدت ساعت استفاده شد و بعد نمونه های اب مقطر برای رنک آمیزی ریشه های از محلول حاوی درصد تریپان بلو در لاکتوکلیسرول استفاده گردید. به منظور درصد همیستی قارچ بکوریزا ریشه رازیانه، از روش خطوط متقاطع Gridline Intersect Method (Giovannetti and Mosse, 1980) بکار رانید. بدین صورت که در مورد هر تیمار، ریشه های رنک آمیزی شده به قطعات یک سانتی متری برش داده شدند و به همراه محلول رنک بر لاکتوکلیسرول روی پلیت شیشه ای قرار داده سپس قطعات ریشه از نظر وجود اندام های قارچی در محل تلاقی خطوط افقی و عمودی کاغذ شطرنجی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به صورت درصد بیان شد.

جهت تجزیه و تحلیل داده ای بج هر سال آزمایش و نتایج دو سال آزمایش به صورت تجزیه مرکب داده های از نرم افزارهای اماری SAS, SPSS, MSTAT-c) استفاده گردید. مقایسه میانگین های اساساً استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال درصد انجام

بکوریزا، طوری که دو تیمار کود ز کاربرد کیلوگرم کود فسفات زن و تن در هکتار ورم، کمپوست (۱) و تلق بکوریزا، مصرف کیلوگرم کود فسفات زن و تن ورم، کمپوست (۱) / و ۱/ درصدی در مقابله با شاهد (۱) نشان دادند (جدول). بمارهای کودهای زن مطلوب در بکار رفته باشد، به مرتب شرایط مار شاهدش، به مرتب شرایط را برای بجهود فعالی بکرویه خاک و تولید کننده ای رشد کیا، توسط این موجودات و نیز فراهم جذب با کردند و از طریق جذب مطلوب عناصر معدن، مصرف و کم مصرف توسط ریشه را افزایش رشد و گلدهای (تعداد چتر در بوته) بازی از تحقیقات مرتبط با کشاورزی مدار که مبتدا بر استفاده از منابع آلم و بیولوژیک همراه با مصرف متعادل کودهای باشد و در آنها مورد تائید و تأکید قرار گرفته است Sharma, 2002b; Kapoor *et al.*, 2004; Roy and Singh, 2006 موافقت دارد.

#### عملکرد بیولوژیک

به مرکب داده های دو سال ازما، آن بود که اثر هر سه عامل به تنها و نیز اثر متقابل دو بکوریزا، ورم، کمپوست در سطح که درصد بر عملکرد بیولوژیک معنی دار بودند (جدول). بمارهای نشان داد که به سطح تلق بکوریزا، تفاوت قابل توجه وجود دارد به طوری که عملکرد بیولوژیک در تلق بکوریزا (کیلوگرم در هکتار) در مقایسه با عدم (کیلوگرم در هکتار) در حدود / درصد بستر بود (جدول). در خصوص اثر همزمان بکوریزا، بر روی عملکرد بیولوژیک را، توان استنباط کرد که بهبود میزان فتوستتر و رشد، موجب افزایش مسام بوته و در نهایت عملکرد بیولوژیک کردد. در همبون زمینه، کاپور و همکاران

بن سطوح ورم، کمپوست اختلاف معنی داری وجود دارد به نحوی که تعداد چتر در بوته در سطح سوم (۱) / درصد بیشتر از سطح دوم (۱) و ۱/ درصد بیشتر از سطح اول (۱) بود (جدول). بر ورم، کمپوست نیز میزان گلدهای و تعداد چتر در رازبانه مثبت ارزی شود، به عبارت دیگر مصرف مقادیر مناسب ورم، کمپوست از طریق بهبود فعالی بکرویه خاک و تولید کننده ای رشد کیا، توسط این موجودات و نیز فراهم جذب بستر عناصر غذا، سبب افزایش میزان فتوستتر و ماده خشک که کردند که این مسئله در نهایت انجامد. بجهه مطالعه آرانکون و همکاران (Arancon *et al.*, 2004) بر ورم، تعداد کلها در توت فرنک بن مطلب است. در (Pandey, 2005) در مطالعه خود که روی ماه دارو، درمنه انجام گرفت، نشان داد که مصرف ورم، کمپوست، موجب بهبود قابل ملاحظه گلدهای ماه در مقابله با شاهد کرد. در این پژوهش ملاحظه کردید که بکار کردن ورم، کمپوست از طریق کنترل آفات و بیماری بخاکی و بهبود واکنش های بد در خاک و نیز جذب اب و عناصر غذا، افزایش رشد و نمو و گلدهای ماه مکرر در تحقیق دیگر که توسط روی و سبب (Roy and Singh, 2006) انجام شد، مشاهدات یانکر این بود که کاربرد تن در هکتار ورم، کمپوست در مقابله با عدم کاربرد آن، سبب افزایش قابل توجه تعداد سنبله در بوته جو کرد. آنها در بافتند که استفاده از ورم، کمپوست از طریق بکار کارکنند، میکرووارکانیزم های بد خاک و عرضه مدادوم و پاپدار عناصر معدنی ماه، موجب این افزایش بج بدهست امده از تجزیه مرکب دو سال ازما، حاکم از آن بود که تیمارهای مختلف کودهای زن و شاهد اثر معنی داری بر تعداد چتر در بوته داشتند بن شاهد و تمارهای کودهای زن دارای تفاوت معنی داری بود به

## جدول' - خلاصه تجزیه واریانس مرکب اثر کودهای ز.

صفات راز.

Table 3. Summary of combined analysis of variance of effect of biofertilizers on some characteristics in fennel

S. O. V.	منابع تغییرات	درجه آزادی df	تعداد چتر در بوته Umbrella no./plant	عملکرد بیولوژیک Biological Yield	میانگین مریعات MS	
					درصد همزیستی ریشه Root colonization percent	
Year (Y)	سال	1	9671.905 <sup>ns</sup>	** 163389436.2	* 232.731	
Replication (Y)	تکرار سال	4	1.158	81964.3	10.140	
Mycorrhizal Inoculation (M)	تلقیح میکوریزایی	1	** 1198.667	** 20428827.4	** 18084.426	
M × Y	تلقیح میکوریزایی × سال	1	** 114.577	** 2175806.8	** 105.495	
Phosphate Biofertilizer (P)	کود فسفات زیستی	2	* 28.534	** 714533.0	** 247.980	
P × Y	کود فسفات زیستی × سال	2	8.479 <sup>ns</sup>	205309.9 <sup>ns</sup>	4.154 <sup>ns</sup>	
M × P	تلقیح میکوریزایی × کود فسفات زیستی	2	2.277 <sup>ns</sup>	7585.3 <sup>ns</sup>	** 43.518	
M × P × Y	تلقیح میکوریزایی × کود فسفات زیستی × سال	2	1.239 <sup>ns</sup>	17362.6 <sup>ns</sup>	0.234 <sup>ns</sup>	
Vermicompost (V)	ورمی کمپوست	2	** 538.717	** 82267566.9	** 713.565	
V × Y	ورمی کمپوست × سال	2	** 537.723	** 14590730.3	5.953 <sup>ns</sup>	
M × V	تلقیح میکوریزایی × ورمی کمپوست	2	5.639 <sup>ns</sup>	** 484281.5	18.142 <sup>ns</sup>	
M × V × Y	تلقیح میکوریزایی × ورمی کمپوست × سال	2	0.796 <sup>ns</sup>	** 360237.1	0.279 <sup>ns</sup>	
P × V	کود فسفات زیستی × ورمی کمپوست	4	2.419 <sup>ns</sup>	43320.3 <sup>ns</sup>	** 48.852	
P × V × Y	کود فسفات زیستی × ورمی کمپوست × سال	4	0.744 <sup>ns</sup>	33565.1 <sup>ns</sup>	0.394 <sup>ns</sup>	
M × P × V	تلقیح میکوریزایی × کود فسفات زیستی × ورمی کمپوست	4	0.350 <sup>ns</sup>	16111.0 <sup>ns</sup>	** 29.098	
M × P × V × Y	تلقیح میکوریزایی × کود فسفات زیستی × ورمی کمپوست × سال	4	0.429 <sup>ns</sup>	26424.4 <sup>ns</sup>	0.671 <sup>ns</sup>	
Error		68	6.093	67206.4	6.109	

دار در سطوح احتمال 1 و درصد.

دار. : ns

\* and \*\*: Significant at 5 and 1% levels of probability, respectively.

ns: Non-significant.

## جدول - ن تعداد چتر در بوته در سطوح مختلف کودهای زیستی در سال های

Table 4. Means for umbrella no./plant in different levels of biofertilizers in 2005 and 2006 cropping seasons

تیمار Treatment	تعداد چتر در بوته umbrella no./plant		
	2005	2006	Mean
تلخچ میکوریزایی Mycorrhizal Inoculation			
M1= non-inoculated	26.43 b	43.30 b	34.9 b
M2= inoculated	31.03 a	52.02 a	41.5 a
کود فسفات زیستی (اکیلوگرم در هکتار) Phosphate Biofertilizer (kg/ha)			
P1= 0	28.31 a	46.14 b	37.2 b
P2= 30	28.73 a	48.03 ab	38.4 ab
P3= 60	29.15 a	48.81 a	39.0 a
ورمی کمپوست (تن در هکتار) Vermicompost (ton/ha)			
V1= 0	20.45 c	32.18 c	26.3 c
V2= 5	28.54 b	46.48 b	37.5 b
V3= 10	37.21 a	64.31 a	50.7 a

ی، در هر ستون و برای هر عامل، که دارای حداقل یک حرف مشترک می باشند، بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۱٪ تفاوت معنی دار ندارند.

Means, in each column for each factor, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level, using Duncan's Multiple Range Test.

## جدول - خلاصه تجزیه واریانس مرکب اثر کودهای ز.

Table 5. Summary of combined analysis of variance for biofertilizers effect on some characteristics in fennel

S. O. V.	متابع تغییرات	درجه آزادی df	میانگین مربعات MS		
			تعداد چتر در بوته umbrel la no./plant	عملکرد بیولوژیک Biological Yield	درصد همزیستی ریشه Root colonization (%)
Year (Y)	سال	1	** 17161.067	** 176362556.3	** 223.832
Replication (Y)	تکرار سال	4	3.126	77511.9	8.183
Treatment (T)	تیمار	18	** 403.575	** 10528845.1	** 1380.815
T × Y	تیمار × سال	18	** 86.485	** 1841925.8	7.786 <sup>ns</sup>
Error		72	20.304	63755.7	5.972

\* و \*\*: دار در سطح احتمال ۱٪ و درصد.

\* and \*\*: Significant at 5 and 1% levels of probability, respectively.

: دار ns

ns: Non-significant.

- روی بد و نوع زر ره، گوپتا و جاناردھانان (Kapoor *et al.*, 2004) ی گوپتا و همکاران (Gupta *et al.*, 2002) مشخص کرد که همزارج میکوریزا با رشد همزیستی ریشه دست داشت. (Gupta *et al.*, 2002) (Kapoor *et al.*, 2004)
- (Gupta and Janardhanan, 1991) (Ratti *et al.*, 2001) نعناع از طریق افزایش جذب اب و عناصر غذا مطلب است که همزارج میکوریزا سبب بهبود مشخص کرد که همزارج میکوریزا با رشد همزیستی ریشه دست داشت. (Gupta *et al.*, 2002) (Kapoor *et al.*, 2004)
- مطلب است که همزارج میکوریزا سبب بهبود نعناع از طریق افزایش جذب اب و عناصر غذا میکاران (Gupta *et al.*, 2002) (Kapoor *et al.*, 2004) (Ratti *et al.*, 2001) (Gupta and Janardhanan, 1991) (Kapoor *et al.*, 2004)
- عملکرد بیولوژیک در گیاهان دارویی مذکور شد. (Gupta *et al.*, 2002) (Kapoor *et al.*, 2004) (Ratti *et al.*, 2001) (Gupta and Janardhanan, 1991) (Kapoor *et al.*, 2004)
- نماینگر آن بود که میان سطوح فتوسترات شده و امر موجب تولید فراورده‌ی و بهبود عملکرد بیولوژیک گردید. (Gupta *et al.*, 2002) (Kapoor *et al.*, 2004) (Ratti *et al.*, 2001) (Gupta and Janardhanan, 1991) (Kapoor *et al.*, 2004)
- بخارها بیانگر آن بود که میان سطوح مختلف کود فسفات زر احتلاف معنی داری (Gupta *et al.*, 2002) (Kapoor *et al.*, 2004) (Ratti *et al.*, 2001) (Gupta and Janardhanan, 1991) (Kapoor *et al.*, 2004)

## جدول ۶ - تعداد چتر در بوته در اثر کودهای زیستی در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶

Table 6. Means of umbrella no./plant as affected by biofertilizers in 2005 and 2006 cropping seasons

پیمان Treatment	تعداد چتر در بوته Umbrella no./plant			درصد تغییر % Change to control
	2005	2006	Mean	
M1P1V1	17.5 j	26.3 h	21.9 f	-47.7
M1P1V2	26.2 gh	41.4 ef	33.8 d	-19.3
M1P1V3	34.0 bcd	56.6 bc	45.2 b	+7.8
M1P2V1	18.7 j	28.3 h	23.5 f	-43.9
M1P2V2	26.2 gh	42.7 e	34.4 d	-17.9
M1P2V3	35.2 b	60.6 b	47.9 b	+14.3
M1P3V1	18.3 j	29.3 h	23.8 f	-43.2
M1P3V2	27.1 fg	43.7 e	35.4 d	-15.5
M1P3V3	34.7 bc	61.1 b	47.9 b	+14.3
M2P1V1	21.9 i	35.2 g	28.6 e	-31.7
M2P1V2	30.7 de	49.7 d	40.4 c	-3.5
M2P1V3	39.2 a	67.9 a	53.5 a	+27.6
M2P2V1	22.7 i	36.5 fg	29.6 e	-29.3
M2P2V2	29.8 ef	50.4 d	40.1 c	-4.2
M2P2V3	39.9 a	69.6 a	54.7 a	+30.5
M2P3V1	23.6 hi	37.4 fg	30.5 e	-27.2
M2P3V2	31.0 de	51.0 d	41.0 c	-2.1
M2P3V3	40.2 a	70.3 a	55.2 a	+31.7
Control (NPK: 90, 60 and 90 Kg/ha)	31.6 cde	52.2 cd	41.9 c	-

که دارای حداقل یک حرف مشترک می باشند، بر اساس آزمون چند دامنه ای داتکن در سطح احتمال ۱٪ تفاوت معنی دار ندارند.

Means, in each column for each factor, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level, using Duncan's Multiple Range Test.

مصرف (Omar, 1998) در خصوص اهمیت مصرف بکروار کائیزیم ی حل کننده فسفات در خاک های انجام شده بود، روشن گردید که کاربرد این بکروار کائیزیم سراه با سنگ فسفات، ضمن افزایش فسفر و فراهم متناسب آن برای گندم، موجب بهبود رشد و عملکرد بیولوژیک در سطح سلامت خاک، راتی و همکاران (Ratti et al., 2001) بر روی ماه مطابقت دارد. انها اظهار داشتند که علاوه بر تاثیر بیولوژیک در این موضوع با پژوهش (Annamalai et al., 2004) بن بهبود معنی دار عملکرد بیولوژیک در اثر مصرف باکتری ی کننده فسفات در یک گیاه دارو از خانواده فرفبوون در بقایات جار شاهد بود. کابلو و همکاران (Cabello et al., 2005) (روی Defreitas et al., 1997) نعاع و دفریتاس و همکاران (Defreitas et al., 1997) در پژوهش در این که توسط

وجود دارد به نحوی که عملکرد بیولوژیک در سطح دوم (کیلوگرم در هکتار)، در حدود ۱ درصد بیشتر از سطح اول (کیلوگرم در هکتار) گردید (جدول ۶). ممکن است کود فسفات زیر جذب فسفر و افزایش فتوستز موجب بهبود عملکرد بیولوژیک باشد. موضوع با پژوهش راتی و همکاران (Ratti et al., 2001) بر روی ماه دارو، مطابقت دارد. انها اظهار داشتند که علاوه بر تاثیر بیولوژیک در این موضوع با پژوهش (Annamalai et al., 2004) بن بهبود جذب فسفر می تواند بر روی افزایش وزن خشک باشد، احتمال این وجود دارد که باکتری ی حل کننده فسفات از هورمون های رشد که در این در پژوهش در این که توسط

## جدول ۱ - بن عملکرد بیولوژیک در سطوح مختلف کودهای زیستی و اثر متقابل آن‌ها در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶

Table 4. Means for biological yield in different levels of biofertilizers and their interactions in 2005 and 2006

cropping seasons.

تیمار Treatment	عملکرد بیولوژیک (کیلو گرم در هکتار) Biological Yield (Kg/ha)		
	2005	2006	Mean
تلقیح میکوریزایی Mycorrhizal Inoculation			
M1= non-inoculated	3392 b	5568 b	4480 b
M2= inoculated	3978 a	6722 a	5350 a
کود فسفاتی زیستی (کیلو گرم در هکتار) Phosphatic Biofertilizer (Kg/ha)			
P1= 0 kg/ha	3610 b	5906 b	4757 b
P2= 30 kg/ha	3712 a	6203 a	4957 a
P3= 60 kg/ha	3734 a	6326 a	5029 a
ورمی کمپوست (طن در هکتار) Vermicompost (ton/ha)			
V1= 0 ton/ha	2794 c	3928 c	3361 c
V2= 5 ton/ha	3718 b	6289 b	5003 b
V3= 10 ton/ha	4544 a	8218 a	6380 a
تلقیح میکوریزایی × ورمی کمپوست M × V			
M1V1	2435 f	3334 f	2884 f
M1V2	3470 d	5929 d	4699 d
M1V3	4271 b	7441 b	5856 b
M2V1	3153 e	4522 e	3837 e
M2V2	3965 c	6650 c	5307 c
M2V3	4816 a	8994 a	6904 a

که دارای حداقل یک حرف مشترک می‌باشد، بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۱٪ تفاوت معنی‌دار

، در هر ستون و برای ندارند.

Means, in each column for each factor, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level, using Duncan's Multiple Range Test.

موجات افزایش رشد اندام‌ها را در ارتفاع و تعداد چتر در بوته و متعاقب آن: ماده خشک را به فراهم کرده است. در هم رابطه در پژوهش که با استفاده از مقادیر مختلف ورمی کمپوست روی ماه دارو ریحان صورت گرفت، انسورو همکاران (Anwar et al., 2005) نشان دادند که مصرف در هکتار ورمی کمپوست همراه با کود شرک NPK (کیلو گرم در هکتار) و / درصد بیشتر از سطح دوم (کیلو گرم در هکتار) و / درصد بیشتر از سطح اول (کیلو گرم در هکتار) بود (جدول ۱). افزودن ورمی کمپوست به خاک ممکن است اظهار داشتند که افزودن ورمی کمپوست به خاک با بهبود بدن شرک بولوژیک خاک، فراهم عناصر غذایی مورد نیاز ماه موجات افزایش رشد

روی کلزا، به جای پژوهش حاضر می‌در رابطه با اثر ورمی کمپوست بر عملکرد بیولوژیک بندهای نشان دهنده آن بود که بندهای سطوح مصرف ورمی کمپوست اختلاف معنی‌داری وجود دارد، به نحوی که عملکرد بیولوژیک در سطح سوم (کیلو گرم در هکتار)، درصد بیشتر از سطح دوم (کیلو گرم در هکتار) و / درصد بیشتر از سطح اول (کیلو گرم در هکتار) بود (جدول ۱). افزودن ورمی کمپوست به خاک ممکن است فراهم رغذای مورد نیاز ماه را افزایش داده است بلکه با بهبود شرک بکار و فرآیندی خاک، ضمن ایجاد بکار مناسب برای رشد ر

افزایش مقادیر ورم، کمپوست در تیمارها که حاوی قارچ مبکوربزا ه باشند، عملکرد بیولوژیک نیز به طور دارای افزا.

کمپوست از طریق بر درصد همزمان با کوربزا و کسترشن ی خارج اعمال کرد و متعاقب آن تاثیری که قارچ مبکوربزا بر گسترش و رونق رشد را با مبیان داشت، موجب بهبود رشد و نمو و سرانجام افزایش عملکرد بیولوژیک رازبانه کرد.

ی بنت و همکاران (Sainz *et al.*, 1998) بر روی

باها شبد قرمز و خیار نسبت بجهه ای دارد. آنها دریافتند که کاربرد مقادیر مناسب ورم، کمپوست توأم با تلقی بکوربزا، ضمن بهبود شرایط بولوژیک خاک، قادر است از طرق جذب مطلوب و افزایش رشد گیاه، سبب بهبود عملکرد

بولوژیک آن شود. بنابراین در پژوهش روى با سورگوم دانه ای، مشاهده نمودند که کاربرد توأم مبکور ورم، کمپوست موجب افزایش محسوس عملکرد بولوژیک کرد. آنها اظهار داشتند که این افزایش از اثر مستقیم ورم، کمپوست بر درصد همزمان با کوربزا نبود، بلکه حاصل اثر عناصر غذای موجود در ورم، کمپوست بر روی توسعه و گسترش مستقیم و بهم شبکه قارچ و تاثیر آن بر تحريك رشد را با مبیان بود.

بر اساس نتاجم مركب داده های سال ۱۹۹۸ انجام آزمایش، عملکرد بیولوژیک در اثر تیمارهای مختلف کودی در سطح بکار رسانیده دار گردید (جدول ۱).

بن شاهد و تیمارهای مطلوب کودهای زرده تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد به نحوی که عملکرد بولوژیک در دو تیمار کود زرده بکوربزا، مصرف کیلوگرم کود فسفات زرده و تن ورم، کمپوست (کیلوگرم در هکتار) و در بکوربزا، مصرف کیلوگرم کود فسفات

بکره رو و تولید بomas را فراهم آورده است. (Kumawat *et al.*, 2006)

ورم، کمپوست در گیاه جو، موجب بهبود چشمگیر عملکرد بیولوژیک کرد، آنها را که کنندک بکروب های

خاک توسط ورم، کمپوست و توانا اند در بهبود جذب عناء و همکاران (Sainz *et al.*, 1998) نزد

پژوهش خود روی باها شبد قرمز و خبار، کزارش کردند که مصرف ورم، کمپوست حاصل از ضایعات آلمای موجب افزایش قابل ملاحظه عملکرد بولوژیک در آنها اظهار داشتند که

فضولات کرم های خاک حاوی مصرف و کم مصرف قبل استفاده فراوان بوده که باها مذکور شده و از طریق

بهبود رشد و نمو، سبب افزایش عملکرد بیولوژیک کرد. (Cavender *et al.*, 2003)

مطالعات کاوندر و همکاران (Acevedo and Pire, 2004)، (al., 2003)، آسه ودو و پا (Kumar *et al.*, 2005) و همکاران (Jat and Ahlawat, 2004 and 2006) الاوات (Zaller, 2007) همکاران (Hameeda *et al.*, 2006) و زالر (2006)

ب روی سورگوم دانه ای، خربزه درخت، سورگوم علوفه ای، نخود، ارزن مروارید و کوجو

جهه ای، بق مطابقت دارد. اثر متقابل تلقی بکوربزا × ورم، کمپوست نشان داد که بجهه ای مارهای مختلف اختلاف معنید داری وجود داشت به نحوی که عملکرد بیولوژیک در تیمارهای بکوربزا در سطوح مختلف مصرف ورم، کمپوست در هکتار) در مقایسه با مارهای شامل عدم تلقی بکوربزا در سطوح مختلف مصرف ورم، کمپوست (کیلوگرم در هکتار) (کیلوگرم در هکتار) (جدول ۲).

طور بارزی افزایش (جدول ۲) به عبارت د

ب) ایجاد یک محیط کشت مناسب و فراهم-  
غذا، موجب بهبود رشد و نمو گیاه رازیانه و افزایش  
عملکرد بیولوژیک آن در مقایسه با مار شاهد شد.  
گرد. همچنین مطالعات برخواه از محققین در  
در رابطه با مصرف کودهای زردهای زیر  
وآل، برآورد بود بیوماس گاهان  
بن مطلب است  
Sainz *et al.*, 1998; Cavender *et al.*, 2003; Akbarinia, )  
(2003

ز) و تن ورم کللوگرم در هکتار) ب) در حدود و درصد نسبت به شاهد (کللوگرم در هکتار) داشتند (جدول، در تفسیه) توان بیان نمود که کاربرد تلف کودهای زردهای زیر به همراه مصرف کیلوگرم نیتروژن، ضمن بهبود احتمال فرآیند خاک و افزایش باروری آن و نیز اثرات متقابل بد کننده ای که بین کودهای زردهای زیر قارچ کوربزا و ورم کمپوست ایجاد شد، قادر به باشد از

### عملکرد بیولوژیک در اثر کودهای زیستی در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶

Table 6. Means of biological yield as affected by biofertilizers in 2005 and 2006 cropping seasons

تیمار Treatment	عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار) Biological Yield (Kg/ha)				درصد تغییر %Change to control
	2005	2006	Mean		
M1P1V1	2414 i	3204 j	2808 i	-48.9	
M1P1V2	3476 g	5628 h	4552 g	-17.1	
M1P1V3	4177 cde	7123 cd	5649 de	+2.8	
M1P2V1	2404 i	3380 j	2892 i	-47.4	
M1P2V2	3515 g	5986 gh	4750 g	-13.5	
M1P2V3	4272 cd	7489 bc	5880 cd	+7.0	
M1P3V1	2486 i	3420 j	2952 i	-46.3	
M1P3V2	3420 g	6173 fgh	4796 g	-12.7	
M1P3V3	4366 c	7712 b	6039 c	+9.9	
M2P1V1	3011 h	4345 i	3678 h	-33.0	
M2P1V2	3858 f	6397 efg	5127 f	-6.7	
M2P1V3	4724 b	8738 a	6731 b	+22.5	
M2P2V1	3342 g	4584 i	3963 h	-27.9	
M2P2V2	4046 def	6699 def	5372 ef	-2.2	
M2P2V3	4691 b	9083 a	6886 ab	+25.3	
M2P3V1	3106 h	4638 i	3872 h	-29.5	
M2P3V2	3991 ef	6854 de	5422 ef	-1.3	
M2P3V3	5033 a	9161 a	7097 a	+29.2	
Control (NPK: 90, 60 and 90 Kg/ha)	4002 ef	6986 cde	5494 e	-	

در هر ستون و برای که دارای حداقل یک حرف مشترک میباشد، بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۱٪ تفاوت معنی دار ندارند.

Means, in each column for each factor, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level, using Duncan's Multiple Range Test.

در سطح یک درصد بر درصد همزمان دار گردید (جدول).  
نمایش داد که بین سطوح تلف بکوربزا تفاوت قابل وجود داشت، به طوری که درصد همزمان بکوربزا × کود فسفات زردهای سال های ازما

درصد همزمان دار بکوربزا به مرکب داده های سال های ازما آن بود که اثر هر سه عامل به تنها و نیز اثر متقابل بکوربزا × کود فسفات زردهای سال های ازما آن بود که اثر هر سه عامل به تنها و نیز اثر متقابل بکوربزا × کود فسفات زردهای سال های ازما

و همکاران (Hazarika *et al.*, 2000) روی ماه چای  
ی پژوهش حاضر مطابقت دارد. آنها مشاهده  
کردند که کاربرد بک از باکتری حل کننده  
فسفات (*Bacillus polymyxa*) در حضور سنگ فسفات  
موجب افزایش درصد کلوبیزاسیون را گردید. آنها گزارش کردند در خاکهای اسبی  
که سبب الوم م و کمبود فسفر وجود دارد، مصرف  
بک باکتری‌ها ضمن بهبود همزکوریزا.  
عرضه کافی باعث افزایش رشد و نمو آن  
نمود. در دو مطالعه دیگری که در خصوص  
کاربرد میکرووارگانیزم ی حل کننده فسفات روی  
باها نگندم و ماش سبز انجام گرفت، آشکارا که  
مصرف بک باکتری (*Bacillus circulans*) و بک  
قارچ (*Cladosporium herbarum*) در حضور سنگ  
فسفات سبب بهبود قابل ملاحظه درصد همزکوریزا  
گردید (Singh and Kapoor, 1998, 1999). آنها اظهار داشتند که ممکن است تولید هورمون‌های  
بکوارگانیزم‌ها صورت می‌برد، دارای بک  
کنندگی بر آلودگی بکوریزا و موجب افزایش  
کلوبیزاسیون را گردید. نشان داد که در سطوح ورم کمپوست تفاوت معنیداری وجود دارد به طوری که درصد همزکوریزا در سطح دوم (1%) در حدود ۱ درصد بیشتر از سطح اول (1%) و در حدود ۲ درصد بیشتر از سطح سوم (1%) بود (جدول). استنباط می‌شود که عناصر غذای موجود در ورم کمپوست از طریق رشد رازی و موجب افزایش باشند. موضوع در بک و همکاران (Kale *et al.*, 1987) روی باه دارو، قابل مشاهده است. گزارش بوپوترا و همکاران (Shivaputra *et al.*, 2004) این بود که مصرف ورم کمپوست تحت شرایط خلخانه‌ای در گیاه خربزه درختی، سبب بهبود قابل

دریشه در ریشه در درصد بیشتر از عدم تلقی (1%) در حدود ۱ درصد همزکوریزا، شرایط استنباط کرد که تلقی بکوریزا، برای بهبود درصد همزکوریزا در رازیانه در تلاش با دو گونه قارچ میکوریزایی (*G. macrocarpum* و *G. fasiculatum*) (%) به طرز چشمگیری بستر از تیمار عدم تلقی (%) گردید. در پژوهش دیگر گوپتا و همکاران (Gupta *et al.*, 2002) برشان دادند که تلقی بک گونه از قارچ میکوریزا (*Glomus fasiculatum*) ریشه نعناع، سبب افزایش محسوس درصد همزکوریزا می‌گردید. بقات راتب و همکاران (Ratti *et al.*, 2001) و آریاگادا و همکاران (Arriagada *et al.*, 2007) روشی باها دارو، او کالیپتوس و مطلب است. بقات کاپور و همکاران (Kapoor *et al.*, 2002) روی بدون نوع زیره میان آن بود که تلیچ ریشه این دو گیاه با گونه های بکوریزا، موجب افزایش بارز درصد همزکوریزا گردید. که به طور میزان این در دو گیاه مذکور به ترتیب در حدود ۱ و ۲ درصد گردید و این در حالی بود که مقدار آن در تیمار شاهد فقط در حدود دو درصد بود. آن بود که میان سطوح کود فسفات زیر اختلاف داری وجود داشت، که درصد همزکوریزا در سطح سوم (1%) در حدود ۱ درصد بیشتر از سطح اول (1%) و در حدود ۱ درصد بیشتر از سطح دوم (1%) گردید. کاربرد کود فسفات زیر از طرق رها سازی آهسته و مداوم فسفر ممکن است موجب تحریک بکوریزا و متعاقب آن افزایش درصد ریشه رازیانه شده باشد. قه هازاریکا

## جدول - درصد همزیستی ریشه در سطوح مختلف کودهای زیستی در سال ۰۵ و ۰۶

Table 7. Means for root colonization percent in different levels of biofertilizers in 2005 and 2006 cropping seasons.

تیمار Treatment	درصد همزیستی ریشه Root colonization (%)		
	2005	2006	Mean
تلقیح میکوریزایی Mycorrhizal Inoculation			
M1= non-inoculated	26.77 b	27.73 b	27.25 b
M2= inoculated	50.68 a	55.59 a	53.13 a
کود فسفات زیستی (اکیلو گرم در هکتار) Phosphatic Biofertilizer (Kg/ha)			
P1= 0 kg/ha	36.97 b	39.14 c	38.06 c
P2= 30 kg/ha	37.81 b	40.99 b	39.40 b
P3= 60 kg/ha	41.40 a	44.85 a	43.12 a
ورمی کمپوست (تن در هکتار) Vermicompost (ton/ha)			
V1= 0 ton/ha	34.08 b	63.13 c	35.10 c
V2= 5 ton/ha	41.54 a	45.20 a	43.37 a
V3= 10 ton/ha	40.56 a	43.65 b	42.11 b
تلقیح میکوریزایی × کود فسفات زیستی M × P			
M1P1	24.28 d	24.48 d	24.38 e
M1P2	27.04 c	28.41 c	27.72 d
M1P3	29.00 c	30.31 c	29.65 c
M2P1	49.67 b	53.80 b	51.73 b
M2P2	48.57 b	53.58 b	51.08 b
M2P3	53.79 a	59.39 a	56.59 a
تلقیح میکوریزایی × کود فسفات زیستی × ورمی کمپوست M × P × V			
M1P1V1	17.77 f	17.13 j	17.45 j
M1P1V2	27.47 e	28.43 gh	27.95 h
M1P1V3	27.61 e	27.87 h	27.74 h
M1P2V1	22.16 f	22.49 i	22.32 i
M1P2V2	28.47 e	30.80 gh	29.63 gh
M1P2V3	30.50 e	31.93 gh	31.22 g
M1P3V1	27.97 e	28.27 gh	28.12 gh
M1P3V2	30.07 e	32.43 g	31.25 g
M1P3V3	28.97 e	30.23 gh	29.60 gh
M2P1V1	42.57 d	45.27 f	43.92 f
M2P1V2	53.40 b	58.90 bc	56.15 b
M2P1V3	53.03 b	57.23 bcd	55.13 b c
M2P2V1	46.20 cd	50.21 e	48.20 e
M2P2V2	50.05 bc	55.67 cd	52.86 c d
M2P2V3	49.47 bc	54.87 d	52.17 c d
M2P3V1	47.80 c	53.43 de	50.62 d e
M2P3V2	59.77 a	64.97 a	62.37 a
M2P3V3	53.81 b	59.77 b	56.79 b

که دارای حداقل یک حرف مشترک می باشد، بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۱٪ تفاوت معنی دار ندارند.

Means, in each column for each factor, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level, using Duncan's Multiple Range Test.

دارد. آنها مشاهده نمودند که کاربرد توام کونه، ی بکوریزا (*Glomus aggregatum*) و باکتری حل کننده فسفات (*Bacillus polymyxa*) دارای کثیر هم افزایی روی درصد همزمان ریشه بود به طوری که درصد همزمان ریشه در تیمار دارای هر دو میکرووارگانیزم (۰/۰٪) در بمار فقط دارای بکوریزا (۰/۰٪) در حدود درصد بیشتر بود. دلیل این بارز، به تحریر کردن بکوریزا، توسط باکتری حل کننده فسفات Hazarika مذکور نسبت داده شد. هازاریکا و همکاران (Hazarika et al., 2000) بزرگ در مطالعه خود روی باه چای دست گردند. آنها مشاهده کردند که کاربرد توام قارچ میکوریزا (*Glomus fasciculatum*) و باکتری حل کننده فسفات (*Bacillus polymyxa*) در حضور سنک فسفات معدنی میکوریزا در باه چای گردند. اثر متقابل هر سه عامل نسبت اختلاف معنی داری را نشان داد و مشاهده گردید که با کاربرد توام سطوح از سه عامل، در برخی از تیمارها بر درصد افزوده شد به نحوی که درصد همزمان در تیمار تلقی بکوریزا، مصرف کیلوگرم کود فسفات زیاد و پنج تن در هکتار ورم کمپوست (۰/۰٪) بکوریزا داشتند (جدول ۱). این اثر معنی دار در تیمار داشت (جدول ۱). استنباط می شود که مصرف توام از مقادیر هر سه کود زیاد بسیار بروز کثیر میگردد کننده و مثبت بر همزمان بکوریزا باه میزان میزبان می شود و متعاقب آن درصد کلونیزاسیون ریشه بهبود می گیرد. برخی از تیمارها، هازاریکا و همکاران (Hazarika et al., 1998)، هازاریکا و همکاران (Omar, 2000)، کومار و سینگ (Kumar and Singh, 2001)، کومار و سینگ (al., 2000)، و راتی و همکاران (Ratti et al., 2001) وجود روابط افزاین کودهای زیاد بر درصد بر اساس نتایج بدست آمده از تجزیه مرکب

ملحوظه درصد ریشه در مقایسه با برخی از پژوهش ها بزرگ بودست آمده است. در این خصوص، سایر همکاران (Sainz et al., 1998) در یک تحقیق کلخانه ای که روی ااهان شبدر قرمز و خیار انجام دادند، مشاهده نمودند که مصرف ورم کمپوست حاصل از ضابعات کاهش معنی دار در کلونیزاسیون را در ۱۲ ماه شبدر قرمز گردید. این دلیل کاهش در همزمان بکوریزا را به مصرف زیاد از نوع ورم کمپوست و متعاقب آن به فراهم نمایاد در محیط رشد را نسبت دادند و گرفتند که برای حفظ مطلوب همزمان بکوریزا در کشاورزی بدار، ابتدا مبادرت به تعیین عناصر غذایی مورد نیاز کرد و سپس برای مصرف مقادیر مناسب ورم کمپوست اقدام کرد. اثر متقابل بکوریزا × کود فسفات زیاد دارای اختلاف معنی داری بود به نحوی که درصد همزمان در تیمار ای دارای بکوریزا (۰/۰٪ / ۰٪ / ۰٪ / ۰٪) بودند، برتری بکوریزا (۰٪ / ۰٪ / ۰٪ / ۰٪) داشتند (جدول ۱). این اثر معنی دار در تیمار بکوریزا و مصرف کیلوگرم کود فسفات زیاد (۰/۰٪) در مقایسه با مبار عدم تلقیح و کاربرد کیلوگرم کود فسفات زیاد (۰/۰٪) شتر بارز بود، به نحوی که در حدود درصد برتری مشاهده شد. توان بیان داشت، که یک اثر تشیید کننده بین قارچ میکوریزا و مجموعه باکتری حل کننده فسفات و سنک فسفات وجود دارد به طوری که باکتری مذکور از طرق رها سازی کند فسفر از سنک فسفات، می تواند به تحریر کثیر همزمان بکوریزا باه را زیانه و متعاقب آن به بهبود درصد همزمان کمک کند. همکاران (Ratti et al., 2001) روی ااه دارو

داده های سال های ازماش، درصد همز. ر. بکوریزا در تیمارهای مختلف کودهای ز. و شاهد در سطح يك درصد معنی دار گرد. (جدول).  
 بکوریزا شاهد و تیمارهای کودهای ز. بمارها اختلاف قابل توجه بود، به طوری که بمار کودهای ز. بکوریزا، مصرف کیلوگرم کود فسفات ز. در هکتار ورم. در حدود کمپوست (%) / (%) داشت (جدول).  
 بنابراین بمارهای کودهای ز. مطلوب در مقایسه با مار شاهد کود ش. ، به مراتب شرا. برای بهبود فعالی بکرویه مدر خاک که با

بروز اثرات متقابل تشید کننده و مفید در بین انها همراه بود، مهیا کردن و سبب افزایش درصد همز. ریشه راز بکوریزا شدند. از طرف دیگر مصرف کودهای حاوی فسفر محلول، به عنوان يك مانع اصلی در ایجاد همز. بکوریزا بشمار رود و از ا. توان گفت که سب. کشاورزی متداول که مبنی بر مصرف فراوان کودهای محروم هستند غالبا از مزا. ا. Sharma, 2002a and b; Kapoor *et al.*, 2004; ) ن دلیل در تیمار شاهد مان. کاهش زیاد درصد همز. ریشه به وضوح مشاهده .

### جدول - در اثر کودهای زیستی در سال های ۰۵ و ۰۶ درصد همز. ر.

Table 8. Means of root colonization percent as affected by biofertilizers in 2005 and 2006 cropping seasons

تیمار Treatment	درصد همز. ر. Root colonization (%)				درصد تغییر %Change to control
	2005	2006	Mean		
M1P1V1	17.62 g	17.13 j	17.45 j		+41.5
M1P1V2	27.47 e	28.43 gh	27.95 h		+126.7
M1P1V3	27.61 e	28.87 h	27.74 h		+125.0
M1P2V1	22.16 f	22.49 i	22.32 i		+81.0
M1P2V2	28.47 e	30.80 gh	29.63 gh		+140.3
M1P2V3	30.50 e	31.93 gh	31.22 g		+153.2
M1P3V1	27.97 e	28.27 h	28.12 h		+128.0
M1P3V2	30.07 e	32.43 g	31.25 g		+153.4
M1P3V3	28.97 e	30.23 gh	29.60 h		+140.0
M2P1V1	42.57 d	45.27 f	43.92 f		+256.2
M2P1V2	53.40 b	58.90 bc	56.15 b		+355.4
M2P1V3	53.03 b	57.23 bed	55.13 bc		+347.1
M2P2V1	46.20 cd	50.21 e	48.20 e		+290.9
M2P2V2	50.05 bc	55.67 cd	52.86 cd		+328.7
M2P2V3	49.47 bc	54.87 d	52.17 d		+323.1
M2P3V1	47.80 c	53.43 de	50.62 de		+310.5
M2P3V2	59.77 a	64.97 a	62.37 a		+405.8
M2P3V3	53.81 b	59.77 b	56.79 b		+360.6
Control (NPK: 90, 60 and 90 Kg/ha)	12.13 h	12.53 k	12.33 k		-

در هر ستون و برای هر عامل، که دارای حداقل يك حرف مشترک می باشد، بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۱٪ تفاوت معنی دار ندارند.

Means, in each column for each factor, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level, using Duncan's Multiple Range Test.

**سپاسگزاری**

بله از رئیس و کارکنان ایستگاه تحقیقات  
همند دماوند وابسته به مؤسسه تحقیقات جنگل ها و  
مراتع کشور که همکاری بمانه ای در طول اجرای

نگارنده کان داشتند، کمال سپاسگزاری و تشکر  
را دار. از همکاری و خدمات کارکنان بخشن یولوژی  
قات خاک و آب کشور نیز کمال تشکر را  
.

**منابع مورد استفاده****References**

- Acevedo, I. C. and R. Pire.** 2004. Effects of vermicompost as substrate amendment on the growth of papaya (*Carica papaya L.*). *Interciencia*. 29: 274-279.
- Akbarinia, A.** 2003. Study on yield and effective substance of ajowan (*Trachyspermum ammi*) under conventional, organic and integrated systems. Ph.D. Thesis in Agronomy. Faculty of Agriculture, The University of Tarbiat Modarres.
- Annamalai, A., P. T. V. Lakshmi, D. Lalithakumari and K. Murugesan.** 2004. Optimization of biofertilizers on growth, biomass and seed yield of *Phyllanthus amarus* (Bhumyamalaki) in sandy loam soil. *J. Medicinal and Aromatic Plants Sci.* 26: 21-28.
- Anwar, M., D. D. Patra, S. Chand, K. Alpesh, A. A. Naqvi and S. P. S. Khanuja.** 2005. Effect of organic manures and inorganic fertilizer on growth, herb and oil yield, nutrient accumulation, and oil quality of French basil. *Communications in Soil Sci. and Plant Analysis*. 36: 1737-1746.
- Arancon, N., C. A. Edwards, P. Bierman, C. Welch and J. D. Metzger.** 2004. Influences of vermicomposts on field strawberries: 1. Effects on growth and yields. *Bioresource Technol.* 93: 145-153.
- Arriagada, C. A., M. A. Herrera and J. A. Ocampo.** 2007. Beneficial effect of saprobe and arbuscular mycorrhizal fungi on growth of *Eucalyptus globules* co-cultured with *Glycine max* in soil contaminated with heavy metals. *J. Environmental Management*. 84: 93-99.
- Bajaj, Y. P. S.** 1989. Biotechnology in agriculture and forestry. Vol 7. Medicinal and Aromatic Plants 2. Springer-Verlag Press. 480 pp.
- Cabello, M., G. Irrazabal, A. M. Bucsinszky, M. Saparrat and S. Schalamuk.** 2005. Effect of arbuscular mycorrhizal fungus, *Glomus mosseae*, and a rock- phosphate-solubilizing fungus, *Penicillium thomii*, on *Mentha piperita* growth in a soilless medium. *J. Basic Microbiol.* 45: 182-189.
- Cavender, N. D., R. M. Atiyeh and M. Knee.** 2003. Vermicompost stimulates mycorrhizal colonization of roots of *sorghum bicolor* at the expense of plant growth. *Pedobiologia*. 47: 85-89.
- Darzi, M. T., M. T. Hadj Seyed Hadi and N. Yasa.** 2005. Effects of sowing date and plant density on seed yield and quality of active substance in fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.). *Iranian Journal of Agronomy and Plant Breeding*. 2: 27-36.
- Defreitas, J. R., M. R. Banerjee and J. J. Germida.** 1997. Phosphate solubilizing rhizobacteria enhance the growth and yield but not the phosphorus uptake of canola. *Biol. Fert Soils*. 24: 358-364.

- Gholami, A. 1999.** Evaluating the effects of vesicular-arbuscular mycorrhiza (VAM) fungi on growth characteristics of corn. Ph.D. Thesis in Agronomy. Faculty of Agriculture, The University of Tarbiat Modarres.
- Giovannetti, M. and B. Mosse. 1980.** An evaluation of techniques for measuring vesicular-arbuscular mycorrhizal infection in roots. New Phytologist. 84: 489-500.
- Gupta, M. L. and K. K. Janardhanan. 1991.** Mycorrhizal association of *Glomus aggregatum* with palmarosa enhances growth and biomass. Plant and Soil. 131: 261-263.
- Gupta, M. L., A. Prasad, M. Ram and S. kumar. 2002.** Effect of the vesicular-arbuscular mycorrhizal (VAM) fungus *Glomus fasciculatum* on the essential oil yield related characters and nutrient acquisition in the crops of different cultivars of menthol mint (*Mentha arvensis*) under field conditions. Bioresource Technol. 81: 77-79.
- Gyaneshwar, P., G. Naresh Kumar, L. J. Parekh and P. S. Poole. 2002.** Role of soil microorganisms in improving P nutrition of plants. Plant and Soil. 245: 83-93.
- Hameeda, B., O. P. Rupela, G. Reddy and K. Satyavani. 2006.** Application of plant growth-promoting bacteria associated with composts and macrofauna for growth promotion of pearl millet (*Pennisetum glaucum* L.). Biol. Fert. Soils. 44: 260-266.
- Hazarika, D. K., N. C. Taluk Dar A. K. Phookan, U. N. Saikia, B. C. Das and P. C. Deka. 2000.** Influence of vesicular arbuscular mycorrhizal fungi and phosphate solubilizing bacteria on nursery establishment and growth of tea seedlings in Assam. Symposium No. 12, Assam Agricultural University, Jorhat-Assam, India.
- Jat, R. S. and I. P. S. Ahlawat. 2004.** Effect of vermicompost, biofertilizer and phosphorus on growth, yield and nutrient uptake by gram (*Cicer arietinum*) and their residual effect on fodder maize (*Zea mays*). Indian J . Agric. Sci. 74: 359-361.
- Jat, R. S. and I. P. S. Ahlawat. 2006.** Direct and residual effect of vermicompost, biofertilizers and phosphorus on soil nutrient dynamics and productivity of chickpea-fodder maize sequence. J. Sustainable Agric. 28: 41-54.
- Kale, R. D., K. Bano, M. N. Sreenivasa and D. J. Bagyaraj. 1987.** Influence of worm cast on the growth and mycorrhizal colonization of two ornamental plants. South Indian Horticulture. 35: 433-437.
- Kapoor, R., B. Giri, and K. G. Mukerji. 2002.** *Glomus macrocarpum*: a potential bioinoculant to improve essential oil quality and concentration in Dill (*Anethum graveolens* L.) and carum (*Trachyspermum ammi* Sprague). World J. Microbiol. Biotechnol. 18: 459-463.
- Kapoor, R., B. Giri, and K. G. Mukerji. 2004.** Improved growth and essential oil yield and quality in *foeniculum vulgare* Mill. on mycorrhizal inoculation supplemented with P-fertilizer. Bioresource Technol. 93: 307-311.
- Khan, M. M. A., S. H. A. Samiullah and M. M. R. K. Afridi. 1992.** Yield and quality of fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.) in relation to basal and foliar application of nitrogen and phosphorus. J. Plant Nutrition. 15: 2505-2515.
- Kumar, S., C. R. Rawat, S. Dhar and S. K. Rai. 2005.** Dry matter accumulation, nutrient uptake and changes in soil fertility status as influenced by different organic sources of nutrients to forage sorghum (*Sorghum bicolor*).

Indian J. Agric. Sci. 75: 340-342.

**Kumar, V. and K. P. Singh. 2001.** Enriching vermicompost by nitrogen fixing and phosphate solubilizing bacteria.

Bioresource Technol. 76: 173-175.

**Kumawat, P. D., N. L. Jat and S. S. Yadavi, 2006.** Effect of organic manure and nitrogen fertilization on growth, yield and economics of barley (*Hordeum vulgare*). Indian J. Agric. Sci. 76: 226-229.

**Marotti, M., V. Dellacecca, R. Piccaglia and E. Giovanelli. 1993.** Agronomic and chemical evaluation of three varieties of *Foeniculum vulgare* Mill. Acta Horticulture. 331: 63-69.

**Omar, S. A. 1998.** The role of rock-phosphate-solubilizing fungi and vesicular arbuscular mycorrhiza (VAM) in growth of wheat plants fertilized with rock phosphate. World J. Microbiol. Biotechnol. 14: 211-218.

**Omidbaigi, R. 1997.** Approaches to production and processing of medicinal plants. Tarrahane Nashr. 424 pp.

**Pandey, R. 2005.** Management of *Meloidogyne incognita* in *Artemisia pallens* with bio-organics. Phytoparasitica. 33: 304-308.

**Philips, J. M. and D. S. Hayman. 1970.** Improved procedures for cleaning roots and staining parasitic and vesicular arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Trans. Brit. Mycol. 55: 158-161.

**Rashed Mohassel, M. H. and A. Nezami. 1998.** Effects of sowing date and plant density on growth and seed yield of fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.) in Mashhad climatic condition. Final report of research project, The University of Ferdosi.

**Ratti, N., S. Kumar, H. N. Verma and S. P. Gautam, 2001.** Improvement in bioavailability of tricalcium phosphate to *Cymbopogon martinii* var. motia by rhizobacteria, AMF and azospirillum inoculation. Microbiol. Res. 156: 145-149.

**Roy, D. K. and B. P. Singh. 2006.** Effect of level and time of nitrogen application with and without vermicompost on yield, yield attributes and quality of malt barley (*Hordeum vulgare*). Indian J. Agron. 51: 40-42.

**Sainz, M. J., M. T. Taboada-Castro and A. Vilarino. 1998.** Growth, mineral nutrition and mycorrhizal colonization of red clover and cucumber plants grown in a soil amended with composted urban wastes. Plant and Soil. 205: 85-92.

**Saleh Rastin, N. 2001.** Biofertilizers and their role in order to reach to sustainable agriculture. A compilation of papers of necessity for the production of biofertilizers in Iran. 1-54 pp.

**Sephidkon, F. 2001.** Study of quantitative and qualitative of fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.) essential oil in different growth stages. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 7: 85-104.

**Sharifi Ashorabadi, E., G. R. Amin, M. Mirza and M. Rezvani. 2002.** Effect of plant nutrition systems (chemical, intermediate and organic systems) on quality of fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.). Pajouhesh & Sazandegi. 56 and 57: 78-87.

**Sharma, A. K. 2002a.** Biofertilizers for Sustainable Agriculture. Agrobios, India. 407 pp.

**Sharma, A. K. 2002b.** A handbook of organic farming. Agrobios, India. 627 pp.

- Shivaputra, S. S., C. P. Patil, G. S. K. Swamy and P. B. Patil.** 2004. Effect of vesicular-arbuscular mycorrhiza fungi and vermicompost on drought tolerance in papaya. *Mycorrhiza News*. 16: 12-13.
- Singh, S. and K. K. Kapoor.** 1998. Effects of inoculation of phosphate-solubilizing microorganisms and an arbuscular mycorrhizal fungus on mungbean grown under natural soil conditions. *Mycorrhiza*. 7: 249-253.
- Singh, S. and K. K. Kapoor.** 1999. Inoculation with phosphate-solubilizing microorganisms and a vesicular-arbuscular mycorrhizal fungus improves dry matter, yield, nutrient uptake by wheat grown in a sandy soil. *Biol. Fert. Soils*. 28: 139-144.
- Subramanian, K. S., P. Santhanakrishnan and P. Balasubramanian.** 2006. Responses of field grown tomato plants to arbuscular mycorrhizal fungal colonization under varying intensities of drought stress. *Sci. Horticulturae*. 107: 245-253.
- Zaller, J. G.** 2007. Vermicompost as a substitute for peat in potting media: Effects on germination, biomass allocation, yields and fruit quality of three tomato varieties. *Sci. Horticulturae*. 112: 191-199.

## Effect of mycorrhiza, vermicompost and phosphate biofertilizer application on flowering, biological yield and root colonization in fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.)

Darzi, M.T.<sup>1</sup>, A. Ghalavand<sup>2</sup> and F. Rejali<sup>3</sup>

### ABSTRACT

**Darzi, M.T., A. Ghalavand and F. Rejali.** 2008. Effect of mycorrhiza, vermicompost and phosphate biofertilizer application on flowering, biological yield and root colonization in fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.). **Iranian Journal of Crop Sciences.** 10 (1):88-109.

In order to study the effect of biofertilizers on flowering, biological yield and root colonization in fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.), an experiment was conducted in 2005 and 2006 growing seasons. The factors were mycorrhizal inoculation (inoculated and non-inoculated), phosphate biofertilizer (0, 30 , 60 Kg/ha) and vermicompost (0 , 5 , 10 Ton/ha). The treatments were arranged as factorial in a randomized complete blocks design with eighteen treatments and three replications. These treatments together with a chemical fertilizer control treatment (NPK: 90, 60 and 90 Kg/ha) were also evaluated using a randomized complete blocks design with nineteen treatments and three replications. Results showed that the highest umbrella no./plant, biological yield and root colonization percent were obtained with mycorrhiza treatment. Phosphate biofertilizer also showed significant effect on these traits. The maximum umbrella no./plant and root colonization percent were related to the plots with application of 60 Kg/ha of phosphate biofertilizer. The highest biological yield were obtained with application of 30 Kg/ha phosphate biofertilizer. The maximum umbrella no./plant and biological yield were obtained from vermicompost (10 ton/ha). The highest root colonization percent were also obtained with application of five ton/ha vermicompost. There were positive and synergistic interactions between factors. For example, interactions between mycorrhizal inoculation × vermicompost on biological yield. Differences between control and biofertilizer treatments were significant, as umbrella no./plant and biological yield in treatment of inoculation with mycorrhiza, application of 60 kg/ha phosphate biofertilizer and 10 ton/ha vermicompost were higher than control. Root colonization percent in treatment of inoculation with mycorrhiza, application of 60 Kg/ha phosphate biofertilizer and five ton/ha vermicompost was also greater than control.

**Key words:** Fennel, Mycorrhiza, Phosphate biofertilizer, Vermicompost, Flowering, Biological yield, Root colonization.

---

**Recieved: December 2007**

1- Assistant professor, Islamic Azad University, Roodhen Unit, Roodhen, Iran (Corresponding author)

2- Associate professor, Faculty of Agriculture, The University of Tarbiat Modarres, Tehran, Iran

3- Assistant professor, Soil and Water Research Institute, Tehran, Iran