"مجله علوم زراعی ایران"
جلد نهم، شماره ٤، زمستان ١٣٨٦

نکاتي در مورد آزمایش های مقایسه ارقام در چغندرقند
Some remarks on variety trials in sugar beet

سیدیعقوب صادقیان[1]، محمد عبداللهیان نوقابي[2] و حمید ابراهیمیان[3]

چکیده

صادقیان، س.ی.، م. عبداللهیان نوقابي و ح. ابراهیمیان. ١٣٨٦. نکاتي در مورد آزمایش هاي مقایسه عملکرد ارقام در چغندرقند. مجله علوم زراعي ایران. ٩ (٤): ٤١٤-٤٠١.

دقت و صحت آزمایش های زراعي چغندرقند به ویژه مقایسه ارقام در شرایطي که بخواهیم پارامترهای مختلف یک مدل آماری را به درستي برآورد نماییم، تحت تأثیر نوع طرح آماری، آرایش تیمارها، تکنیک های آزمایشي و تعداد تکرار قرار دارد. ارزیابي تیمارهای زراعي و یا آزمون ارقام جدید جهت ثبت یا تعیین ارزش زراعي آنها در مزرعه و یا گلخانه، احتیاج به طرح آماری مناسب دارد. شرایط و عوامل مختلفي از جمله ژنوتیپ، مکان، سال، تکنیک های زراعي و غیره بر عملکرد مواد گیاهي دخالت دارند که بعضي از این عوامل قبل از اجرای آزمایش شناخته شده نیستند و باعث تغییراتي مي شوند که دقت و صحت یک آزمایش به زراعي یا به نژادی چغندرقند در مزرعه را تحت تأثیر قرار مي دهند. علاوه بر عوامل تحت بررسي، تغییرات خارجي را به عنوان 'اشتباه آزمایش" مي توان نام برد. نوع و مقدار اشتباه آزمایشي ممکن است از منابع مختلف منشأ گرفته باشد که مهمترین آنها شامل دقت و صحت تکنیک ها و اندازه گیری ها و نوع طرح آزمایشي مي باشد. انتخاب طرح آزمایشي، تابعي از تعداد عوامل موثر در آزمایش و شرایط اجرای آنها مي باشد. در طرح های بلوکي، قرار گرفتن کرت ها باید در جهتي باشد که آثار ناشي از اختلاف خاک، تغذیه و عملیات زراعي در اشتباه آزمایشي به حداقل برسد. برای این منظور باید جهت بلوک های آزمایش عمود بر جهت کاشت باشد. مزرعه آزمایشي مناسب در کاهش واریانس اشتباه بسیار موثر است و رویش یکنواخت بذر چغندرقند علاوه بر خصوصیات ژنتیکي بستگي به کیفیت عملیات خاک ورزی و آماده سازی بستر خاک دارد. اندازه کرت و تعداد بوته در هر کرت در زمان یاداشت برداری بسیار مهم است. به طوریکه با افزایش سطح کرت چغندرقند اشتباه بین کرت های آزمایشي تا حدی کاهش و سپس افزایش مي یابد. یکنواختي کرت به اندازه آن بستگي دارد. کرت های بزرگ اشتباه آزمایشي را افزایش و کرت های کوچک دقت آزمایش را کاهش مي دهد. سطح متوسط کرت و تعداد بوته در کرت در زمان یادداشت برداری و برداشت نهایي باید در حدکافي باشند تا اشتباه آزمایشي همواره در سطح حداقل باقي بماند. چنانچه مقایسه ارقام در چند سال و چند منطقه انجام گیرد، اثرات ثابت یا تصادفي عوامل تغییرات در مدل آماری با توجه به ماهیت آنها باید طوری در نظر گرفته شوند که برآورد دقیقي از واریانس آن عوامل بدست آید. در طرح های مقایسه ارقام چغندرقند عمدتاً از طرح بلوک های کامل تصادفي و طرح های لاتیس استفاده مي شود که هرکدام مزایا و معایبي دارند. به منظور کاهش واریانس اشتباه و افزایش دقت آزمایش، مقایسه ارقام در مزرعه باید طوری اجرا شود که بلوک های کامل و یا بلوک های ناقص (طرح لاتیس) در خاک یکنواخت قرار گیرند. از آنجایي که رقابت بین ارقام تجاری چغندرقند از نظر صفات کمي و کیفي بسیار نزدیک است، بنابراین بکارگیری مدل آماری مناسب براساس نوع و ماهیت عوامل تغییرات موجب برآورد دقیقي از عملکرد تیمارها مي شود و آن نیز منجر به گزینش ارقام و لاین های برتر در آزمایش های به نژادی مي گردد.

واژه های کلیدی: چغندر قند، طرح آزمایشي، مقایسه ارقام، کرت آزمایشي و نمونه برداری

تاریخ دریافت: ٨٥/١١/٥

١- استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
٢- استاد یار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
٣- عضو هیات علمي مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعي استان اصفهان

[Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2026-11-12]
[DOR: 20.1001.1.15625540.1386.9.4.8.0]

مقدمه

در رابطه با انتخاب یک طرح مناسب جهت انجام مقایسه ارقام چغندرقند باید به هدف اصلی آزمایش یعنی تعیین اختلاف ارقام از نظرعملکرد شکر و گاهی از نظر مقاومت به بیماری ها توجه خاصی نمود. مقایسه ارقام باید با دقت زیاد انجام شود و از منابع مورد آزمایش براورد مناسبی بعمل آید. اگر طرح ازمایشی چند عاملی باشد، مانند بلوک، کرت اصلی داخل بلوک و کرت های فرعی داخل کرت اصلی، به نژادگر باید اطمینان حاصل نماید که ١) کدام مقایسه و در مورد چه عاملی انجام گیرد؟ ٢) مقدار عددی درجه آزادی جهت برآورد واریانس باقیمانده در هر عامل چقدر است (Wauters, 2002).

صورت مساله و اهداف پیشنهادی در یک طرح تحقیقاتی چغندرقند باید مورد توجه خاص قرارگیرد. اگر هدف طرح کشف یا بیان رابطه بین صفات مختلف در ارقام زراعی باشد، مثلاً رابطه عملکرد چغندر یا عیار قند با بعضی از صفات گیاهی مانند فرم برگ، قطر طوقه و قدرت جوانه زدن، باید در خصوص انتخاب مواد گیاهی و نوع آزمایش دقت کافی به عمل آید. به عنوان مثال آیا لازم است تمام ارقام تجاری یا هیبریدهای حاصل از تعداد معدودی لاین در آزمایش وارد شوند؟ و یا ضرورت دارد که آزمایش در تمام مناطق چغندرکاری اجرا شود؟ اگر هدف تحقیق بررسی رابطه پیچیده بین چند عامل و یا اثر متقابل آنها باشد در آن صورت باید عوامل مهم از جمله تراکم بوته در آزمایش های به زراعی و یا عملکرد شکر در ازمایش های به نژادی که در میان عوامل موجود از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، از قبل مشخص و تعریف شوند. دیگر اینکه برای تبیین عوامل اصلی آیا لازم است عوامل دیگر نیز به آزمایش اضافه شوند؟ به عنوان مثال در یک منطقه، در بررسی اثر کود نیتروژن بر عملکرد چغندرقند آیا عامل اضافی مانند ساختمان فیزیکی خاک نیز باید در نظر گرفته شود؟ (Dyke, 1997).

قبل از انجام تجزیه واریانس داده ها لازم است به فرض نرمال بودن توزیع خطاها و نیز یکنواختی واریانس های درون تیمارها توجه شود و در صورت صادق نبودن این فرض ها تغییر و تبدیل داده ها به نحومقتضی صورت گیرد. به طورکلی با توجه به اهداف ازمایش، لازم است شکلی از تجزیه داده ها که برای مقایسه تیمارها و سطوح آنها مناسب تر است، انتخاب گردد (Kristensen and Hill, 2002).

آزمایش مقایسه ارقام جهت ثبت رقم و حمایت از حقوق به نژادگر در کشورهای اروپایی طی دو مرحله انجام می شود. مرحله اول ازمون شامل بررسی تمایز و تعیین یکنواختی و پایداری (آزمون DUS)[1] ارقام می باشد که ممکن است در گلخانه و مزرعه انجام گیرد. در آزمون DUS صفاتی مثل تیپ رشد، فرم ریشه، قطر طوقه، طول ریشه در مزرعه اندازه گیری می شود. صفاتی چون رنگ هیپوکوتیل، رنگ ریشه، رنگ برگ، طول دمبرگ، طول و عرض برگ و ارتفاع طوقه در گلخانه نیز قابل اندازه گیری هستند. زمانی که یک رقم چغندرقند از نظر صفات مورد بررسی در دستورالعمل ملی آزمون ثبت تایید و نامگذاری شد می تواند در لیست ملی ارقام ثبت شده قرار گیرد. آزمون دیگر یک رقم به تعیین ارزش زراعی[2] ان مربوط می شود. در این آزمون عملکرد ریشه، عملکرد قند و صفات کیفی و مقاومت به بیماریها ارزیابی می شود. اگر ارزش زراعی رقم جدید در حد ارقام توصیه شده باشد نام ان به لیست ملی سالیانه ارقام قابل توصیه[3] اضافه می شود. در بعضی از کشورها این دو آزمون با هم انجام می گیرد و پس از ازمون DUS ازمون ارزش زراعی ممکن است یک سال دیگر ادامه یابد. در بعضی از کشورها دو آزمون جداگانه انجام می گیرد و طول مدت آن ۴ یا ۵ است. در

1- Distinctness, Uniformity and Stability (DUS)
2- Cultural Value
3- Recommended Variety List

[Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2026-11-12]

[DOR: 20.1001.1.15625540.1386.9.4.8.0]

چنین شرایطی ازمون تعیین ارزش زراعی پس از ازمون DUS صورت می گیرد. لازم به توضیح است که در آزمون تعیین ارزش زراعی بعضی از صفات مثل مقاومت به بیماریها و تنش های محیطی شامل مقاومت به نماتد، ریزومانیا، سرکسپورا، بولتینگ و خشکی نیز در نظر گرفته می شود (Wevers, 2003).

تکنیک های کاشت و داشت چغندرقند

ایده کلی بر این است که کلیه کرت ها و تکرارها در طول فصل رشد چغندرقند یکسان تیمار شوند. کرت های ازمایشی باید طوری قرار بگیرند که اختلافات ناشی از خاک ورزی و عملیات زراعی و کاربرد حشره کش ها و تغذیه گیاه به حداقل ممکن برسد. بنابراین، انتخاب قطعه زمین یکنواخت برای اجرای تیمارهای آزمایش اهمیت زیادی دارد. در نتیجه، قبل از عملیات خاک ورزی و تهیه بستر بذر لازم است به سابقه زمین، محصول قبلی و محل نهرهای آبیاری و احتمالا مسیر حرکت ماشین آلات در سال گذشته به دقت توجه نمود. در چنین شرایطی باید سعی شود که نقشه آزمایش به نحوی پیاده شود که بلوک های آزمایشی در قسمت یکنواخت زمین و نهر یا مسیر ماشین الات ترجیحا در خارج از قطعه و یا حداقل در بین دو بلوک واقع شوند. باید سعی شود که همه تغییرات ناشی از عملیات زراعی و استعمال حشره کش ها در سطح تمام کرت های داخل یک بلوک یکنواخت باشد.

وضعیت سبز مزرعه آزمایشی و تراکم بوته های چغندرقند در طول فصل رویش باید در تمام کرت ها و تکرارها از یکنواختی لازم برخوردار باشد. رویش یکنواخت گیاهچه به تهیه بستر بذر مناسب ارتباط دارد و البته هنگام خاک ورزی استفاده از تایرهای عریض (دوقلو) یا کم کردن فشار باد لاستیکها در کاستن کوبیدگی زمین و در نتیجه کاهش اشتباه آزمایشی بسیار موثر است. برای اطمینان از سبز یکنواخت آزمایش باید عمق کاشت بذر در همه کرت ها یکنواخت باشد و در ضمن دقت کاشت بذرکار بسیار اهمیت دارد. زمان کاشت و دمای خاک در یکنواختی رویش، سطح پوشش و عمق توسعه ریشه چغندرقند و در نتیجه بر عملکرد شکر سفید تأثیر داشتند و این عوامل به شرایط محیطی ازمایش بستگی دارند (Pidgeon *et al.*, 2000). مصرف کود نیتروژن باید بطور ردیفی در کنار ردیف و پای بوته چغندرقند صورت گیرد. مصرف کودهای الی نیز باید کاملا یکنواخت باشد چون نایکنواختی این عملیات زراعی اشتباه آزمایشی را افزایش می دهد (Wauters, 2002).

مصرف علف کش های پیش رویش (Pre-emergence) و پس رویشی (Post-emergence) باید با دقت زیاد در مزرعه آزمایشی چغندرقند انجام گیرد. مصرف دوبار علف کش ممکن است اثرات منفی روی رویش یا رشد چغندرقند داشته باشد. برای این کار بهتر است مصرف علف کش بار دوم بین ردیف ها و بین بلوک ها انجام گیرد. به دلیل تفاوت ژنتیکی، اثر متقابل علف کش × ژنوتیپ در بعضی از ارقام گزارش شده است. از آنجائیکه عکس العمل ارقام مختلف نسبت به تمام علف کش های انتخابی موجود در بازار یکسان نیست، بهتر است در مقایسه ارقام چغندرقند از دز کم علف کش ها استفاده شود (Pidgeon *et al.*, 2000).

تکنیک های برداشت

محصول کرت های یک ازمایش باید در کوتاه ترین زمان ممکن برداشت شود. معمولا در اواخر فصل عملکرد شکر حدود ۱۰۰-۵۰ کیلوگرم در هکتار در هر روز اضافه می شود. برداشت دستی ممکن است اشتباهاتی در برآورد عملکرد واقعی ارقام چغندرقند به وجود آورد. بنابراین برداشت و تمیز کردن مکانیزه در برآورد دقیق تر نتایج واقعی کمک می کند. برداشت ماشینی در آزمایش های دارای کرت های سه ردیفه آسان تر است و در آزمایش های شش ردیفی امکان حذف اثر ردیف های حاشیه وجود دارد. سرزنی چغندرقند قبل یا بعد از برداشت بسیار مهم است. در

[Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2026-11-12]

[DOR: 20.1001.1.15625540.1386.9.4.8.0]

ازمایش های مقایسه ارقام، ارتفاع طوقه از کرتي به کرت دیگر ممکن است متفاوت باشد. در این صورت ماشین برداشت ممکن است موجب سرزني نابکنواخت شود و بعد از سرزني، اشتباه ازمایشي برای وزن و راندمان استحصال شکر افزایش یابد و در نتیجه گروه بندی ارقام به درستي انجام نگیرد.

سرزني چغندرقند در کیفیت و نگهداری بعد از برداشت ان تاثیر دارد. بعد از برداشت، قند ذخیره شده در ریشه از طریق تنفس مصرف مي شود. در ٤٨ ساعت اولیه پس از برداشت، میزان تنفس بسیار مهم است (١٠٠ گرم شکر در ١٠٠٠ کیلوگرم چغندرقند در روز). بهرحال بوته های برداشت شده باید در جاهای مناسب نگهداری و مستقیما توزین و از ان خمیرگیری بعمل آید. برای کاهش خطای آزمایش در زمان برداشت محصول بهتر است برداشت طوری برنامه ریزی شود تا کلیه کرت های برداشت شده در حداقل زمان ممکن توزین و از ریشه چغندرقند خمیرگیری شود. اگر در برداشت کامل یک ازمایش محدودیت وجود داشته باشد بهتر است یک یا چند بلوک (تکرار) در همان روز بطور کامل برداشت و خمیرگیری از آنها صورت گیرد و اگر احیانا قسمتي از برداشت ازمایش و نمونه گیری به روز بعد موکول گردد، لازم است بلوک ها یا تکرارهای باقیمانده بطور کامل در روز بعد برداشت و عملیات توزین و خمیرگیری انها هرچه سریعتر انجام گیرد (Steensen and Augustinussen, 2002).

همانطور که بیان شد آزمایش های چغندرقند (به نژادی و به زراعي) باید فاقد بوته گمشده باشند. نتایج تحقیق ابراهیمي کولائي (١٣٧٤) نشان داد که در صورت ممکن مزرعه آزمایشي باید فاقد بوته های گمشده باشد و تعیین ضرایب تصحیح نمي تواند از دقت کافي در تصحیح داده های گمشده برخوردار باشد. بنابراین، عملکرد واقعي تیمارهای آزمایشي مشخص نمي شود. نامبرده یک فرمول منطقي برای تصحیح بوته های گمشده برای صفاتي مانند عملکرد ریشه و قند ارائه نکرد و اظهار داشت که تعیین ضریب تصحیح بوته های گمشده در شرایط اب وهوائي ایران باید با احتیاط انجام گرفته و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد و بهترین راه حل نداشتن بوته های گمشده در طرح ازمایشي است.

نمونه برداری چغندرقند از کرت آزمایشي

تمیز کردن اولیه ریشه های چغندرقند برداشت شده مهم است، چون دو نوع خاک به همراه ریشه ها منتقل مي شود یکي خاک بین ریشه ها و دیگری خاک چسبیده به شیار ریشه ها. برای کاهش میزان خاک نمونه ها، تمیز کردن اولیه ریشه توصیه مي شود تا خاک آزاد همراه نمونه ها حذف شود. نتایج بررسي های انجام شده نشان مي دهد که تعداد ریشه در زمان خمیرگیری حایز اهمیت است. در یک ازمایش تقسیم مساحت $10m^2$ برداشت به چهار بخش کوچکتر نشان داد که عیارقند و کیفیت ریشه در نمونه های یک کیسه ای (٣٥ ریشه) و دوکیسه ای (٧٠ ریشه) دارای تغییرات زیادی بود. فقط در حالاتي که خمیرگیری از سه کیسه (١٠٥ ریشه) انجام گرفت، ضریب تغییرات (CV) و مقدار LSD به حداقل رسید. اگر سطح کرت برداشت شده کمتر از m^2 ٨ باشد اشتباه آزمایش عیارقند و اجزاء ناخالصي ریشه افزایش مي یابد (Steensen and Augustinussen, 2002). در تعیین تعداد ریشه مناسب در اندازه گیری عیارقند و کیفیت ریشه، گوهری و همکاران (١٣٨١) مشاهده کردند که حداقل ٦٥ ریشه مي تواند نماینده واقعي یک رقم تجارتي چغندرقند (رقم مولتي ژرم تریپلوئید IC) باشد. باوجود این، روش خمیرگیری این تحقیق خالي از اشکال نبوده است، زیرا در هر بار خمیرگیری ١٠ ریشه به نمونه هایي که در مرحله قبل خمیرگیری شده بودند، اضافه شد و در نتیجه، این روش اشتباه ازمایشي را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

در آزمایشي دیگر (توسط نگارندگان) از یک کرت ازمایشي سه خط ٨ متری (هر خط شامل حدود ٤٠ ریشه) بطور جداگانه برداشت، توزین و پس از

[Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2026-11-12]

[DOR: 20.1001.1.15625540.1386.9.4.8.0]

شستشو خمیرگیری شد. میانگین عیار نمونه خمیر سه خط که جداگانه خمیرگیری شده بودند با میانگین عیار مخلوط خمیر دو خط، مخلوط خمیر سه خط و خمیر یک خط از نظر صفات کیفی مورد مقایسه قرار گرفت (جدول ۱). نتایج حاصل از تجزیه کیفی نمونه ها به صورت شش تیمار و ٦٤ تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهای ازمایش بر درصد قند معنی دار ($P > 0.55$) نبود (جدول ۲). مقایسه میانگین نتایج حاصله بر اساس ازمون LSD نیز نشان داد که بین تیمارها از لحاظ درصد قند تفاوت آماری ($P<0.05$) وجود ندارد (جدول ۳). به عبارت دیگر از هر کرت ازمایشی که معمولا شامل سه خط ۸ متری است، چنانچه برای اندازه گیری درصد قند از هر کرت یک خط (شامل حدود ٤٠ ریشه) و یا اینکه از سه خط به طور جداگانه تجزیه کیفی بعمل اید و سپس میانگین عیار قند سه خط، به عنوان معیار کرت مورد استفاده قرارگیرد، تفاوت اماری معنی داری بین تیمارها ملاحظه نمي شود. با توجه به هزینه بالای تجزیه شیمیایي هر نمونه از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است که فقط یک نمونه خمیر از هر کرت تهیه و تجزیه گردد.

باید توجه داشت که مهمترین نکته در تهیه نمونه خمیر از یک کرت تعداد بوته ای است که از کرت برداشت و از ان خمیر تهیه مي شود.

در چغندرقند دو منبع موجب تغییرات در عیارقند مي شود. نخست هر تک ریشه با تک ریشه دیگر از نظر ژنتیکي مقداری اختلاف در عیار قند دارد و دوم توزیع شکر (عیار) در نقاط مختلف یک ریشه یکنواخت

جدول ۱- تیمارهای آزمایشی جهت تجزیه کیفی نمونه خمیر چغندرقند

Table 1. Experimental treatments for quality analysis of sugar beet pulp sample

ردیف No.	تیمارها Treatments	توضیح تیمارها Treatments details
1	خط شماره ۱ 1st row	نمونه خمیر تهیه شده از ریشه های چغندرقند خط شماره ۱ هر کرت Pulp sample was taken from beet roots of 1st row in plot
2	خط شماره ۲ 2nd row	نمونه خمیر تهیه شده از ریشه های چغندرقند خط شماره ۲ هر کرت Pulp sample was taken from beet roots of 2nd row in plot
3	خط شماره ۳ 3rd row	نمونه خمیر تهیه شده از ریشه های چغندرقند خط شماره ۳ هر کرت Pulp sample was taken from beet roots of 3rd row in plot
4	میانگین ۳ خط (شاهد) Mean of 3 rows (Check)	میانگین خطوط ۱، ۲و ۳ هر کرت برای صفت مورد نظر (شاهد) Mean data of 3 rows for each traits (Check)
5	مخلوط ۲ خط Mixture of 2 rows	نمونه خمیر تهیه شده از مخلوط خمیر خطوط ۱ و ۲ هرکرت Mixture pulp sample was taken from 1st and 2nd rows in plot
6	مخلوط۳ خط Mixture of 3 rows	نمونه خمیر تهیه شده از مخلوط خمیر خطوط ۱، ۲و ۳ هرکرت Mixture pulp sample was taken from 1st, 2nd and 3rd rows in plot

جدول ۲- نتایج تجزیه واریانس عیار قند برای تیمارهای مختلف نمونه برداری خمیر از کرت های آزمایشی

Table 2. ANOVA for sugar beet pulp samples taken from experimental plots

S.O.V. منابع تغییر	درجه آزادی DF	مجموع مربعات SS	میانگین مربعات MS	مقدار F F value	سطح احتمال P value
Treatment تیمار	5	12.437	2.487	0.80	0.549
Error خطا	475	1164.247	4.102	-	-
Total کل	480	1175.684	-	-	-

[Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2026-11-12]

[DOR: 20.1001.1.15625540.1386.9.4.8.0]

جدول ٣- میانگین عیار قند برای تیمارهای مختلف نمونه برداری خمیر از کرت های ازمایشی

Table 3. Mean and standard deviation of sugar content for various treatments of pulp samples taken from experimental plots

Treatments	تیمارها	تعداد نمونه No. of samples	میانگین عیار (%) Sugar content (%)	انحراف معیار Standard deviation
1st row	خط شماره ١	64	16.95	1.710
2nd row	خط شماره ٢	64	16.83	1.807
3rd row	خط شماره ٣	64	16.89	1.982
Mean of 3 rows (Check)	میانگین ٣ خط (شاهد)	63	16.86	1.669
Mixture of 2 rows	مخلوط ٢ خط	63	16.51	1.724
Mixture of 3 rows	مخلوط ٣ خط	63	16.50	1.649
C.V. (%)	ضریب تغییرات (%)		10.51	

نیست. یعني در قسمت سر و طوقه عیار قند بسیار کمتر از قسمت ذخیره ای ریشه است. به عنوان مثال متوسط عیار ده رقم تجارتي چغندرقند در قسمت سر، طوقه و ریشه به ترتیب ٦/٤٩، ١٠/٢٥ و ١٩/٣٩ گزارش شده است (عبداللهیان نوقابي، ١٣٨٧). بنابراین وقتي که از یک کیسه حاوی حدود ٤٠ ریشه نمونه خمیر تصادفي با ماشین اره تهیه مي گردد (معمولا حدود ٤٠٠-٣٠٠ گرم)، هر ذره خمیر دارای یک عیار است که به این لحاظ مخلوط نمودن کامل نمونه خمیر تهیه شده بسیار با اهمیت بوده و مورد تاکید قرار مي گیرد. بنابراین، از عوامل مهم تغییرات اساسي در کیفیت و عیارقند عبارت از تعداد ریشه ها در هر نمونه و نحوه تهیه خمیر مي باشد. به طور کلي ظرفیت دیگ های خمیرگیری نمونه ازمایشي باید حدود ١٠٠ ریشه در هر بار خمیرگیری باشد.

طرح های آزمایشي مورد استفاده در مقایسه ارقام چغندرقند

در تحقیقات به نژادی چغندرقند به ندرت چند طرح آزمایشي را برای یک هدف خاص در نظر مي گیرند. اگر تعداد تیمار در طرح بلوک های کامل تصادفي افزایش یابد، بلوک ها بزرگتر و اثر تیمار غیر یکنواخت تر مي شود. با افزایش تیمارها به منظور کاهش اشتباه آزمایشي داخل تکرار در بلوک های کامل تصادفي، طرح های بلوک ناقص پیشنهاد گردید که در آن یک بلوک کامل به واحدهای کوچکتر یا بلوک های ناقص کوچک تقسیم مي گردد (Yndgaard, 1980).

یندگارد (Yndgaard, 1980) دریافت که طرح بلوک های ناقص موجب افزایش دقت آزمایش و کاهش واریانس اشتباه عملکرد ریشه در آزمایش های چغندرقند در مناطق مختلف اروپا مي گردد. مقایسه طرح لاتیس و طرح بلوک های کامل تصادفي در پنج آزمایش چغندرقند در دانمارک نشان داد که مقدار LSD برای عملکرد ریشه و ماده خشک اندام های هوائي به ترتیب ١٦% و ٢٥% کاهش داشت. علاوه بر این، آزمایش های زیادی در اروپا اجرا شد و نشان داد که برای عملکرد ریشه، برتری نسبي طرح های لاتیس نسبت به طرح های بلوک های کامل تصادفي در سال های ١٩٩٦ و ١٩٩٧ به ترتیب ٢٢% و ٢٣% افزایش یافت. این افزایش برای عیارقند به ترتیب ٣٠% و ٣٧% بود (Yndgaard *et al.*, 2002 a). اصول فني و میزان دسترسي به منابع در تعیین تعداد محیط های آزمایشي به نژادی موثر هستند. در مکان های غیریکنواخت با افزایش تعداد تکرار کیفیت آزمایش بالا مي رود و بدین طریق

[Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2026-11-12]

[DOR: 20.1001.1.15625540.1386.9.4.8.0]

دقت ازمایش در این مکان ها با دقت مکان های یکنواخت مشابه می شود.

نتایج آزمایش های چغندرقند در سال ۱۹۹۷ در جمهوری چک توسط گروه ژنتیک و اصلاح نباتات انجمن IIRB برای دو صفت عیارقند و عملکرد ریشه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (Yndgaard *et al.*, 2002 b). نتایج تجزیه واریانس لاتیس بدون اینکه اطلاعات داخل بلوک های نا‌قص استخراج شود در جدول شماره ۴ ارائه گردیده است. اثر بلوک های ناقص برای هر دو صفت معنی دار گردید. در عین حال، هنگامی که اختلاف بین بلوک های کوچک معنی دار نشد، این اختلاف در تجزیه های بعدی چشم پوشی شده و مدل طرح به صورت بلوک های کامل تصادفی (RCBD) منظور گردید. برای عملکرد ریشه، اثر ژنوتیپ در سطح احتمال ۵% معنی دار نبود (جدول ۴) ولی این اثر در سطح احتمال ۵/۸% معنی دار شد (بسیار نزدیک به سطح استاندارد ۵%) در حالی که سطح احتمال برای اثر ژنوتیپ در مورد عملکرد ریشه در طرح بلوک های کامل تصادفی ۳۶/۹ % بدست آمد (جدول ۵).

در خصوص عیار قند، در هر دو حالت (طرح بلوک های کامل تصادفی و طرح لاتیس) به دلیل وجود F معنی دار می توان ژنوتیپ ها را از نظر عیارقند گروه بندی کرد و مقایسه جفتی تیمارها از نظر عیارقند توجیه آماری لازم را دارا می باشد (جداول ۴ و ۵). ولی با توجه به اینکه برای صفات مهم عملکرد ریشه و عیار قند اختلاف بین دو طرح لاتیس و طرح بلوک های کامل تصادفی از نظر واریانس اشتباه زیاد است، این امر مبین برتری نسبی طرح لاتیس بر طرح بلوک های کامل تصادفی و در نتیجه کارایی بیشتر طرح لاتیس در شناسایی اختلافات ژنتیکی ارقام و مواد به نژادی چغندرقند می باشد.

اگر تیمارهایی با یک تکرار در چند محیط مورد آزمایش قرار گیرند، ارزش ژنتیکی آنها دقیق تر از یک مکان با چند تکرار بر آورد می شود. بررسی کرت های ازمایشی در چغندرقند نشان داد که در مقایسه ارقام، کرت های سه ردیفه از نظر عملی مناسب تر هستند (Buchse and Vurat, 2002). شاخص هایی که برای تعیین ارزش زراعی ارقام در کشورهای مختلف استفاده می شود ممکن است متفاوت باشد و معمولا برای قرار گرفتن ارقام جدید در لیست ارقام قابل توصیه کشورهای اروپایی دو شاخص مهم در نظر گرفته میشود. یکی قرار گرفتن آن رقم در لیست ارقام قابل توصیه ملی کشور مبدا و دیگری عملکرد ان رقم در کشور مبدا و یا در کشورهایی که مورد آزمون قرار گرفته است (Wevers, 2002).

آزمایش های مقایسه ارقام از لحاظ مقاومت به بیماریها و تنش های محیطی

در مقایسه ارقام تجارتی، هیبریدها و لاین های چغندرقند جهت بررسی مقاومت به بیماریها و تنش های محیطی احتیاج به ارقام شاهد می باشد. ترجیح داده می شود ارقام یا لاین های شاهد از مواد ژنتیکی شناخته با عملکرد بالا باشند و تغییرات واریانس آنها در تکرارهای مختلف یک آزمایش مشابه تغییرات واریانس ارقام جدید و هیبریدهای مورد بررسی باشد. در ازمون F، ارقام شاهد نباید موجب معنی دار شدن اثر ارقام یا ژنوتیپ ها گردد، در غیراین صورت حتی با " F معنی دار" به نژادگر در استفاده از LSD در گروه بندی ارقام و لاین ها موفق نیست.

رقم شاهد از نظر بروز صفت مورد مطالعه نباید در حدی بسیار بالا تر و یا بسیار پایین تر از ارقام مورد مطالعه قرار گیرد. در آزمایش های بررسی مقاومت به بیماری ها، رقم خیلی حساس (شاهد) به دلیل میزان و شدت آلودگی بالا در گلخانه یا مزرعه دارای عملکرد محصولی بسیار پایین خواهد بود و در نتیجه داده های عملکرد رقم حساس نمی تواند در تجزیه واریانس کل ازمایش و مقایسه عملکرد ارقام منظور شود. اگر میزان آلودگی در حدی باشد که رقم حساس یا مقاوم به

[Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2026-11-12]

[DOR: 20.1001.1.15625540.1386.9.4.8.0]

جدول ۴- تجزیه واریانس صفات عملکرد ریشه و عیار قند ۴۹ رقم چغندر قند در طرح لاتیس

Table 4. ANOVA for root yield and sugar content of sugar beet in lattice design

S.O.V.	منابع تغییرات	درجه آزادی df	عملکرد ریشه Root yield		عیار قند Sugar content	
			میانگین مربعات MS	سطح احتمال P value	میانگین مربعات MS	سطح احتمال P value
Genotype (adjusted)	ژنوتیپ (تصحیح شده)	48	23.30	0.058	0.352	0.00
Replication	تکرار	2	103.29	-	1.72	-
Incomplete-blocks within replication	بلوک ناقص داخل تکرار	18	73.37	0.00	0.41	0.00
Error	اشتباه	76	15.60	-	0.037	-
Coefficient of determination	ضریب تشخیص	-	0.71	-	0.91	-

جدول ۵- تجزیه واریانس صفات عملکرد ریشه و عیارقند ٤٩ رقم چغندر قند در طرح بلوک کامل تصادفی

Table 5. ANOVA for root yield and sugar content of sugar beet in RCBD

S.O.V.	منابع تغییرات	درجه آزادی df	عملکرد ریشه Root yield		عیار قند Sugar content	
			میانگین مربعات MS	سطح احتمال P value	میانگین مربعات MS	سطح احتمال P value
Genotype	ژنوتیپ	48	28.80	36.90	0.40	0.00
Replication	تکرار	2	103.29	2.40	1.73	0.00
Error	اشتباه	94	26.66	-	0.106	-
Coefficient of determination	ضریب تشخیص	-	0.38	-	0.69	-

تنهائي در معني دارشدن F تاثير داشته باشد در اين صورت مقايسه اورتوگونال رقم شاهد (مقاوم و يا حساس) در مقابل بقيه مواد آزمايشي بايد مورد توجه قرار گيرد.

در جدول شماره ۶ ميانگين های ۴۹ رقم چغندرقند كه در يک طرح لاتيس مورد آزمايش قرار گرفتند (۴۶ رقم به همراه سه شاهد) برای صفت عيارقند گروه بندی شدند (Yndgaard, 2002; Yndgaard *et al.*, 2002 b). علامت C در جلو شماره رقم اختصاص به ارقام شاهد يا كنترل در شماره های ۱، ۲۵ و ۴۹ دارد. در اين جدول، شماره تيمار، تعداد تكرار، ميانگين و ميانگين تصحيح شده و ميانگين تيمارها نسبت به رقم شاهد به انضمام علائم و امتياز هر رقم مشخص شده است. ستون های دارای علائم E(Extreme)، M(General Mean) و يا C(Control) به ترتيب مربوط به معني دار بودن تيمارها در دو گروه حد بالا (T) و پائين (B)، مقايسه تيمارها نسبت به ميانگين كل آزمايش و مقايسه تيمارها نسبت به ميانگين ارقام شاهد است. مثلاً تيمار شماره ۱ دارای علامت B است كه دلالت مي كند اين تيمار به گروه پايين ارقام از نظر ميانگين تعلق دارد و برعكس تيمار شماره ۱۰ در گروه بالا (T) قرار مي گيرد. علامت (-) به دنبال علامت B برای رقم ۱ موید اين است كه عملكرد اين رقم در سطح احتمال ۵% پايين تر از ميانگين آزمايش است. علامت (=) برای رقم ۱ نشان مي دهد كه عملكرد اين تيمار بطور معني داری (در سطح ۱%) كمتر از ميانگين سه رقم شاهد مي باشد. علامت معني دار + و *برای رقم شماره ۴۲ حاكي از آن است كه اين رقم به گروه بالاتر (LSD 5%) تعلق دارد و در سطح احتمال ۵% اين رقم بهتر از ميانگين آزمايش و همچنين در سطح احتمال ۱% برتر از ميانگين ارقام شاهد مي باشد. تيمارهای

[Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2026-11-12]

[DOR: 20.1001.1.15625540.1386.9.4.8.0]

جدول ٦- آزمون معني دار بودن اختلافات و علائم تيمار ها برای عيار قند در يک آزمايش ٤٩ رقمي چغندر قند

Table 6. Statistical test of significance for differences and marks for sugar content in a 49 sugar beet variety trial.

ارقام Entry	تکرار ۱ Rep 1	تکرار ۲ Rep 2	تکرار ۳ Rep 3	Tot rep	میانگین Mean	میانگین Mean adj.	میانگین Mean rel.	علامت Mark E	علامت Mark M	علامت Mark C	ترتیب Rank
1 -C	15.64	16.95	16.98	3	16.52	16.71	97.2	B	-	=	42
2	16.94	17.54	17.69	3	17.39	17.44	101.4				11
3	16.84	17.34	17.14	3	17.11	17.34	100.8				18
4	16.75	17.81	17.33	3	17.30	17.35	100.9				17
5	16.69	17.57	17.31	3	17.19	17.40	101.1				15
6	16.32	17.02	17.19	3	16.84	16.97	98.7				32
7	15.61	16.70	16.52	3	16.28	16.65	96.8	B	=	=	45
8	17.32	17.05	16.57	3	16.98	16.94	98.5				33
9	17.40	17.47	17.03	3	17.30	17.16	99.8				23
10	17.92	17.84	18.06	3	17.94	17.77	103.3	T	*	*	4
11	16.78	17.23	16.27	3	16.76	16.59	96.4	B	=	=	46
12	16.65	16.83	17.03	3	16.84	16.71	97.1	B	-	=	43
13	17.11	17.13	16.52	3	16.92	16.84	97.9			-	40
14	17.26	16.96	17.27	3	17.16	17.12	99.5				25
15	16.94	17.05	17.28	3	17.09	17.01	98.9				29
16	16.75	17.16	16.29	3	16.73	16.73	97.3	B	-	=	41
17	16.54	16.59	16.19	3	16.44	16.45	95.6	B	=	=	49
18	16.75	17.33	17.21	3	17.10	16.89	98.2			-	37
19	16.59	16.96	16.49	3	16.68	16.69	97.0	B	=	=	44
20	17.39	17.68	17.36	3	17.48	17.43	101.3				12
21	17.16	17.29	17.41	3	17.29	17.41	101.2				14
22	16.55	17.79	17.37	3	17.24	17.41	101.2				13
23	15.99	17.44	17.17	3	16.87	16.92	98.4				--
24	16.62	17.72	17.34	3	17.23	17.47	101.6				8
25-C	17.03	17.85	17.06	3	17.31	17.38	101.0				16
26	17.41	18.28	17.92	3	17.87	17.94	104.3	T	*	*	2
27	16.95	17.49	17.39	3	17.28	17.47	101.6				9
28	17.44	17.60	17.90	3	17.65	17.89	104.0	T	*	*	3
29	17.98	17.64	17.42	3	17.68	17.52	101.8		+	+	6
30	17.47	17.80	16.93	3	17.40	17.24	100.2				20
31	17.46	17.38	17.41	3	17.42	17.25	100.3				19
32	16.98	17.50	16.63	3	17.04	16.87	98.1			-	38
33	17.52	17.17	16.98	3	17.22	17.10	99.4				26
34	17.24	17.18	17.02	3	17.15	16.93	98.4				34
35	17.15	17.68	16.80	3	16.88	16.89	98.2			-	36
36	16.62	17.46	16.91	3	17.00	17.09	99.3				27
37	16.63	17.33	16.68	3	16.88	16.87	98.1			-	39
38	16.47	17.19	16.95	3	16.87	16.98	98.7				31
39	16.29	17.10	16.32	3	16.57	16.48	95.8	B	=	=	48
40	16.70	17.39	16.68	3	16.92	17.06	99.2				28
41	17.17	17.77	17.19	3	17.38	17.46	101.5				10
42	17.55	17.71	18.29	3	17.85	17.95	104.3	T	*	*	1
43	17.32	17.45	17.46	3	17.41	17.22	100.1				22
44	17.27	17.09	16.94	3	17.10	16.98	98.7				30
45	17.16	17.39	17.47	3	17.34	17.23	100.2				21
46	16.89	16.97	16.43	3	16.76	16.59	96.4	B	=	=	47
47	17.54	17.23	17.11	3	17.29	17.14	99.6				24
48	17.73	17.69	17.25	3	17.56	17.53	101.9		+	+	5
49-C	17.52	17.24	17.68	3	17.48	17.51	101.8		+	+	7
Total	16.98	17.35	17.10	147	17.14	17.14					

E = extreme, انتهائي; M = General mean, ميانگين كل; C = Control, شاهد; B = Bottom, گروه پايين; T = Top, گروه بالا

(-) و (=): به ترتيب كمتر از ميانگين شاهدها و آزمايش در سطح احتمال ۱% و ۵% .

(-) and (=): Less than mean of controls and trial at 1% and 5% of probability levels, respectively.

(+) و (*): به ترتيب بيشتر از ميانگين شاهدها و آزمايش در سطح احتمال ۱% و ۵%.

(+) and (*): Greater than mean of controls and trial at 1% and 5% of probability levels, respectively.

[Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2026-11-12]

[DOR: 20.1001.1.15625540.1386.9.4.8.0]

بدون علامت معنی دار به محدوده حد واسط از نظر عیارقند تعلق دارند (مثل تیمارهای ۲ تا ۶).

آزمایش های مقایسه ارقام در چند محیط (Multiple environmental trial)

هدف به نژادگران چغندرقند تهیه ارقامی با عملکرد بالا و پایدار در شرایط آب و هوائی مختلف می باشد. وقتی که لاین ها و ارقام هیبرید در آزمایش های زراعی در چند منطقه و چند سال مورد ارزیابی قرار گیرند به آن آزمایش های چند محیطی (Multiple environmental trial) گویند (Cooper and Hammer, 1996). گاهی بعضی از آزمایش ها فقط در یک منطقه اجرا میشود. منابع محدود مالی، انسانی و محیطی موجب می شود تا به نژادگران آزمایش های خود را فقط در چند منطقه خاص انجام دهند. در شرایطی که تظاهر یک یا چند صفت در آن مکان امکان پذیر است، اجرای طرح در یک مکان موجب کاهش اشتباه آزمایشی می شود. ضمناً بعضی از مکان های آزمایشی می توانند یک محدوده محیطی را که عکس العمل بعضی از ژنوتیپ ها در آنها مناسب تر است، بپوشانند. اثر متقابل محیط در ژنوتیپ (G × E) در سیستم به نژادی چغندرقند نقش موثری دارد. ارقام هیبرید چغندر قند می توانند در شرایط اقلیمی مختلف سازگاری بسیار بالائی داشته باشند (ابراهیمیان و همکاران، ۱۳۷۹). در آزمایش های چند محیطی، فرض براین است که ارقام از نظر ژنتیکی ثابت می باشند یعنی ساختار ژنتیکی ارقام در تمام محیط ها یکنواخت است و تکرارهای هر آزمایش و بلوک های ناقص داخل هر تکرار تصادفی فرض می شوند. اثر سال و مکان ها نیز تصادفی در نظر گرفته می شود. در مدل اماری مخلوط اثر ارقام ثابت و اثر محیط از جمله تکرار، مکان وسال با فرض تصادفی بودن مورد تجزیه آماری قرارمی گیرند.

یک آزمایش با هشت رقم منوژرم چغندرقند در ۱۱ منطقه و به مدت سه سال در مناطق چغندر کاری داخل کشور توسط نگارندگان به اجرا در آمد (داده های منتشر نشده). دو صفت عیارقند و مقدار سدیم ریشه که هر دو از صفات مهم تعیین کننده کیفیت ریشه هستند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس مرکب با در نظر گرفتن حالات مختلف تصادفی و یا ثابت بودن رقم، سال و مکان در جدول شماره ۷ ارائه گردیده است

جدول ۷- تجزیه واریانس مرکب برای عیار قند (SC) و مقدار سدیم (Na) در هشت رقم چغندرقند در سه سال و ۱۱ مکان برای حالات ثابت و تصادفی عوامل موردی

Table 7. Combined analysis of variance for sugar content (SC) and sodium (Na) in eight sugar beet varieties in three years and eleven locations-using different statistical models

منابع تغییرات S. O. V.		درجه آزادی DF	RY-RL-RV		RY-RL-FV		RY-FL-RV		RY-FL-FV	
			SC	Na	SC	Na	SC	Na	SC	Na
Year (Y)	سال	2	2.15	1.42	2.25	1.42	31.63**	39.83**	56.01**	52.13**
Location (L)	مکان	10	5.03**	3.85**	5.07**	4.05**	5.03**	3.84**	5.07**	4.05**
Y × L		16	32.13**	25.88**	24.83**	36.81**	32.13**	25.98**	24.83**	36.81**
Rep. (Y × L)	تکرار	87	-	-	-	-	-	-	-	-
Variety (V)	رقم	7	0.81	1.03	0.81	1.03	0.71	6.27**	0.71	6.27**
V × Y		9	3.89**	0.74	3.90	0.74	0.07	0.55	0.07	0.55
V × L		20	0.77	4.7**	0.78	4.73**	0.014	3.51**	0.76	4.73**
V × Y × L		67	0.018	0.74	0.018	0.74	0.018	0.74	0.018	0.74
Error	خطا	460	-	-	-	-	-	-	-	-

** Significant at 0.01% of probability level ** معنی دار در سطح احتمال ۱%

RY، RL و RV اثر تصادفی سال، مکان و تیمار و FV و FL اثر ثابت مکان و تیمار در نظر گرفته شده است (سال = Y، مکان = L و رقم = V).

RY, RL and RV are random effects of year, location and varieties, respectively.

FY, FL and FV are fixed effects of year, location and varieties, respectively.

[Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2026-11-12]

[DOR: 20.1001.1.15625540.1386.9.4.8.0]

(حرف R به معنی تصادفی و F به معنی ثابت بودن است).به عنوان مثال در حالت ۲ (RY-RL-FV)، امید ریاضی اثرات متقابل رقم × سال × مکان عبارت است از:

$$\delta^2_e + r\,(v/v\text{-}1)\,\delta^2_{VYL}$$

همانطور که ملاحظه میشود برای عبارقند اثر مکان و مکان × سال در تمام حالات معنی دار است واثر سال با ثابت فرض نمودن اثر مکان در تمام حالات معنی دار گردید. اگرچه اثر سال در حالت RY-RL-FV (سال و مکان تصادفی و رقم ثابت) برای عبارقند معنی دار نشد. اثر ثابت مکان و یا رقم × مکان موجب معنی دار شدن F سال گردید. اثر رقم برای عبارقند در تمام حالات معنی دار نشد. اثر متقابل سال × رقم در حالاتی که تمام عوامل تصادفی بودند، معنی دار شد. رابطه با مقدار سدیم اثر سال، مکان و اثر متقابل سال × مکان حالتی مشابه با عبارقند داشت یعنی با ثابت فرض نمودن اثر مکان، اثر سال معنی دار گردید. در حالاتی که مکان عامل ثابت و یا رقم و مکان هردو ثابت در نظر گرفته شدند، واریانس برآورد شده رقم برای سدیم معنی دار گردید. در رابطه با مقدار سدیم اثر متقابل سال × رقم در هیچ یک از حالات معنی دار نشد. اثر متقابل مکان × رقم نیز درهمه حالات برای مقدار سدیم معنی دار گردید. بنابراین ثابت و یا تصادفی بودن عوامل تغییرات می تواند در برآورد واریانس حقیقی و در نتیجه معنی دار شدن F تأثیر داشته باشد. در نتیجه چنانچه شرایط آزمایش با مدل آماری تطابق نداشته باشد و به عبارت دیگر ماهیت عوامل تغییر از نظر ثابت و یا تصادفی بودن به درستی تعیین نگردد، ممکن است برآورد دقیق و درستی از عوامل تغییر بعمل نیاید.

از آنجایی که ارقام جدید چغندرقند توسط شرکت های خصوصی تهیه می شود و رقابت تنگاتنگ بین ارقام اصلاح شده جدید وجود دارد، عدم دقت در تهیه مزرعه آزمایشی، عدم استفاده از یک مدل آماری صحیح و یا تجزیه اماری نادرست ممکن است موجب اشتباهاتی در برآورد واریانس منابع تغییر یا اشتباه ازمایشی گردد و در نتیجه به نژادگر در انتخاب هیبریدها، لاین ها و یا ارقام بسیار برتر دچار اشتباه خواهد شد. انتخاب نادرست به نژادگر موجب خسارات زیادی به تولید کنندگان در سطح وسیع می گردد و در نتیجه درامد چغندرکاران و کارخانه های قند با کاهش کیفیت محصول و تولید شکر کمتر، کاهش می یابد.

رقابت در آزمایش های مقایسه ارقام

به دلیل محدودیت های تکنیکی و متدولوژی آزمایش های مقایسه ارقام، اندازه کرت های اولیه در ازمایش های مزرعه ای به تدریج کوچکتر شدند و این کاهش سطح کرت توجه متخصصین آمار را به خود جلب نمود. آنها پی بردند که اثر حاشیه درحالتی که بین زمین های ازمایشی از نظر نور و حاصلخیزی خاک اختلاف دارد، از ژنوتیپی به ژنوتیپ دیگر متفاوت است. اگر اثر حاشیه در آزمایش های مقایسه ارقام موجود باشد، برآورد کلاسیک عملکرد ژنوتیپ ها دارای اریب خواهد بود وعکس العمل واقعی تیمارها از نظرعملکرد مشخص نمی شود. از این نظر اثر حاشیه ای در گیاهانی مانند چغندرقند مورد توجه قرار گرفته است (Buchse, 2002). در یک بررسی که توسط اسکریو (Escriou, 2002) انجام شد این اهداف مورد توجه قرار گرفت: ۱) آیا در آزمایش های مقایسه ارقام چغندرقند که کرت های آن عمدتاً سه ردیفه می باشند، اثر رقابتی کرت ها نتایج تجزیه واریانس را تحت تاثیر قرار می دهد؟ ۲) آیا با روش های آماری مناسب میتوان محدودیت های آزمایشی را کاهش داد؟ نتایج نشان داد که اثر رقابتی بین کرت ها نتایج ازمایش را تحت تاثیر قرار می دهد. اثر رقابتی جدا از اثر سایر عوامل نیست. بنابراین، در مدل آماری، اثر پارامترهای مختلف باید به دقت بررسی و در صورت نیاز تصحیح شود. زمانیکه یک مدل آماری با مدل آماری دیگر مقایسه میشود اگر تصحیحات موجب نااریبی شاخص ها بشود، دقت شاخص ها در حد قابل توجهی افزایش می یابد. اثر حاشیه توسط مدل های مختلف قابل بررسی است.

[Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2026-11-12]

[DOR: 20.1001.1.15625540.1386.9.4.8.0]

بهرحال در شرایط عادی اثر حاشیه در ازمایش های چغندرقند حداقل مي باشد ولي در مواردی که ازمایش در شرایط تنش انجام گیرد اثر حاشیه را باید به نحو مطلوب تصحیح نمود.

منابع مورد استفاده References

ابراهیمیان، ح.، ع.م. رضائي، و س.ی. صادقیان. ١٣٧٩. همبستگي بین پارامترهای پایداری در چغندرقند. مجله چغندر قند جلد ١٦ شماره : ٣١-٣٤.

ابراهیمي کولائي، ح. ١٣٧٤. بررسي اثر بوته های گمشده در آزمایشات چغندرقند. پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

عبداللهیان نوقابي، م. ١٣٨٧. تعیین برخي خصوصیات فیزیکي و تکنولوژیکي ارقام تجارتي چغندر قند. گزارش نهایي طرح تحقیقاتي. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند. ٥٩ صفحه.

گوهری، ج.، ح. فضلي، ق. توحیدلو، د. فتح الله طالقاني، ر. شیخ الاسلامي، ا. رجبي، م. مصباح، ف. حمدی و ع. کاشاني. ١٣٨١. مناسب ترین تعداد ریشه جهت اندازه گیری عیارقند چغندرقند. مجله چغندرقند جلد ١٨ شماره ١: ٦٧-٨١.

Buchse, A. 2002. Effect of inter-plot interference on yield performance in sugar beet variety trials. Sugar beet variety trials. Advances in Sugar Beet Research, IIRB. 4: 73-86.

Buchse, A. and U. Vurat. 2002. Reduction of experimental error in sugar beet field trials by seedbed preparation at right angles to subsequent seeding. Sugar beet variety trials. Advances in Sugar Beet Research, IIRB. 4: 95-108.

Cooper, M. and G. L. Hammer. (Eds.). 1996. Plant adaptation and crops improvement. CAB Internatinal, Wallingford, UK. 363 PP.

Dyke, G. 1997. How to avoid bad statistics. Field Crops Research. 51: 165-187.

Escriou, H. 2002. Study the inter-plot competition in sugar beet experiments at the ITB. Variety trials in sugar beet – methodology and design. Advances in Sugar Beet Research. 4:13-18.

Kristensen, K. and J. Hill. 2002. Multi-environment variety trials. Analysis and prediction. Variety trials in sugar beet – methodology and design. Advances in Sugar Beet Research. 4: 19-54.

Patterson, H. D. and R. Thomson. 1971. Recovery of inter block information when block size are unequal. Biometrika. 58: 545-554.

Pidgeon, J. D., A. R. Werker, K. W. Jaggard, D. H. Lister and P. D. Jones. 2000. Past, present and future comparative advantage in Europe for sugar beet crop production. Proceedings of 63th IIRB Congress, Feb. 2000: 45-54.

Steensen, J. K. and E. Augustinussen. 2002. Effect of rubber flail topping and scalping versus non-scalping on yield, internal quality, and storage loss in sugar beet. Variety trials in sugar beet - methodology and design. Advances in Sugar Beet Research, IIRB. 4: 125-137.

Yndgaard, F. 1980. Improvement of information level by using lattice design for designs with several entries.

[Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2026-11-12]

[DOR: 20.1001.1.15625540.1386.9.4.8.0]

In: A. Hoskuldsson, K. Conradsen, B.S. Jensen and K. Espersen (Eds.). Symposium on Applied Statistic in Denmark. NEUCC, RECAU Lyngby, Arhus, Kobengaven. 53-61.

Yndgaard, F. 2002. How to do sugar beet variety trials, single and multiple environment trials. Variety trials in sugar beet – methodology and design. Advances in Sugar Beet Research. 4: 3-12.

Yndgaard, F., B. V. Pedersen and B. O. Jonsson. 2002a. Analysis sugar beet variety trials using mixed mode equations I. Lattice and randomized complete block designs. J. Swed. Seed Assoc. 3: 90-100.

Yndgaard, F., B. V. Pedersen and B. O. Jonsson. 2002b. Analysis of sugar beet variety trials using mixed model equations II. Weighted multiple environment trial analyses. J. Swed. Seed Assoc. 3: 101-110.

Wauters, A. 2002. Trial techniques: Influence on experimental error. Variety trials in sugar beet – methodology and design. Advances in Sugar Beet Research. IIRB. 4: 87-94.

Wevers, J. D. A. 2002. Variety testing in some IIRB member countries. Advances in Sugar Beet Research, IIRB. 4: 139-156.

Wevers, J. D. A. 2003. Sugar beet variety testing in Europe. 1st Joint IIRB- ASSBT Congress, 26th Feb – 1st March. San Antonio, USA.

[Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2026-11-12]

[DOR: 20.1001.1.15625540.1386.9.4.8.0]

Some remarks on variety trials in sugar beet

Sadeghian-Motahar, S. Y[1]., M. Abdollahian-Noghabi[2] and H. Ebrahimian[3]

ABSTRACT

Sadeghian-Motahar, S. Y., M. Abdollahian-Noghabi and H. Ebrahimian. 2007. Some remarks on variety trials in sugar beet. **Iranian Journal of Crop Sciences. 9 (4): 401-414.**

Accuracy of sugar beet trials, particularly variety comparisons, depends on several factors including; statistical design, treatments oriented, experimental techniques, and replication numbers in order to estimate various components of a statistical model precisely. Testing agronomic treatments or evaluating new varieties for plant protection (PVP) or value for cultivation and use (VCU) under both field and glass-house conditions needs a reliable statistical design. There are many factors and circumstances like response of genotype, location, year, agronomic techniques etc. that affect performance of a sugar beet trial. Some of these factors are usually unknown before conducting the experiment that may influence the precision and accuracy of a field experiment. In addition to these, uncontrolled variations are usually summed in the experimental error. Type and quantity of the "variance of error" may be originated from different sources in which mainly are the precision of measurements and techniques as well as choice of the experimental design. The experimental design is also function of a number of other factors. When using RCBD, plots should be oriented in such a way to minimize soil variation, nutrient and pesticide residuauls within a block. In practice, treatments should be applied in parallel to the directions of blocks of a trial to minimize variance of error. A well-prepared field trial is effective in reducing the experimental error; however, a good and homogenous field emergence depends on the quality of seedbed preparation. Size of plot and plant number within a plot is essentially important. Homogeneity of a plot depends on its size; too big plots increase the error and too small plots would leads to lack of precision. An optimum plot size and average number of plants at harvest time needs to be sufficient to stabilize the error at a low level. If a trial carried out at different locations for several years, effects of these factors must be considerd precisely. Random or fixed effects of entries are very important for the estimation of variances. In sugar beet variety trials, it is common to apply either RCBD or lattice designs, each of them has advantages and limitations. In order to reduce variance of error and consequently increasing experimental accuracy of variety comparison, complete block or incomplete blocks (lattice design) should be arranged on a homogenized soil. Since there are close competitions among commercial sugar beet varieties, an appropriate statistical model based on the type of variation sources is essential to select superior varieties within a trial and increases the efficiency of selection for superior lines and varieties in plant breeding programs.

Key words: Sugar beet, Experimental design, Variety trial, Experimental plots, Sampling.

Receive: January 2007.

1- Prof., Seed and Plant Registration and Certification Research Institute, Karaj, Iran.
2- Assistant Prof., Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran.
3- Faculty member, Isfahan Agriculture and Natural Resources Research Center, Isfahan, Iran

[Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2026-11-12]

[DOR: 20.1001.1.15625540.1386.9.4.8.0]