

## بررسی برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ‌های گندم تحت شرایط کم آبیاری

### Study of some morphological and physiological characteristics affecting grain yield and yield components in bread wheat genotypes under reduced irrigation

طهماسب حسین‌پور<sup>۱</sup>، سید عطاء الله سیادت<sup>۲</sup>، رضا مامقانی<sup>۳</sup>، مسعود رفیعی<sup>۴</sup>

#### چکیده

جهت تعیین مهم ترین خصوصیات مرفوفیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد گندم، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۷۸-۷۹ در کوهدهشت با ده ژنوتیپ گندم بهاره دیم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجراه گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ‌های گندم از نظر عملکرد گاه، عملکرد گیاه، عملکرد بیولوژیکی، وزن سنبله و وزن هزار دارای اختلاف معنی دار اما از نظر تعداد سنبله در متر مربع اختلاف معنی دار نداشتند. همچنین ژنوتیپ‌ها در ارتباط با درجه-روز رشد دریافتی جهت تکمیل مراحل فنولوژیکی مختلف با هم اختلاف معنی دار نداشتند. در بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی ژنوتیپ زاگرس با حدود ۵۶۰ گرم در متر مربع، بیشترین ماده خشک تولیدی را داشت و ژنوتیپ شماره ۲ (Pik/Opata CM) با تولید نهایی ۳۶۰ گرم ماده خشک در متر مربع، کمترین تولید را داشت. حداکثر شاخص سطح برگ (LAI) در مرحله گرده افشاری (۳/۲۶) مربوط به ژنوتیپ ۱ Kasyan/Genaro81 بود که بالاترین عملکرد گاه (۱۵۸۳ کیلو گرم در هکتار) را به خود اختصاص داد و حداقل شاخص سطح برگ در مرحله گرده افشاری (۲/۴) را ژنوتیپ‌های Maya74"s", Seri82/Vee"s" داشتند. این ژنوتیپ‌ها دارای عملکرد گاه کمتری هم بودند. (به ترتیب ۱۳۲۸ و ۱۰۷۲ کیلو گرم در هکتار). روند سرعت رشد محصول (CGR) ژنوتیپ‌ها در ابتدا کند و پس از دریافت ۵۰۰ درجه-روز رشد افزایش یافته و حداکثر سرعت رشد محصول ژنوتیپ‌ها با دریافت تقریباً ۸۰۰-۹۰۰ درجه-روز رشد مصادف با مرحله گرده افشاری حاصل گردید. بیشترین سرعت رشد محصول در مرحله گرده افشاری مربوط به ژنوتیپ‌های ۱- Devin و ۷- Descenocido بود (حدود ۱/۲ گرم بر متر مربع بر ۵ درجه-روز رشد) و کمترین سرعت رشد محصول در مرحله گرده افشاری مربوط به ژنوتیپ‌های Kvjz/Bjy"s", Maya 74"s" بود (حدود ۰/۸ گرم بر متر مربع بر ۵ درجه-روز رشد) بود. رابطه خطی مثبت ( $r=0.89$ ) میان حداکثر سرعت رشد محصول و عملکرد گاه در بین ژنوتیپ‌ها مشاهده گردید. نتایج آزمایش نشان داد ژنوتیپ‌های شماره ۲، ۴ و ۱۰ از نظر برخی از صفات فیزیولوژیکی و آگرونومیکی نسبت به دیگر ژنوتیپ‌ها برتری داشتند.

واژه‌های کلیدی: گندم دیم، شاخص‌های مرفوفیزیولوژیک، ماده خشک کل، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، فنولوژیک، درجه-روز رشد.

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد و اجزای آن از اهمیت زیادی برخوردار است. غالباً محققان بیشتر از

#### مقدمه

#### شاخت و بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک رشد در

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۲/۵/۹

تاریخ دریافت: ۱۳۸۱/۳/۲۹

۱ و ۴ به ترتیب محقق و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان.

۲ و ۳-دانشیاران دانشگاه شهید چمران اهواز

مهم مورد استفاده در تجزیه و تحلیل رشد گیاه هستند، مطالعه گردد. متوسط سرعت رشد محصول برای گیاهان  $C_3$  و  $C_4$  به ترتیب معادل ۲۰ و ۳۰ گرم در متر مربع در روز گزارش شده است (گاردنر و همکاران، ۱۳۷۳). واردلا و پورتر (Wardlaw and Porter, 1967) گزارش نمودند، به طور کلی کاهش ماده خشک در انتهای فصل در نتیجه منفی شدن شاخص های رشد به علت سایه اندازی وجود برگ های پیر در میان اجتماع گیاهی و همچنین فتوسترات خالص منفی در نتیجه استفاده جامعه گیاهی از فتوسترات جاری برای تنفس می باشد.

سرعت رشد محصول، افزایش وزن خشک یک جامعه گیاهی در واحد سطح مزرعه در واحد زمان است و به طور وسیعی در تجزیه و تحلیل رشد محصولات به کار برده می شود. کریمی و سدیک (Karimi and Siddique, 1991) با استفاده از GDD شاخص های رشد ژنتیک های قدیمی و مدرن گندم های استرالیایی را با هم مقایسه نمودند و اختلاف در عملکرد دانه بین ژنتیک ها، گندم را به اختلاف در زمان گرده افشاری نسبت دادند. بر اساس در CGR Khalifa (1998)، تحقیقات انجام شده توسط خلیفه (Khalifa, 1998)، توارث پذیری صفات زودرسی مانند تعداد روز تا ظهور سنبله، گرده افشاری و رسیدن دانه در ارقام زودرس تحت تأثیر ژن های افزایشی و غیر افزایشی می باشد ولی نقش ژن های افزایشی در سیستم ژنتیکی این صفات بسیار مهم می باشد و پیشنهاد نمود که انتخاب در طی نسل های در حال تفکیک باید بر اساس بهره گیری از این صفات باشد. کریمی و نکویی (1۳۷۲)، اظهار داشتند با توجه به همبستگی قوی بین عملکرد دانه ژنتیک های گندم و میانگین سرعت رشد محصول، می توان نتیجه گیری نمود که میانگین سرعت رشد محصول به تهایی ۹۹ درصد از تغییرات عملکرد در دانه را توضیح می دهد.

سرعت رشد نسبی بیان کننده وزن خشک اضافه شده نسبت به وزن اولیه در یک فاصله زمانی معین است، میانگین سرعت رشد نسبی با توجه به اندازه گیری

نتیجه نهایی یعنی عملکرد نهایی به اطلاعاتی در زمینه، میزان تولید ماده خشک نیاز دارند، زیرا حوادث طول مدت رشد و نمو ممکن است تأثیر مشخصی روی نتیجه نهایی داشته باشد (گاردنر و همکاران، ۱۳۷۳). استفاده از شاخص تعداد روز تا هر یک از مراحل اصلی رشد برای مقایسه گیاهان مختلف در مجله های متفاوت به علت شرایط محیطی گوناگون چندان مفید نمی باشد (Gilmore and Rogers, 1958). به منظور رفع این نقص و دستیابی به شاخص های ثابت و پایدار برای تخمین رشد گیاه و تعیین زمان وقوع مراحل فیزیولوژیکی امروزه استفاده از شاخص های تجمع حرارتی مانند درجه - روز رشد (Growth Degree Day) به جای تقویم زمانی متداول شده است. این شاخص ها خصوصاً برای مقایسه ژنتیک ها با الگوهای مختلف رشد و نمو بسیار معتبرتر می باشند.

رادمهر (۱۳۷۶) به نقل از راووسون (Rawson, 1987) گزارش نمود. واریته های گندم قرمز زودرس بهاره به ۱۴۷۵ تا ۱۵۰۰ درجه - روز و واریته های دیررس به ۱۸۰ درجه روز برای تکمیل چرخه زندگی (از کاشت تا رسیدن) نیاز دارند. به طور کلی در آمریکای شمالی گندم بهاره به ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ و گندم پاییزه به ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ درجه - روز بر حسب واریته و تاریخ کاشت نیاز دارند.

مهم ترین شاخص هایی که در مطالعه فیزیولوژی رشد گیاهان کاربرد فراوان دارند سرعت رشد محصول (Crop Growth Rate)، میزان رشد نسبی (Relative Growth Rate)، شاخص سطح برگ (Leaf Area Index)، نسبت سطح برگ (Leaf Area Ratio)، سرعت جذب خالص (Leaf Area Duration) و دوام سطح برگ (Net Assimilation Rate) (Leaf Area Duration) می باشند (کریمی، ۱۳۷۳). واتسون (Watson, 1952)، اظهار داشت، تولید و تجمع ماده خشک می تواند توسط دو شاخص مهم سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی که از شاخص های

برای انتخاب در جهت بهبود عملکرد این گیاهان در برنامه های به نزدیک در شرایط دیم بوده است.

## مواد و روش ها

این بررسی با استفاده از ده ژنوتیپ پیشرفته گندم بهاره دیم در سال زراعی ۱۳۷۸-۷۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم کوهدهشت با عرض جغرافیایی  $36^{\circ}33'$  و طول جغرافیایی  $40^{\circ}47'$  و با ارتفاع ۱۲۰۰ متر از سطح دریا در شرایط دیم اجرا گردید.

آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و هر ژنوتیپ در شش خط شش متري با فاصله خطوط  $20\text{ سانتيمتر}$  در سطح  $7/2\text{ متر مربع}$  به وسیله بذر کار آزمایشی کشت گردید و در سطح  $4/8\text{ متر مربع}$  (شش خط چهار متري) برداشت گردید. اولین بارندگی مؤثر بعد از کاشت در تاریخ دهم آذرماه ۱۳۷۸ نازل گردید. متوسط بارندگی دراز مدت سالانه در منطقه یاد شده قریب  $450\text{ میلیمتر}$  است، ولی در طول فصل زراعی  $1378-79$  کل بارندگی  $263/2\text{ میلیمتر}$  بود که از این مقدار  $63\text{ میلیمتر}$  قبل از کاشت و مابقی ( $200/2\text{ میلیمتر}$ ) بعد از کاشت آزمایش نازل گردید (جدول ۱).

میانگین حداکثر و حداقل دمای سالیانه به ترتیب برابر  $21$  و  $21/29$  درجه سانتیگراد بود. با توجه به میزان و پراکنش نامناسب بارندگی در سال اجرای آزمایش، این سال یکی از سال های خشک محسوب می شود و به وجود آمدن چنین وضعیت اقلیمی طی سی سال گذشته در منطقه کم سابقه بوده است، به همین دلیل به خاطر حفظ ژرم پلاسم ها و ارزیابی ژنوتیپ ها در شرایط تنش، از آبیاری تکمیلی در دو مرحله (سبله دهی و دانه بندی) به میزان تقریبی  $50\text{ میلیمتر}$  در مجموع دو مرحله استفاده گردید.

خاک مزرعه دارای بافت لوم با  $\text{pH}=7/7$  بود و کود شیمیایی مصرفی بر اساس تجزیه خاک و تعیین حد بحرانی عناصر موجود در خاک شامل  $46\text{ کیلوگرم}$

انجام شده در دو زمان متوالی نمونه برداری محاسبه می شود و در طول فصل زراعی معمولاً سیر نزولی دارد (گاردنر و همکاران، ۱۳۷۳، Coelho and Date, 1980). دیویدسون و کمپبل (Davidson and Campbell, 1984)، گزارش نمودند میزان RGR در گندم در اوایل فصل رشد بالا می باشد و با گذشت زمان کاهش می یابد به طوری که در مرحله خمیری شدن بذر مقدار آن منفی می گردد. آن ها هم چنین اظهار داشتند مقدار سرعت رشد محصول (CGR) با گذشت زمان تقریباً تا نزدیک مرحله گرده افزایش یافته و پس از آن به سرعت کاهش یافته و سپس به صفر رسیده و نهایتاً در مرحله خمیری بودن دانه ممکن است منفی گردد. سیادت و همکاران NAR (۱۳۷۷)، گزارش نمودند بین عملکرد دانه و مقدار کلروفیل برگ ارقام تربیتیکاله همبستگی وجود ندارد.

تش خشکی در مقایسه با سایر تش ها ناگهانی اتفاق می افتد ولی گسترش آن تدریجی است، به طوری که در انتهای دوره بروز خشکی شدت می یابد، برگ های رشد یافته در شرایط کمبود آب معمولاً کوچکتر بوده و سطح ویژه برگ (SLA) کاهش پیدا می نماید (Dale and Daiels, 1995). تش بر شاخص سطح برگ و سرعت رشد آن نیز اثر داشته به طوری که باعث کاهش  $25\%$  درصد شاخص سطح برگ در ذرت و  $20\%$  درصد در سورگوم شده است (Sayer, 1994). کریمی و سدیک (Karimi and Siddique, 1991) اظهار داشتند، شاخص سطح سبز (Green Area Index) نیز از شاخص های تعیین کننده رشد می باشد، وجود همبستگی قوی بین شاخص سطح سبز در مرحله گرده افزایی با عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم، گویای اهمیت این شاخص در بررسی های فیزیولوژیک رشد می باشد.

هدف از اجرای این تحقیق تعیین مهم ترین ویژگی های مرغولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد ژنوتیپ های گندم به منظور دستیابی به معیار هایی

### جدول ۱- آمار هواشناسی فصل زراعی ۱۳۷۸-۷۹ کوهدشت

Table 1. Crop growing season meteorological details for Kohdasht in 1999-2000

Month	ماه های سال	بارندگی Rainfall(mm)	درجه حرارت مطلق		متوسط درجه حرارت Mean temp. (C°)
			Abs.temp. (C°) Max	Abs.temp. (C°) Min	
Sept. 23-Oct. 22.	مهر	0.2	34.2	4	20
Oct. 23-Nov. 21.	آبان	63.3	26.6	-1.8	12.5
Nov. 22-Dec. 21	آذر	68	20.4	-5.8	8
Dec. 22-Jan. 20	دی	50.4	20.6	-6.4	5.5
Jan. 21-Feb. 19	بهمن	53.2	16.2	-6.8	4.1
Feb. 20-Mar. 20	اسفند	0.8	20.2	-6.8	6.5
Mar. 21-Apr. 20	فروردین	19.5	28.4	-1	13.5
Apr. 21-May 21	اردیبهشت	8	32.2	1.2	16.5
May 22-Jun. 21	خرداد	0	38.2	8.4	24
Jun. 22-Jul. 22	تیر	0	-	-	-
Jul. 23-Aug. 22	مرداد	0	-	-	-
Aug. 23-Sept. 22	شهریور	0	-	-	-
متوسط درجه دما و مقدار کل بارندگی		263.2	26	-2	12
Mean temp. and total rainfall					

۱۴ روزه از ۰/۵ متر طولی خط دوم با رعایت حاشیه نمونه گیری به عمل آمد و پس از انتقال به آزمایشگاه نسبت به جدا کردن برگ از بقیه اندام های گیاه اقدام گردید. سطح برگ های گیاهان برداشت شده با اندازه گیری طول و بزرگ ترین عرض برگ ها انجام گرفت و سپس از رابطه زیر مساحت برگ ها محاسبه گردید (Gomez, 1972):

مساحت برگ = طول برگ  $\times$  بزرگ ترین عرض برگ  $\times$  ۰/۷۵.  
پس از تعیین مساحت برگ ها، شاخص سطح برگ (LAI) از طریق جمع سطح برگ ها در واحد سطح زمین برای هر ژنوتیپ محاسبه گردید و سپس برگ ها و اندام های هوایی به طور جداگانه به مدت ۴۸ ساعت در آون با دمای ۷۰ درجه سانتیگراد خشک گردید. سپس با توزیز آنها با ترازوی حساس، وزن خشک برگ (LDM) و وزن خشک کل گیاه (TDM) در هر مرحله در واحد سطح تعیین گردید.

محاسبه شاخص های رشد از طریق انتخاب بهترین معادله ای که روند تغییرات وزن خشک کل به وزن خشک برگ و شاخص سطح برگ را نسبت به شاخص حرارتی درجه-روز رشد نشان دهد انجام گرفت و پس از محاسبه ضرایب رگرسیونی و برآش آنها مشخص

نیتروژن خالص از منبع اوره و ۲۳ کیلوگرم فسفر خالص به صورت فسفات تریپل و ۲۵ کیلوگرم پتاس به صورت کلرور پتاسیم در هکتار بود که تمامی کود فسفاته و پتاسه قبل از کاشت و نصف کوده اوره همزمان با کاشت و مابقی به صورت سرک در زمان بارندگی در مرحله پنجه زنی استفاده گردید. در مرحله پنجه زنی جهت مبارزه با علف های هرز پهن برگ و باریک برگ از علفکش های تری نبورون متیل و فونوکسابرپوپ اتیل استفاده و علاوه بر آن و جین دستی نیز انجام گرفت. در طول دوره رویش و پس از برداشت صفاتی نظیر تعداد روز تا سبله دهی، رسیدن دانه، مساحت برگ پرچم، طول پدانکل، ارتفاع بوته، تعداد سبله در متر مربع، تعداد دانه در سبله، وزن هکتولیتر، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، عملکرد کاه و شاخص برداشت یادداشت برداری و محاسبه گردید.

تجزیه واریانس صفات مورد بررسی به کمک نرم افزار کامپیوتری C-MSTAT و مقایسه میانگین صفات با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام گرفت.

جهت تعیین شاخص های رشد مؤثر بر عملکرد طی نه مرحله از اندام های هوایی ژنوتیپ ها در فواصل زمانی

سطح برگ با استفاده از روش رگرسیون بین وزن خشک اندازه گیری شده و شاخص سطح برگ در هر مرحله پس از محاسبه ضرایب رگرسیونی طبق فرمول های ۱-۳ تعیین گردید.

با مشتق گرفتن از معادلات لگاریتمی فرمول های ۱-۳، میزان رشد نسبی وزن خشک کل (RGR-TDM)، وزن خشک برگ (RGR-LDM) و شاخص سطح برگ (RGR-LAI) به صورت گرم بر گرم برابر ۱۰ درجه - روز رشد به صورت زیر محاسبه گردید:

$$RGR\ TDM = d \left( \ln TDM / dt \right) = b + 2ct$$

$$RGR\ LDM = d \left( \ln LDM / dt \right) = b' + 2ct$$

$$RGR\ LAI = d \left( \ln LAI / dt \right) = b'' / 2\sqrt{t} + c'' + 2d't$$

سرعت رشد محصول (CGR) نیز از حاصل ضرب مقدار ماده خشک در سرعت رشد نسبی (CGR = TDM.RGR)، سرعت جذب خالص از رابطه NAR = CGR/LAI و وزن ویژه برگ از رابطه LWR=LW/TDM محاسبه گردید.

## نتایج و بحث

عملکرد دانه و اجزای آن، عملکرد بیولوژیک، عملکرد گاه و شاخص برداشت

نتایج این بررسی نشان داد که بین ژنوتیپ ها از نظر عملکرد دانه تفاوت بسیار معنی دار وجود دارد، ۱۵۳۸ شماره ۳ (Kayson/Genaro 81) کیلو گرم در هکتار بالاترین عملکرد را داشت، گرچه از نظر آماری با ژنوتیپ های ۴، ۵ و ۱۰ تفاوت معنی دار نداشت، پایین ترین عملکرد ۱۰۷۲ کیلو گرم در هکتار) مربوط به ژنوتیپ شماره ۷ (Maya 74's /On//N60) بود (جدول ۲).

در بین اجزاء عملکرد دانه ژنوتیپ ها مورد بررسی از نظر صفات تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در متر مربع با یکدیگر تفاوت معنی دار نداشتند و فقط وزن هزار دانه ژنوتیپ ها دارای تفاوت معنی دار بود. حداقل وزن هزار

گردید که تغییرات وزن خشک گیاه و وزن خشک برگ از معادله درجه دوم و تغییرات شاخص سطح برگ از معادله درجه دوم رادیکالی پیروی می کنند. در این آزمایش جهت کاهش وابستگی واریانس به میانگین از لگاریتم طبیعی در هر کدام از این صفات استفاده به عمل آمد (Buttery, 1969; Hashemi – Dezfouli, 1990).

$$\ln TDM = a + bt + ct^2 \quad (1)$$

$$\ln LDM = a' + b't + c't^2 \quad (2)$$

$$\ln LAI = a'' + b'' \sqrt{t} + c''t + d''t^2 \quad (3)$$

که در روابط بالا ضرایب رگرسیونی، a، درجه روز رشد تجمعی پس از کاشت؛ TDM، ماده خشک کل LDM، وزن خشک برگ و LAI، شاخص سطح برگ می باشد. چون معیار حرارتی در مقایسه با زمان از نوسانات فصلی کمتری برخوردار است، در این مطالعه برای محاسبه شاخص رشد به جای زمان از معیار درجه روز- رشد (GDD) استفاده شد (Hashemi – Dezfouli, 1990 ; Gilmore, 1958, Karimi and Siddique, 1991).

درجه روز رشد در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه با استفاده از آمارهای هواشناسی کشاورزی منطقه و دمای پایه (Base temperature) و دمای حداقل و حداقل گیاه و با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید:

$$GDD = \Sigma n \left[ (T_{max} + T_{min}) / 2 \right] - Tb$$

که در این رابطه GDD، درجه روز رشد، n، تعداد روزهای رشد، Tmax، حداقل دمای شبانه روز، Tmin، حداقل دمای شبانه روز و Tb، دمای پایه می باشد. دمای پایه برای گندم از کاشت تا ظهور سنبله پنج درجه سانتیگراد و از ظهور سنبله تا رسیدگی فیزیولوژیکی نه درجه سانتیگراد منظور گردید (James Cook and Veseth, 1991).

محاسبات آماری و ترسیم روند شاخص های رشد با استفاده از نرم افزار Pro Quattro (نسخه پنجم) انجام گرفت.

معادلات برآورد ماده خشک تولیدی و شاخص

تحمل به گرمای آخر فصل و هم برای فرار از خشکی، صفت ارزشمندی است.

درجه - روز رشد دریافته ژنوتیپ‌ها از کاشت تا رسیدن فیزیولوژیکی بین ۱۱۴۰ تا ۱۱۹۰ درجه - روز رشد در نوسان بود و این یافته با نتایج ارائه شده توسط رادمهر (۱۳۷۶) در تناقض بود. چون معمولاً هر گونه تنفس باعث کوتاه شدن دوره رشد می‌گردد بنابراین دلیل تناقض، علاوه بر انتخاب دمای پایه برای گندم می‌تواند تأخیر در شروع بارندگی‌های پائیزه، تأخیر در جوانه‌زنی و زود رسی اجباری در پایان فصل رشد (به دلیل ایجاد تنفس خشکی) باشد و این امر سبب گردیده تا طول دوره رشد ژنوتیپ‌ها عدم نتیجه‌گیری یکسان در آزمایش‌ها شود.

#### خصوصیات فیزیولوژیک:

##### الگوی تجمع ماده خشک

در اغلب گیاهان، رشد از الگوی خاصی تعیت می‌کند که نمودار آن سیگموئیدی است. در این بررسی روند تجمع ماده خشک کلیه ژنوتیپ‌ها نسبت به زمان بر حسب درجه - روز رشد به شکل معادله درجه دوم بود و این روند با الگوی ارائه شده توسط سایر محققین مطابقت داشت (گاردنر و همکاران، ۱۳۷۳).

مقایسه الگوی تجمع ماده خشک بین ژنوتیپ‌ها مختلف گندم نشان می‌دهد که اختلاف بین ژنوتیپ‌ها تا مرحله ساقه دهی اندک، اما پس از این مرحله، اختلاف‌ها قابل ملاحظه گردید. کاهش وزن خشک اندام‌های هوایی در اوخر فصل رشد به دلیل زرد شدن برگ‌ها و منفی شدن فتوستیتر خالص بوده است.

در بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی رقم زاگرس با تولید ماده خشک نهایی حدود ۵۵۸ گرم در متر مربع، بیشتر ماده خشک تولیدی را داشت و ژنوتیپ شماره ۲ (Pik/Opata CM) با تولید نهایی ۳۵۵ گرم ماده خشک در واحد سطح، کمترین تولید را داشت (جدول ۲). که ژنوتیپ‌های با تولید ماده خشک نهایی

دانه مربوط به ژنوتیپ شماره ۹ (Dovin-1)، برابر ۲۲ گرم و حداقل آن مربوط به ژنوتیپ شماره ۳ (Kayson/Genaro 81)، برابر ۳۱ گرم بود.

عملکرد بیولوژیک و عملکرد کاه نیز در بین ژنوتیپ‌ها معنی دار بود. رقم زاگرس، با داشتن ۵۵۷۸ کیلو گرم در هکتار و ژنوتیپ شماره ۲ (Pik/OpataCM)، با ۳۵۵۲ کیلو گرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیک را داشتند. بیشترین عملکرد کاه (۴۰۷۳ کیلو گرم در هکتار) و کمترین عملکرد کاه (۲۳۹۰ کیلو گرم در هکتار) نیز مربوط به همین دو ژنوتیپ بود. شاخص برداشت نیز در میان ژنوتیپ‌های مورد مطالعه مشابه بود.

بر اساس نتایج به دست آمده می‌توان اظهار داشت که عملکرد دانه، عملکرد کاه، عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه ژنوتیپ‌ها از مهم‌ترین صفاتی بودند که در میان ژنوتیپ‌ها تفاوت بسیار معنی دار داشتند.

#### مراحل فنولوژیکی

ژنوتیپ‌های گندم از لحاظ دوره رشد از کاشت تا رسیدن فیزیولوژیکی با هم اختلاف داشتند، این تفاوت در درجه - روز رشد دریافته جهت تکمیل چرخه زندگی ژنوتیپ‌های مورد بررسی منعکس می‌باشد (جدول ۳).

اگر چه معمولاً دوره رشد طولانی تر باعث افزایش عملکرد دانه می‌شود، اما در این آزمایش چون ژنوتیپ‌ها در شرایط آبیاری محدود ارزیابی گردیدند، بنابراین ژنوتیپ‌های زودرس تر دارای عملکرد دانه بیشتر بودند و این نتایج با گزارش‌های ارائه شده توسط محققین دیگر مطابقت داشت (Khalifa, 1998)، پس یکی از استراتژی‌های انتخاب گندم در شرایط آبیاری محدود باید انتخاب ژنوتیپ‌های زودرس با عملکرد مطلوب باشد. در غلات، زودرسی یکی از مکانیزم‌های مهم گریز از گرما و خشکی آخر فصل، به شمار می‌رود. این مکانیزم، تحت تأثیر بهاره شدن، طول روز و تابش خورشید قرار می‌گیرد. زودرسی، هم برای

## جدول ۲- مقایسه میانگین علماکرده ای ، اجرای آن و بعضی خصوصیات مرغ فیزیولوژیک زنوبیت های گندم

Table 2. Mean comparison for grain yield components and some morphophysiological characteristics of bread wheat genotypes

شماره رنگ Ent No.	نام ژنتیکی Genotypes	زنوبیت ها Grain/spike	تعداد سنبه در متراج Spike/m <sup>2</sup>	وزن هزار دنه Thousand kernel weight (g)	علماکرده Grain yield(kg/ha)	علماکرده Straw yield(kg/ha)	علماکرده Biological yield (kg/ha)	شاخص برداشت Harvest index(%)
1	Celtia CM	20 <sup>a</sup>	331 <sup>a</sup>	28 <sup>b</sup>	1411 <sup>ab</sup>	3291 <sup>b</sup>	4703 <sup>bc</sup>	30 <sup>a</sup>
2	Pik/Opatra CM	19 <sup>a</sup>	344 <sup>a</sup>	25 <sup>cd</sup>	1161 <sup>bc</sup>	2390 <sup>c</sup>	3552 <sup>d</sup>	33 <sup>a</sup>
3	Kasyan/Genaro81	20 <sup>a</sup>	425 <sup>a</sup>	31 <sup>a</sup>	1583 <sup>a</sup>	3218 <sup>b</sup>	4802 <sup>bc</sup>	33 <sup>a</sup>
4	Tr8010200	19 <sup>a</sup>	425 <sup>a</sup>	29 <sup>ab</sup>	1536 <sup>a</sup>	3593 <sup>ab</sup>	5130 <sup>a</sup>	31 <sup>a</sup>
5	Descenocido-7	15 <sup>a</sup>	406 <sup>a</sup>	24 <sup>de</sup>	1505 <sup>a</sup>	3416 <sup>ab</sup>	4921 <sup>ab</sup>	31 <sup>a</sup>
6	Kvz/Biy's	14 <sup>a</sup>	319 <sup>a</sup>	27 <sup>bc</sup>	1312 <sup>ab</sup>	2921 <sup>bc</sup>	4234 <sup>cd</sup>	31 <sup>a</sup>
7	Maya74's"On/N60	20 <sup>a</sup>	325 <sup>a</sup>	24 <sup>de</sup>	1072 <sup>c</sup>	3447 <sup>ab</sup>	4520 <sup>bc</sup>	28 <sup>a</sup>
8	Seri82/Vee's"/Snb's	16 <sup>a</sup>	381 <sup>a</sup>	27 <sup>bc</sup>	1328 <sup>ab</sup>	3359 <sup>ab</sup>	4687 <sup>bc</sup>	28 <sup>a</sup>
9	Dovin-1	16 <sup>a</sup>	381 <sup>a</sup>	22 <sup>e</sup>	1135 <sup>bc</sup>	3395 <sup>ab</sup>	4531 <sup>bc</sup>	26 <sup>a</sup>
10	Zagros	18 <sup>a</sup>	394 <sup>a</sup>	28 <sup>b</sup>	1505 <sup>a</sup>	4072 <sup>a</sup>	5578 <sup>a</sup>	327 <sup>a</sup>
C.V%		26.8	24.8	6.31	13.6	13.3	10.3	14.7

بررسی برخی خصوصیات مرغولوژیک و فیزیولوژیک  
در هر سیون میانگین شاخص که دارای حداقل پیک حرود مشترک باشد از نظر آماری در سطح ۵٪ تفاوت معنی داری شارعه (Duncan) چون داشته باشد، در میان ۱۰ ژنوبیت های گندم میانگین شاخص که دارای حداقل پیک حرود مشترک باشد از نظر آماری در سطح ۵٪ تفاوت معنی داری شارعه (Duncan) چون داشته باشد، در میان ۱۰ ژنوبیت های گندم

Means with similar letters in each column , are not significantly different at the 5% probability level according to Duncan's Multiple Range Test.

جدول ۳- مقایسه میانگین بعضی خصوصیات فنولوژیک و مرفولوژیک ۹ نویتبه های گندم

Table 3. Mean comparison for phenological and morphological characteristics of bread wheat genotypes

شماره ردیف Ent No.	نحوه پرورش Genotypes	مساحت برگ ابری Flag leaf area(cm <sup>2</sup> )	وزن مکاربر Test weight (kg/100 lit)	طول پالک Pedicel length (cm)	روزه رسیدن Growing degree day to heading (°C)	روزه رسیدن Growing degree day to maturity (°C)	ارتفاع برگه Plant height (cm)	دوره رشد Growing degree day (°C)
1	Celtia CM	9b	75bc	20ab	797bc	178d	65ab	1138e
2	Pik/Opatra CM	10ab	74de	21ab	820ab	181ab	68ab	1176 ab
3	Kasyan/Geharto81	10ab	76ab	19b	806ab	181ab	67ab	1173 ab
4	Tr8010200	9.b	75bc	21ab	782d	180bc	70ab	1165 bc
5	Desconocido-7	8b	77a	19ab <sub>4</sub>	784cd	178d	61bc	1157 cd
6	Kvz/Bjy's <sup>3</sup>	9b	74c	20ab	820ab	182a	65ab	1190 a
7	Maya74's/Om/N60	11ab	72f	23a	825a	181ab	72a	1179 ab
8	Seri82/Vee's/Snb's <sup>2</sup>	10ab	76b	18b	806ab	180bc	59c	1164 bc
9	Dovin-1	13a	76ab	21ab	806ab	181ab	69ab	1173 ab
10	Zagros	11ab	76ab	23a	789cd	179cd	70ab	1151 de
	C.V%	23 <sub>1</sub>	0.9 <sub>1</sub>	10.5 <sub>4</sub>	1.35 <sub>1</sub>	0.6 <sub>1</sub>	9.5 <sub>1</sub>	1.1 <sub>1</sub>

در مجموع میانگین هایی که در ایوان حداقویل یک جزو مشترک باشد از نظر آماری در سطح ۰/۵ اختلاف معنی دارند (از مبنی بند دامادی دلخواه).

Means with similar letters in each column , are not significantly different at the 5% probability level according to Duncan's Multiple Range Test.

و افزایش مقدار تنفس، رشد گیاه در اواخر فصل رشد منفی می شود.

از آن جا که معادلات سرعت رشد با استفاده از مشتق تغییرات وزن خشک نسبت به زمان تعیین می گردند و مشتق در نقطه حداکثر صفر می باشد، بنابراین سرعت های رشد در محدوده بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه - روز رشد، یعنی جائی که تجمع ماده خشک در ژنوتیپ های مختلف به حداکثر رسیده است، صفر و بعد از آن منفی شده است.

همان طور که در شکل ۲-۲ مشاهده می شود، با افزایش سن گیاه سرعت رشد نسبی ژنوتیپ ها به صورت خطی (با شیب های متفاوت) کاهش داشته اند. شیب خط منحنی سرعت رشد نسبی بیانگر سرعت تجمع ماده خشک در ژنوتیپ ها است زیرا عموماً بالا بودن این شاخص بیانگر سرعت استقرار بهتر ژنوتیپ در ابتدای فصل رشد می باشد، بنابراین ژنوتیپ شماره ۹ (Dovin-I) نسبت به بقیه ژنوتیپ ها از شیب تندتری برخوردار بوده و این امر می تواند نشانگر استقرار مطلوب تر این ژنوتیپ در ابتدای فصل رشد باشد. کمترین شیب خط مربوط به ژنوتیپ شماره ۷ (Maya 74"s"/On//N60) می باشد و همین امر نیز می تواند یکی از دلایل کاهش سرعت تجمع ماده خشک و استقرار کنتر آن نسبت به دیگر ژنوتیپ ها باشد.

#### سرعت رشد محصول

سرعت رشد محصول ژنوتیپ ها در ابتداء کند و پس از دریافت حدود ۵۰۰ درجه - روز رشد افزایش سریعی داشت و حداکثر CGR ژنوتیپ ها با دریافت تقریبی  $80^{\circ}\text{C}$ - $90^{\circ}\text{C}$  از کاشت تا گرده افشاری حاصل گردید (شکل ۲-۱)، که با درجه - روز رشد ژنوتیپ ها از کاشت تا سنبله دهی مطابقت داشت (جدول ۲).

الگوی سرعت رشد محصول ژنوتیپ های مسورد بررسی، مشابه نتایج گزارش ارائه شده توسط پژوهشگران دیگر بود (لیسچی و همکاران، ۱۳۷۳؛ Davidson and Campbell، 1984).

بیشتر، دارای عملکرد دانه بیشتر و ژنوتیپ های با تولید ماده خشک نهایی کمتر، دارای عملکرد دانه کمتر بودند.

#### شاخص سطح برگ

شاخص سطح برگ نشان دهنده سطح فتوسترن کننده و قابلیت گیاه در جذب انرژی تشعشعی و تبدیل آن به ماده خشک می باشد، در این بررسی حداکثر شاخص سطح برگ در مرحله گرده افشاری (Kayson/Genaro ۸۱/۲۶) مربوط به ژنوتیپ شماره ۳ (Kayson/Genaro ۸۱/۲۶) بود که بالاترین عملکرد دانه (۱۵۸۳ "کیلو گرم در هکتار) را نیز داشته است.

حداقل شاخص سطح برگ در مرحله گرده افشاری (۸/۲۴) را ژنوتیپ های شماره ۷ و ۸ (Maya 74"s"/On//N60، Seri82/Vee"s"/Snb"s") داشتند که این ژنوتیپ ها دارای عملکرد دانه کمتری هم بودند (شکل ۲-۱). همبستگی مثبت بین شاخص سطح برگ با عملکرد دانه قبل نیز گزارش شده است (Karimi and Siddique, 1991)

یکی از اثرات تنفس خشکی، کوچک شدن برگ ها می باشد و در این آزمایش نیز اثرات تنفس خشکی باعث گردید که شاخص سطح برگ برای کلیه ژنوتیپ ها پایین باشد. کوچک شدن برگ ها تحت تأثیر تنفس خشکی توسط دیل و دایلز (Dale and Daiels, 1995) نیز گزارش شده است.

#### سرعت رشد نسبی

میزان سرعت رشد نسبی ژنوتیپ ها در اوایل فصل رشد بالا و به تدریج همراه با رشد گیاه، به دلیل افزایش سایه اندازی برگ های بالایی بر روی برگ های پایینی و پیر شدن تدریجی برگ های اولیه کاهش پیدا نمود. نتایج مشابهی در تأیید این روند توسط دیویدسون و کمپل، (Davidson and Campbell, 1984؛ Coelho and Dale, 1980) گزارش شده است.

سرعت رشد نسبی با توجه با تغییرات فتوسترن و تنفس گیاه تغییر می یابد و به همین دلیل با گذشت زمان

دريافت ۱۰۵۰ و ۱۲۵۰ درجه-روز رشد به طور هم زمان صفر گردید. زمانی که سطح زمین توسط برگ‌ها پوشیده می‌شود، NAR ثابت و با رسیدن LAI به حداقل، NAR صفر و پس از آن با ریزش برگ‌ها NAR منفی شده است.

کاهش سرعت جذب خالص ژنوتیپ شماره ۴ کندتر بود و به نظر می‌رسد این ژنوتیپ توانسته است سطح فتوستنتزی خود را برای مدت بیشتری حفظ نماید و با وجود تنش خشکی ایجاد شده در پایان فصل رشد از نور به شکل مطلوب‌تری استفاده نموده و در بین ژنوتیپ‌ها عملکرد دانه بالاتری داشته است. قابل ذکر است که سرعت جذب خالص بالا نمی‌تواند دلیلی برای عملکرد بیشتر باشد، بلکه فقط معیاری از بازده فتوستنتز بالاتر است.

#### نسبت وزن برگ

این صفت شاخصی از میزان وزن برگ در قبال وزن خشک گیاه است که از یک میزان معین ماده خشک کل گیاه، سهم برگ‌ها را تعیین می‌نماید و این مؤلفه میزان پربرگی گیاه را نشان می‌دهد.

چون گیاه در ابتدای چرخه زندگی روی افزایش و گسترش برگ‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند، پس نسبت وزن برگ (LWR) در ابتدای زیاد و پس از آن با افزایش و گسترش اندام‌های دیگر مانند ساقه، سبله و این نسبت کاهش پیدا کرده است. نتایج نشان داد که در ژنوتیپ‌های مختلف چون در ابتدای فصل رشد وزن خشک کل گیاه با وزن خشک برگ برابر است بنابراین نسبت وزن برگ (LWR) معادل یک می‌باشد و از آن پس افزایش تجمع ماده موجب افزایش ماده خشک کل بر وزن خشک برگ‌ها و در نتیجه کاهش LWR گردید. ژنوتیپ شماره ۶ (Kvz/Bjy's) با تجمع کمتر TDM دارای LWR بیشتری (۰.۰۴) گرم بر گرم بر ده درجه-روز رشد در انتهای فصل رشد بود ولی ژنوتیپ شماره ۳ LWR (Kasyan/Genaro81) با تجمع TDM بیشتر از کمتری (۰.۰۱) گرم بر گرم بر ده درجه-روز رشد

(Karimi and Seddique, 1991).


با توجه به این که افزایش LAI تا حد بحرانی باعث دریافت نور بیشتر و در نتیجه فتوستنتز بیشتر می‌گردد، بنابراین CGR نیز افزایش می‌یابد. به همین دلیل برخی از ژنوتیپ‌ها با LAI و LDM بیشتر عموماً CGR بالاتری را به خود اختصاص داده‌اند، به عنوان مثال ژنوتیپ شماره ۹ با داشتن LAI بیشتر و وزن خشک برگ بیشتر، بالاترین CGR را در بین ژنوتیپ‌ها به خود اختصاص داده است (حدود ۱/۳ گرم بر متر مربع بر ده درجه روز رشد).

همبستگی مثبت و قوی بین CGR و عملکرد دانه توسط افراد دیگر گزارش شده است (کریمی و نکویی، ۱۳۷۲؛ Karimi and Seddique, 1991) مثبت ( $r=0.89$ ) میان حداقل سرعت رشد محصول و عملکرد دانه در بین ژنوتیپ‌ها مشاهده گردید.

#### سرعت جذب خالص


سرعت جذب خالص، حاصلضرب سرعت رشد محصول در شاخص سطح برگ می‌باشد و گویای این واقعیت است که در زمان رسیدن تجمع ماده خشک به حداقل که در آن سرعت رشد محصول صفر می‌گردد، سرعت جذب خالص نیز صفر و از آن پس منفی می‌شود. روند سرعت جذب خالص ژنوتیپ‌ها با دریافت تقریبی ۳۰۰ درجه - روز رشد تا مرحله دریافت ۱۰۰۰ درجه - روز رشد بر هم منطبق بود، اما پس از آن تفاوت‌ها بیشتر و ژنوتیپ شماره ۷ بیشترین کاهش را داشت که این امر می‌تواند به علت زرد شدن و ریزش سریع تر برگ‌ها باشد (شکل ۲-۶).

بیشترین سرعت جذب خالص برای ژنوتیپ‌ها شماره ۲، ۷ و ۸ در ابتدای فصل، زمانی که اکثر برگ‌ها در معرض نور مستقیم خورشید قرار داشتند، مشاهده گردید، اما این برتری به دلیل پایین بودن LAI در این زمان، از نظر تولید ماده خشک فاقد اهمیت می‌باشد. ملاحظه می‌گردد که سرعت رشد محصول و سرعت جذب خالص ژنوتیپ‌های شماره ۵ و ۶ به ترتیب پس از



شکل ۱- مقایسه تجزیه و تحلیل رشد: (a: تجمع ماده خشک کل ، b: ماده خشک برگ ، c: سرعت رشد محصول ، d: شاخص سطح برگ) ژنوتیپ های گندم.

Fig. 1. Comparison of growth analysis (a : TDM , b : LDM , c : CGR , d : LAI ) for bread wheat genotypes.



شکل ۲- مقایسه تجزیه و تحلیل رشد: (a: سرعت رشد نسبی ، b: سرعت جذب خالص ، c: نسبت وزن برگ، d: سطح ویژه برگ) ژنوتیپ های گندم.

Fig. 2. Comparison of growth analysis (a : RGR , b : NAR , c : LWR , d : SLA ) for bread wheat genotypes.

مخاالت داشت (گاردنر و همکاران، ۱۳۷۳) چون ژنوتیپ‌ها با سطح ویژه برگ بیشتر دارای عملکرد دانه بیشتری بودند. به نظر می‌رسد شرایط تنش خشکی ایجاد شده باعث گردید تا ژنوتیپ‌های مورد بررسی، پتانسیل عملکرد واقعی خود را نشان ندهند و این امر سبب گردیده تا در برخی موارد نتایج متناقضی مشاهده گردد. زیرا در شرایط تنش خشکی فاکتورهای دیگری مانند زودرسی، واکسی بودن برگ‌ها، طول ریشك و پدانکل نیز می‌توانند در افزایش عملکرد مؤثر باشند.

### نتیجه گیری

نتایج نهایی این آزمایش نشان داد که در بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی، ژنوتیپ‌های شماره ۳، ۴، و ۱۰ (Kayson/Genaro81، Tr8010200، Zagros) از نظر بسیاری از ویژگی‌های فیزیولوژیکی و آگرونومیکی مانند زودرسی، ارتفاع مناسب بوته، طول پدانکل، وزن هزار دانه بالا، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک مطلوب و تحمل بهتر به شرایط آبیاری محدود، نسبت به دیگر ژنوتیپ‌ها برتری داشته و افزایش کمی این مجموعه صفات به این ژنوتیپ‌ها اجازه داد تا با وجود شرایط تنش رطوبتی ایجاد شده با استفاده بهینه از عوامل محیطی، عملکرد قابل قبولی تولید نمایند.

### References

- رادمهر، م. ۱۳۷۶. تأثیر تنش گرمایی بر فیزیولوژی رشد و نمو گندم. دانشگاه فردوسی مشهد. ۲۰۱ صفحه.  
گاردنر، ف. پ. آر. بی پرس و ریال. میشل. ۱۳۷۳. فیزیولوژی گیاهان زراعی. ترجمه: سرمنیا، غ. و ع. کوچکی، دانشگاه مشهد ۴۶۸ صفحه.
- سیادت، ع.، ا. هاشمی دزفولی و ف. قوشچی. ۱۳۷۷. بررسی میزان عملکرد در مقایسه همبستگی برخی خصوصیات مرغولوژیک و فیزیولوژیک شش ژنوتیپ تریتیکاله در خوزستان، نهال و بذر جلد ۱۴، شماره ۲، صفحات ۲۰-۲۳.
- کریمی، م. و ح. نکویی. ۱۳۷۲: شاخص‌های فیزیولوژیکی و اجزاء مؤثر بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌ها گندم، خلاصه مقالات اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی کرج، صفحات ۷۹-۸۰.
- کریمی، م. ۱۳۷۳. آنالیز شاخص‌های رشد بر اساس واحد گرمایی، مقالات کلیدی اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، صفحات ۲۴۲-۲۳۵.

در انتهای فصل رشد برخوردار بود (شکل c-۲).  
سطح ویژه برگ

سطح ویژه برگ نشانگر ظرافت برگ است زیرا نسبت سطح برگ را به وزن برگ نشان می‌دهد، هر چه سطح ویژه برگ (SLA) بیشتر باشد، برگ‌ها نازک‌تر و بر عکس هر SLA کمتر باشد برگ‌ها ضخیم‌تر هستند. ژنوتیپ‌های با برگ‌های ضخیم‌تر برای شرایط تنش مناسب‌تر می‌باشند زیرا برگ‌های ضخیم دارای تعداد لایه‌های مزوپلی بیشتر، غلظت کلروپلاست در واحد سطح بیشتر، عبور نور کمتر و نتیجتاً دارای فتوسترن بیشتری خواهند بود (گاردنر و همکاران، ۱۳۷۳).

در این بررسی سطح ویژه برگ ژنوتیپ‌ها در ابتدای رشد اختلاف زیادی نداشتند ولی در مرحله گرده افسانی که مصادف با دریافت تقریبی ۹۰۰-۸۰۰ درجه - روز رشد بود، اختلاف سطح ویژه برگ‌ها بیشتر گردید (شکل d-۲). در بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی، ژنوتیپ‌های شماره ۳ و ۱۰ با داشتن سطح ویژه برگ بیش از ۰/۶ سانتیمتر مربع بر گرم برد درجه - روز رشد، بیشترین سطح ویژه برگ را داشتند و ژنوتیپ شماره ۸ با سطح ویژه برگ کمتر از ۰/۵ سانتیمتر مربع بر گرم برد درجه - روز رشد کمترین سطح ویژه برگ را داشت. نتایج به دست آمده با نتایج دیگران

### منابع مورد استفاده

- رادمهر، م. ۱۳۷۶. تأثیر تنش گرمایی بر فیزیولوژی رشد و نمو گندم. دانشگاه فردوسی مشهد. ۲۰۱ صفحه.  
گاردنر، ف. پ. آر. بی پرس و ریال. میشل. ۱۳۷۳. فیزیولوژی گیاهان زراعی. ترجمه: سرمنیا، غ. و ع. کوچکی، دانشگاه مشهد ۴۶۸ صفحه.
- سیادت، ع.، ا. هاشمی دزفولی و ف. قوشچی. ۱۳۷۷. بررسی میزان عملکرد در مقایسه همبستگی برخی خصوصیات مرغولوژیک و فیزیولوژیک شش ژنوتیپ تریتیکاله در خوزستان، نهال و بذر جلد ۱۴، شماره ۲، صفحات ۲۰-۲۳.
- کریمی، م. و ح. نکویی. ۱۳۷۲: شاخص‌های فیزیولوژیکی و اجزاء مؤثر بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌ها گندم، خلاصه مقالات اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی کرج، صفحات ۷۹-۸۰.
- کریمی، م. ۱۳۷۳. آنالیز شاخص‌های رشد بر اساس واحد گرمایی، مقالات کلیدی اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، صفحات ۲۴۲-۲۳۵.

لیاسچی، م. ع. رضایی و م. کریمی. ۱۳۷۳. بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد مؤثر بر عملکرد یولاف و ژنوتیپ‌ها جو. *فصلنامه پژوهش و سازندگی شماره ۲۴*، صفحات ۵۱-۴۶.

Buttery, B.R. 1969. Analysis of the growth of soybean as affected by plant population and fertilizer. *Can. J. Plant. Sci.* 46:675-684

Coelho, D. T. and R. F. Dale. 1980. An energy crop growth variable and temperature function for predicting corn growth and development, planting to silking. *Agron. J.* 72:503-510.

Dale, R. and A. Daiels. 1995. A weather – soil variable for estimating soil moisture stress and corn yield. *Agron. J.* 87:115 – 121.

Davidson, H. R. and C. A. Campbell. 1984. Growth rates, harvest index and moisture use of Manitou Spring wheat as influenced by nitrogen, temperature and moisture. *Can. J. Plant Sci.* 64:825 – 839.

Gilmore, E. C. J. and J. S. Rogers. 1958. Heat units as a method of measuring maturity in corn. *Agron. J.* 50:611 – 615.

Gomez, K. A. 1972. Techniques for field experiments with rice IRRI. Los Bonos Philippines. P. 18.

Hashemi – Dezfouli, A. 1990. Manipulation of crowding stress in corn. Ph. D. Dissertation Univ. of Mass. Amherst. P. 159.

James Cook, R. and R. J. Veseth. 1991. Wheat health management. American Physiological Society. U. S. A. 152 Pages.

Karimi, M. M. and H. M. Siddique. 1991. Crop growth and relative growth rates of old and modern wheat cultivars. *Aust. J. Agric. Res.* 42:13 – 20.

Khalifa, M.A.1998. Genetics of earliness in bread and durum wheat. pp.256-257, In: AE Stinkard (ed.) Proceedings of the 9<sup>th</sup> International Wheat Genetics Symposium, Volume 1. Saskatoon, Saskatchewan. Canada.

Sayer, W. 1994. Tillage effects on dryland wheat and sorghum production in the southern Great Plains. *Agron. J.* 86:310 – 317.

Wardlaw, I. F. and H. K. Porter. 1967. The distribution of stem sugar in wheat during grain development. *Aust. J. Biol. Sci.* 20:309 – 318.

Watson, D. J. 1952. The Physiological basis of variation in yield. *Adv. Agron.* 4:101 – 145.