

(*Triticum aestivum* L.)

(*Diuraphis noxia*)

Evaluation of some biochemical factors for resistance of seven bread wheat (*Triticum aestivum* L.) genotypes to Russian aphid (*Diuraphis noxia*)

محمد مجتبی کامل منش^۱ و محمد تقی آсад^۲

(r=0.87,p<0.01)

(r=0.73,p<0.05)

همواره ارقام مقاوم جدید ایجاد کند. از این نظر بهترادگران نیاز به روش های انتخاب سریع و مؤثر دارند (Todd et al., 1971). این آفت درون برگ های لوله شده میزان فعالیت نموده و به این طریق از تاس مستقیم سموم مصرفی در امان مانده و شاید به همین دلیل کنترل شیمیایی آن چندان مؤثر نمی باشد. با توجه به مطالب یاد شده استفاده از ارقام مقاوم، ضمن بی خطر بودنش برای محیط زیست و هزینه کمتر آن در درازمدت، روش موثرتری برای مقابله با حملات شدید

شته روسي گندم (*Diuraphis noxia*) بومي جنوب روسيه، ايران، افغانستان و کشورهای حاشيه مدiterانه است و اولين بار در آمریکاي شمالی شناسايي شد (Zwer et al., 1994). در اغلب نواحی گندم خيز دنيا شته روسي گندم جزء آفات عمده محسوب می شود و استراتژي مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. از طرفی امکان ایجاد بیوتیپ های جدید شته روسي گندم این ضرورت را ایجاد می کند که بهترادگران

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۲/۱/۲۱

تاریخ دریافت: ۱۳۸۱/۱/۲۰

- دانشیار دانشگاه شیراز

۱- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

ارقام مقاوم و حساس در سطح بالاتری قرار دارد (Van der Westhuizen and Pretorius, 1995). مقاومت ارقام گندم در برابر شته های غلات با مقدار پروتئین های محلول در ارتباط است، به طوری که ارقام مقاوم دارای ترکیبات مغذی، شامل پروتئین های محلول کمتری هستند (Niraz et al., 1985). در اثر تغذیه شته روسی تغییرات پروتئینی در گندم های مقاوم به وجود می آید. برای مثال، سه نوع پلی پپتید با اندازه های تقریبی ۳۲، ۳۳ و ۳۵ کیلو دالتون در ژنتوتیپ مقاوم به وجود آمد ولی شاهد حساس فاقد چنین تغییراتی بود. به طور کلی تشکیل پلی پپتیدهایی که در اثر حمله شته روسی ایجاد می شود، نقش مهمی در مقاومت دارد (Rafi et al., 1996).

هدف از این آزمایش ارزیابی رابطه مقاومت گندم نان به شته روسی گندم با میزان تغییرات فل کل، پروتئین کل، آمینو اسیدهای آزاد و پرولین آزاد در گیاه می باشد.

این تحقیق در سال ۱۳۷۸ در دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز در شرایط گلخانه انجام شد. هفت ژنتوتیپ گندم (۴۸۹۸، ۱۸۸۱، آزادی، کرج ۲، خزر، ارونده و اورجی کازرون) که میزان مقاومت آن ها قبلاً توسط نعمت الهی، ۱۳۷۶ تعیین شده بود، از مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه گردید. مقادیر نرمال شده مقاومت و شاخص مقاومت گیاهی ژنتوتیپ های مذکور در جدول ۱ آمده است. ژنتوتیپ ها تنوع نسبتاً زیادی را در مقاومت نشان می دهند.

بذرهای گندم در دو آزمایش مجزا (با آلودگی و بدون آلودگی) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار، هفت تیمار (ژنتوتیپ های گندم) و چهار مرحله نمونه برداری در شرایط کاملاً یکسان در سینی هایی به ابعاد $60 \times 30 \times 10$ سانتیمتر کاشته شدند (هر سینی در حکم یک واحد آزمایشی است) سینی ها

این آفت می باشد (Robinson, 1993).

خسارت مستقیم شته روسی، به علت تخریب مستقیم گیاه در اثر فیتو توکسین است. هنگام تغذیه فیتو توکسین به همراه بزاق آفت به داخل بافت گیاه وارد می شود (Miller and Porter, 1997). ترکیبات فیتو توکسین ضمن حرکت بزاق درون بافت های گیاه می توانند تأثیر تخریبی خود را روی کلروپلاست به جا گذاشته (Formusoh et al., 1994). این ترکیبات مانع ازبازشدن برگ های جدید و سبب لوله شدن آن ها می شود. شته روسی قادر است فرایند تنظیم اسمزی را مختل کرده و از این طریق موجب کاهش مقاومت به سرما شود (Burd and Burton, 1992). مراحل انتخاب گیاه میزبان به وسیله شته های غلات با سطوح فل کل در ارقام گندم در ارتباط است (Niraz et al., 1985). تغذیه شته روسی گندم باعث افزایش مقدار کل فل گندم های مقاوم می شود که مقدار آن به طور معنی داری از گندم های حساس بیشتر است (Van der Westhuizen and Pretorius, 1995). از نقطه نظر تغذیه ای سطح بالای آمینو اسیدهای آزاد برای حشرات مفید می باشد، این مطلب به وسیله مطالعات متعددی روی گندم زمستانه، یولاف و جو تأیید شده است. اندازه جمعیت شته های غلات مستقر روی گیاه به طور مستقیم با کل محتوای آمینو اسیدهای ضروری و آزاد در ارتباط است (Ciepiela, 1989). مدارک دیگر نشان می دهد که اغلب آمینو اسیدها مثل پرولین ممکن است نقش محافظت کننده برای تیلاکوئیدهای کلروپلاست و دیگر سیستم های غشایی تحت شرایط تنش داشته باشند (Heber et al., 1971). خسارت ناشی از شته روسی گندم روی گندم سبب کاهش کلروپلاست و خراب شدن ساختمان غشاء کلروپلاست می شود (Kruger and Hewitt, 1984). مقدار پرولین آزاد در گندم هایی که مورد هجوم شته روسی قرار گرفته اند نسبت به گندم های شاهد در

برای استخراج فل کل از متانول ۸۰ درصد استفاده شد، سپس عصاره صاف شده به مدت پنج دقیقه سانتریفیوژ گردید (هزار دور در دقیقه) آنگاه محلول بالایی جدا و برای اندازه گیری فل کل مورداستفاده قرار گرفت. اندازه گیری فل کل به روش سیورز و دالی (Seevers and Daly, 1970) انجام شد و برای تهیه منحنی استاندارد از اسید کافئیک استفاده گردید. استخراج و اندازه گیری کل آمینواسیدهای آزاد به روش یم و کوکینگ (Yemm and Cocking, 1955) انجام شد و برای تهیه منحنی استاندارد از غلظت های مختلف گلوتامیک اسید استفاده گردید. برای استخراج اسید آمینه پرولین بافت های برگ در ظروف شیشه ای حاوی ده میلیلیتر اسید سولفوسالیلیک سه درصد قرار داده شد. پس از ۲۴ الی ۴۸ ساعت بافت برگ را همراه با محتويات شیشه در هاون چینی کاملا هموژنیزه کرده و محلول حاصل توسط کاغذ صافی (واتمن شماره ۲) صاف گردید. از روش بیتس و همکاران (Bates et al., 1973) استفاده شد و منحنی استاندارد با استفاده از غلظت های مختلف ال-پرولین تهیه گردید. برای استخراج پروتئین کل از بافترتریس - HCl استفاده شد و اندازه گیری پروتئین کل با روش برادفورد استاندارد از آلبومین سرم گاوی (BSA) استفاده شد.

نتایج حاصل از اندازه گیری میزان فل کل نشان می دهد که میزان این عامل بیوشیمیابی در تمام ژنوتیپ هایی که تحت تاثیر آلودگی شته روسی قرار گرفته نسبت به تیمار شاهد (آزمایش بدون آلودگی) افزایش یافته است (شکل ۱)، که این نتایج با بعضی یافته ها در این زمینه هماهنگ است

توسط توری های ریز بافت کاملاً از محیط خارج مجزا شدند. خاک مورد استفاده ترکیبی از خاک مزرعه، ماسه بادی، و کود دامی به نسبت ۳:۱:۱ بود که به مدت پنج ساعت توسط بخار آب جوش استریل گردید. دما 5 ± 20 درجه سانتیگراد و رژیم نوری برمبنای هشت ساعت شب و ۱۶ ساعت روز تنظیم شد. بذرها قبل از کاشت با قارچکش کاربوکسین تیمار شد و با فاصله روی ردیف ۲/۵ و فاصله بین ردیف چهار سانتیمتر در سینی ها کشت شدند.

برای تشکیل کلنی از روش ورال و اسکات (Worrall and Scott, 1991) استفاده شد. بدین ترتیب که تعدادی شته روسی گندم از مرکز تحقیقات کشاورزی زرقان تهیه و روی یک رقم بسیار حساس جو (رقم والفجر) پرورش داده شد. برای جلوگیری از آلوده شدن کلنی با سایر حشرات و هم چنین رها شدن شته های کلنی، گلدان های حاوی کلنی با سرپوش مناسب پوشانده شدند. برای حصول اطمینان از خالص بودن شته ها هرسه روز یکبار کلنی ها به طور دقیق بازرسی شدند. در صورت آلوده بودن هر کدام از کلنی ها به سایر حشرات، کلنی مذکور در صورت امکان پاکسازی و در غیر این صورت به کلی معذوم می گردید.

تمامی گیاهچه ها در مرحله یک برگی با گذاشتن قطعات کافی از برگ های آلوده به شته روسی گندم روی خاک بین ردیف ها آلوده شدند. نحوه پراکندگی شته ها به گونه ای بود که هر گیاهچه به طور متوسط با شش تا هشت عدد شته آلوده شد. اولین نمونه برداری بعد از ۲۱ روز (هنگامی که حساس ترین رقم بیشترین خسارت را نشان داد) از دو برگ انتهایی (برگ های سوم و چهارم) انجام شد. نمونه برداری های بعدی به فاصله سه روز از یکدیگر انجام گردید.

مقایسه بـ

ژنوتیپ های حساس کمتر می باشد (شکل ۲). باید توجه داشت که از نقطه نظر تغذیه ای سطح بالای آمینو اسیدهای آزاد برای حشرات مفید می باشد. این مطلب به وسیله مطالعات متعدد تأیید شده است (Ciepiela., 1989 Weibull, 1987 Dorschner et al., 1987). کاهش میزان آمینو اسیدهای آزاد در ژنوتیپ های مقاوم در مقایسه با ژنوتیپ های حساس شاید به این دلیل باشد که ژنوتیپ های مقاوم واجد این توانایی هستند که آمینو اسیدهای آزاد را در ساختمان پروتئین هایی به کار ببرند که در مقاومت مؤثر هستند. این مطلب با نتایج حاصل از اندازه گیری میزان پروتئین در همین آزمایش هماهنگ است.

نتایج حاصل از اندازه گیری میزان پروتئین نشان می دهد که میزان این عامل بیوشیمیایی در ژنوتیپ هایی که تحت تأثیر آلودگی شته روسی قرار گرفتند نسبت به ژنوتیپ های شاهد (آزمایش بدون آلودگی) کاهش یافته است. بر اساس نتایج به دست آمده میزان پروتئین کل در ژنوتیپ های مقاوم نسبت به ژنوتیپ های حساس در هر دو آزمایش (با آلودگی و بدون آلودگی) بیشتر است (شکل ۳). این افت میزان پروتئین نشان می دهد که آلودگی ایجاد یک شرایط تنفس برای تمام ژنوتیپ ها کرده است، به طوری که

(Niraz et al., 1985) فل ها ارتباط بالایی با واکنش های دفاعی گیاه در مقابل شته های غلات دارند که این به دلیل سمتی بالای آن ها برای حشرات (شته ها) می باشد (Todd et al., 1985). بنابراین شاید بتوان گفت گیاهان در واکنش به آلودگی ناشی از شته روسی گندم به تولید بیشتر مواد فتلی می پردازند. هم چنین بررسی نتایج نشان می دهد که در بعضی از ژنوتیپ های حساس (اورجی کازرون) بعد از آلودگی میزان فل در مقایسه با ژنوتیپ های مقاوم تر به مقدار بیشتری در برگ تجمع یافته است. این نتایج مخالف با بعضی گزارش ها در این زمینه است (Van der Westhuizen and Pretorius., 1995). این موضوع شاید به این دلیل باشد که ژنوتیپ حساس بیشتر مورد حمله شته واقع می شود. بنابراین نسبت به ارقام مقاوم بیشتر تحریک شده و واکنش بیشتری به این محرك (شته روسی) نشان می دهد که این واکنش به صورت افزایش در میزان فل کل تجلی پیدامی کند. دلیل احتمالی دیگر این است که درصد ترکیب فتلی خاصی در ایجاد مقاومت تأثیر بیشتری دارد در ارقام مقاوم بیشتر از ارقام حساس باشد.

نتایج حاصل از اندازه گیری میزان کل آمینو اسیدهای آزاد نشان می دهد که مقدار این عامل بیوشیمیایی در هر دو آزمایش (با آلودگی و بدون آلودگی) به طور محسوسی در ژنوتیپ های مقاوم در


جدول ۱ - مقادیر نرمال شده اجزاء مقاومت و شاخص مقاومت گیاهی در ژنوتیپ های گندم

Table 1. Normalized indices for components of resistance and Plant Resistance Index(PRI) of wheat genotypes

| Genotype \ ژنوتیپ | Mechanism مکانیسم | آنتی بیوز Antibiosis X | آنتی زنوز Antixenosis Y | تحمل Tolerance Z | شاخص مقاومت گیاهی * (PRI) |
|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| 4898 | ۴۸۹۸ | 0.21 | 0.31 | 0.20 | 76.80 |
| 1881 | ۱۸۸۱ | 0.42 | 0.25 | 0.30 | 31.75 |
| Karaj | آزادی Azadi | 0.63 | 0.40 | 0.26 | 15.26 |
| | II | کرج ۲ | 0.53 | 0.77 | 8.75 |

| "ارزیابی تغییرات چندعامل بیوشیمیایی..." | | | | | | |
|---|--------------|------|------|------|------|--|
| Khazar | خزر ۱ | 0.97 | 0.31 | 1.00 | 3.32 | |
| I | اروند | 0.63 | 0.60 | 0.86 | 3.08 | |
| Arvand | اورجی کازرون | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.11 | |
| Orejy-e-Kazeroon | | | | | | |


*شاخص مقاومت گیاهی: عکس حاصلضرب $(1/X.Y.Z)$ سه جزو مقاومت است، که هر چه مقدار آن بیشتر باشد نشان دهنده مقاومت بیشتر است.
 *PRI: Plant Resistance Index, $(1/X.Y.Z)$. Higher PRI Indicates greater resistance.



ژنوتیپ

شکل ۱- میانگین مقادیر فنل کل اندازه گیری شده در مراحل مختلف نمونه برداری در برگ های آلوده و غیرآلوده
 (شاهد) به شته روسی گندم


Fig.1. Mean of total phenol contents at different sampling stages in infested and non-infested wheat leaves with Russian wheat aphid



ژنوتیپ


شکل ۲- میانگین مقدادیر کل آمینواسیدهای آزاد اندازه گیری شده در مراحل مختلف نمونه برداری در برگ های آلوهه وغیرآلوهه (شاهد) به شته روسي گندم

Fig.2. Mean of total free amino acids contents at different sampling stages in infested and non-infested wheat leaves with Russian wheat aphid



شکل ۳- میانگین مقدادیرپروتئین کل اندازه گیری شده در مراحل مختلف نمونه برداری در برگ های آلوهه وغیرآلوهه(شاهد) به شته روسي گندم


Fig.3. Mean of total protein contents at different sampling stages in infested and non-infested wheat leaves with Russian wheat aphid



شکل ۴- میانگین مقدادیرپرولین کل اندازه گیری شده در مراحل مختلف نمونه برداری در برگ های آلوهه

وغيرآلوده(شاهد) به شته روسي گندم

Fig.4. Mean of total proline contents at different sampling stages in infested and non-infested wheat leaves with Russian wheat aphid



شکل ۵- میانگین مقادیرنسبت فنل کل به کل آمینو اسیدهای آزاد اندازه گیری شده در مراحل مختلف نمونه برداری در برگ های آلوده و غيرآلوده(شاهد) به شته روسي گندم

Fig.5. Mean of ratio total phenol to total free amino acid contents at different sampling stages in infested and non-infested wheat leaves with Russian wheat aphid

نتایج حاصل ازاندازه گیری میزان پرولین آزاد نشان می دهد که میزان این عامل بیوشیمیابی در تمام ژنوتیپ ها که تحت تاثیرآلودگی شته روسي قرار گرفته نسبت به تیمار شاهد (آزمایش بدون آلودگی) افزایش یافته است (شکل ۴) این نتایج بیانگر این مطلب هستند که آلودگی توسط شته روسي باعث ایجادتش در تمام ژنوتیپ های مقاوم و حساس شده است. البته باید توجه داشت که میزان افزایش پرولین آزاد در ارقام مقاوم نسبت به ارقام حساس مشهودتر است. پرولین و دیگر ترکیبات نیتروژن دار که طی شرایط تنفس تجمع می یابند عمل سم زدایی سلول از آمونیاک رالنجام می دهند (Puritch and Barker, 1967). از طرفی آمونیاک به عنوان یک انتقال دهنده قوی الکترون ممکن است در شرایط تنفس در برگ های گندم ایجاد شود

گیاه قسمتی از پروتئین های محلول خود را به عامل های بیوشیمیابی مؤثر در مقاومت تبدیل می کند. (Van der Westhuizen and Botha, 1993) شته روسي تغییرات پروتئینی در گندم های مقاوم به وجود می آید هنگام تغذیه سه نوع پلی پپتید با وزن های تقریبی ۳۲، ۳۳ و ۲۵ کیلو Dalton در ژنوتیپ مقاوم به وجود آمده و شاهد حساس فاقد چنین تغییراتی بوده است. به طور کلی تشکیل پلی پپتیدهایی که در اثر حمله شته روسي ایجاد می شود، نقش مهمی در مقاومت دارند (Rafi et al., 1996). بنابراین می توان عنوان کرد که بیشتر از آنچه میزان (کمیت) پروتئین های محلول در مقاومت مؤثر باشد، نوع (کیفیت) این ترکیبات مهم هستند لذا، میزان پروتئین نمی تواند ملاک دقیقی برای انتخاب باشد.

داد که میزان این نسبت در ژنوتیپ های آلووده شده نسبت به ژنوتیپ های شاهد افزایش یافته است. هم چنین این نسبت در ژنوتیپ های مقاوم در مقایسه با ژنوتیپ های حساس از سطح بالا تری برخوردار است (شکل ۵). این نتایج با یافته های نیراز و همکاران (Niraz et al., 1985) هماهنگ است. ترکیبات فتلی در مکانیسم های دفاعی نقش موثری دارند. از طرفی میزان بالای آمینواسید های آزاد نیز از نقطه نظر تغذیه ای برای حشرات مفید می باشد. با توجه به این مطالب باید ارقامی که نسبت به شته ها مقاوم تر هستند از ارزش فل کل به آمینو اسید های آزاد بالاتری برخوردار باشند که نتایج حاصل از این تحقیق نیز این موضوع را ثابت می کند.

(به علت تغذیه شته روسی گندم). بنابراین می توان نتیجه گرفت که گندم مقاوم به دلیل میزان بالای پرولین توانایی بهتری درسم زدایی در مقایسه با گندم حساس داشته باشد. در ضمن پرولین به تنها یی نیز سیستم های غشایی سلول را حفظ می کند (Heber et al., 1971). در آزمایش بدون آلوودگی (تیمار شاهد) میزان پرولین آزاد در ارقام مقاوم نسبت به ارقام حساس در سطح بالاتری قرار دارد (شکل ۴) که این موضوع با گزارش هایی که در این زمینه وجود دارد هماهنگ است (Van der Westhuizen and Pretorius, 1995).

نسبت فل کل به کل آمینو اسیدهای آزاد معیاری است برای انتخاب ارقام مقاوم که به این نسبت اصطلاحاً شاخص سمیت گویند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان

References

- نعمت الهی، م. ۱۳۷۶. مقاومت به شته روسی گندم در ژنوتیپ های *Triticum spp*. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی شیراز: ۷۹ صفحه.
- Bates, L.S., R.P. Waldren, and I.D. Tear. 1973. Rapid determination of free proline for water stress studies. *Plant Soil* **39**:205-207.
- Bradford, M. M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye-binding. *Anal. Biochem.* **72**:248-254.
- Burd, J. D., and R. L. Burton. 1992. Characterization of plant damage caused by Russian wheat aphid. *J. Econ. Entomol.* **85**:2017-2022.
- Ciepiela, A. 1989. Biochemical basis of winter wheat resistance to the gram aphid, *Sitobion avenae*. *Entomol. Exp. Appl.* **51**:269-275.
- Dorschner, K. W., J. D. Ryan, R. C. Johnson and R. D. Eikenbary. 1987. Modification of host nitrogen levels by the greenbug (*Homoptera: Aphididae*): its role in resistance of winter wheat to aphid. *Environ. Ent.* **16(4)**:1007-1011.
- Formusoh, E. S., G. E. Wild, J. H. Hatchett, and R. D. Collins. 1994. Resistance to the Russian wheat aphid in wheat and wheat related hybrids. *J. Econ. Entomol.* **87**:241-244.
- Heber, U., L. Tyankova and K. A. Santarius. 1971. Stabilization and inactivation of biological membranes during freezing in the presence of amino acids. *Biochim. Biophys. Acta*. **241**:578-592.

- Kruger, G. H., and P. H. Hewitt. 1984. The effect of Russian wheat aphid (*Diuraphis noxia*) extract on photosynthesis of isolated chloroplast: Preliminary studies. Tech. Commun. Dep. Agric. Rep. S. Afr. No. **191**:34-37.
- Miller, H. L., and D. R. Porter. 1997. A technique to quantitatively measure the leaf streaking symptom of Russian wheat aphid infestation. Crop Sci. **37**:278-280.
- Niraz, S., B. Leszczynski, A. Ciepeila, A. Urbanska, and J. Warchol. 1985. Biochemical aspects of winter wheat resistance to aphid. Insect Sci. Appl. **6**:253-257.
- Puritch, G. S. and A. V. Barker. 1967. Structure and function of tomato leaf chloroplasts during ammonium toxicity. Plant Phisiol. **42**:1229-1238.
- Rafi, M. M., R.S. Zemetra, and S. S. Quisenberry. 1996. Interaction between Russian wheat aphid (*Hom: Aphididae*) and resistant and susceptible genotypes of wheat. J. Econ. Entomol. **89**:239-246.
- Robinson, J. 1993. Productivity of barley infested with Russian wheat aphid. Agron. J. **171**:168-175.
- Seavers, P.M., and J. M. Daly. 1970. Studies on wheat stem rust resistance controlled at the Sr6 locus. The role of phenolic compounds. Phytopathol. **60**:1322-1328.
- Smith, C. M., D. Schotzko, R. S. Zemerta, E. J. Souza, and S. Schroeder- Teeter. 1991. Identification of Russian wheat aphid (*Hom: Aphididae*) resistance in wheat. J. Econ. Entomol. **84**:328-332.
- Todd, G.W., A. Getahun, and D.D. Cress. 1971. Resistance in barley to the greenbug (*Schizaphis graminum*) toxicity of phenolic and flavonoid compounds and related substances. Ann. Ent. Soc. Am. **64**:718-722.
- Van der westhuizen, A. J., and F. C. Botha. 1993. Effect of the Russian wheat aphid on the composition and synthesis of water soluble proteins in resistant and susceptible wheat. J. Agron. & Crop Sci. **170**:322-326.
- Van der westhuizen, A.J., and E.Z. Pretorius. 1995. Biochemical and physiological responses of resistant and susceptible wheat to Russian wheat aphid infestation. Cereal Res. Commun. **23(3)**:305-313.
- Webster, J.A., K.J. Starks, and R.L. Burton. 1987. Plant resistance studies with *Diuraphis noxia* (*Homoptera: Aphididae*) a new United States wheat pest. J. Econ. Entomol. **80**:944-949.
- Weibull, J. 1987. Seasonal changes in the free amino acids of oat and barley phloem sap in relation to plant growth stage and growth of *Rhopalosiphum padi*. Ann. Appl. Biol. **111**:729-737.
- Worralled, W.D., and R.A. Scott. 1991. Differential reaction of Russian wheat aphid to various small grain host plants. Crop Sci. **31**:312-314.
- Yemm, E. W. and E. C. Cocking. 1955. The determination of amino-acids with ninhydrin. Analyst. **80**:209-213.
- Zwer, P. K., M. G. Mosaad, A. A. Elsidaig, and R. W. Rickman. 1994. Effect of Russian wheat aphid on wheat root and shoot development in resistant and susceptible genotypes. Crop Sci. **34**:650-655.

Evaluation of some biochemical factors for resistance of seven bread wheat (*Triticum aestivum L.*) genotypes to Russian aphid (*Diuraphis noxia*)

M. M. Kamelmanesh¹, M. T. Assad²

ABSTRACT

In order to evaluate the variation in wheat leaf total free phenol, total free amino acids, free proline and total protein in reaction to Russian aphid, an experiment was carried out on 7 bread wheat genotypes (with different levels of resistance). The experiment was performed in greenhouse conditions at Shiraz 1999. The results indicated that Russian aphid caused stress on all genotypes and total free phenol increased in all of them. High level of resistance in genotypes was correlated with free proline content before contamination ($r=0.87, p<0.01$). In resistant genotypes free proline accumulated rapidly after contamination. The results also signified that toxicity index value (ratio of total free phenol to total free amino acids) was correlated with resistance of plant to Russian aphid ($r=0.73, p<0.05$), therefore, resistant genotypes had higher values. According to the results, total protein of resistant genotypes was also higher than susceptible genotypes. On the other hand, contamination caused reduction in total protein content in all genotypes.

Key words: Bread wheat, Russian aphid, Phenol, Proline, Resistance.

1,2 – Scientific member I.A.Univ., Shiraz and Assoc. Prof. Shiraz Univ., Iran respectively.