

اثر میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات گیاهی آفتابگردان (*Helianthus annuus* L.) در شرایط تنش خشکی

Effect of Arbuscular mycorrhizal on yield, yield components and plant characteristics of sunflower (*Helianthus annuus* L.) under drought stress conditions

احسان جمشیدی^۱، امیر قلاوند^۲، امین صالحی^۳، محمد جواد زارع^۴ و علی رضا جمشیدی^۵

چکیده

جمشیدی، ا.، ا. قلاوند، ا. صالحی، م. جواد زارع و ع. ر. جمشیدی. ۱۳۸۸. اثر میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات گیاهی آفتابگردان (*Helianthus annuus* L.) در شرایط تنش خشکی. مجله علوم زراعی ایران: ۱۱(۱): ۱۵۰-۱۳۶.

یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود آب است. ارزیابی عملکرد گیاهان زراعی در شرایط تحت تنش و استفاده از میکرووارگانیسم‌های مفید خاک جهت کاهش خسارت‌های ناشی از تنش‌های محیطی از راه حل‌های نوین در کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می‌شود. به این منظور، آزمایشی در سال ۱۳۸۵ در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به صورت کوت‌های خرد شده در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تنش خشکی در سه سطح آبیاری پس از مصروف ۴۰ (شاهد)، ۶۰ و ۸۰ درصد رطوبت قابل استفاده خاک در گرت‌های اصلی و تیمار تلقیح بذر آفتابگردان (رقم آستار) با دو گونه میکوریزا شامل گلوموس موسه (*Glomus mosseae*) گلوموس هویی (*Glomus hoi*) و یک تیمار بدون تلقیح در گرت‌های فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تلقیح میکوریزا بر تمامی صفات اندازه گیری شده بجز تعداد کل دانه‌ها، وزن هزار دانه، تعداد دانه‌های پر و درصد روغن دانه در سطح یک درصد معنی دار بود. تأثیر تنش خشکی بر تمامی صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. اثر متقابل میکوریزا با تنش خشکی برای تمامی صفات آفتابگردان بجز عملکرد دانه، تعداد دانه پوک، درصد پوکی و عملکرد روغن معنی دار بود. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد دانه و وزن خشک در تیمار آبیاری پس از مصرف ۸۰ درصد رطوبت خاک به ترتیب از تیمار تلقیح میکوریزای گلوموس موسه (*G. mosseae*) و بدون تلقیح با ۱۲۳۰ و ۹۹۰ کیلوگرم در هکتار برای عملکرد دانه و ۴۴۰۰ و ۳۱۸۰ کیلوگرم در هکتار برای وزن خشک بدست آمد. نتایج این آزمایش نشان داد که هر چند تنش خشکی باعث کاهش عملکرد آفتابگردان شد، ولی میکوریزا شدت اثر آن را کاهش داد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد دو گونه میکوریزا بر عملکرد آفتابگردان و کاهش شدت خسارت تنش اثر متفاوتی داشتند. میکوریز گلوموس موسه (*G. mosseae*) دارای قدرت همزیستی بیشتری در مقایسه با گلوموس هویی (*G. hoi*) بود و از افت شدید عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی جلوگیری نمود. میکوریزا از طریق افزایش وزن هزار دانه، تعداد دانه و کاهش میزان پوکی دانه طبق، باعث افزایش عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی و عدم تنش خشکی شدند.

واژه‌های کلیدی: آربوسکولار، آفتابگردان، تنش خشکی، قارچ‌های میکوریزا و عملکرد.

تاریخ دریافت: ۱۳۸۶/۱۰/۲۵

- ۱- دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تربیت مدرس
- ۲- دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس (مکاتبه کننده)
- ۳- دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تربیت مدرس
- ۴- استادیار دانشگاه ایلام
- ۵- دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

شاهد در شرایط تنفس آبی، بیشتر بود. خلوتی و همکاران (2005, et al.) گزارش کردند که وزن خشک ریشه و اندام های هوایی بوته های گندم تلقیح شده با قارچ میکوریزا در مقایسه با بوته های شاهد تحت در شرایط تنفس کم آبی، بیشتر بود. وو و ژیا (Wu and Xia, 2006) گزارش دادند که نهال های لیمو تلقیح شده با میکوریزا در مقایسه با نهال های تلقیح نشده از پتانسیل آب برگ، فتوستنت و تعرق بیشتر و دمای کمتر برگ برخوردار بودند. سازو کارهایی که قارچ میکوریزا باعث افزایش میزان پایداری گیاه در شرایط خشکی می شوند عبارتند از افزایش جذب آب به وسیله هیف، کترول باز و بسته شدن روزنہ از طریق ترشح هورمون و به طور غیر مستقیم از طریق افزایش جذب فسفر و تأثیری که این عنصر بر میزان نسبی آب گیاه می گذارد، این آزمایش به منظور بررسی تلقیح بذر های گیاه آفتابگردان با قارچ های میکوریزا آربوسکولار شامل گلوموس موسه (*Glomus mosseae*) و گلوموس هویی (*Glomus hoi*) بر عملکرد و اجزای عملکرد آن در شرایط تنفس خشکی به اجرا گذاشته شد.

مواد و روش ها

این آزمایش در بهار سال ۱۳۸۵ در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. در این آزمایش از بذور آفتابگردان رقم آلستار استفاده شد. تنفس آبی در سه سطح آبیاری پس از مصرف ۴۰ (شاهد)، ۶۰ و ۸۰ درصد رطوبت حجمی قابل استفاده خاک در کرت های اصلی (لازم به ذکر است که در زمان کاشت تا برداشت آفتابگردان هیچ گونه بارندگی در منطقه وجود نداشت) و تیمار تلقیح بذر آفتابگردان با دو گونه میکوریزا شامل گلوموس موسه (*Glomus mosseae*)، گلوموس هویی (*Glomus hoi*) و یک تیمار بدون تلقیح در کرت های فرعی قرار داده شدند. تیمارهای تلقیح به ترتیبی انجام

گیاهان روغنی پس از غلات مهم ترین گروه از گیاهان زراعی هستند که با توجه به ارزش غذایی فراوان دانه های آنها، به عنوان منابع تولید روغن و پروتئین گیاهی، مورد توجه بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی می باشد (Anonymous, 2001). حشکی از اصلی ترین عوامل غیر زنده محدود کننده رشد گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا از جمله ایران محسوب می شود. یکی از روش های افزایش پایداری تولید گیاهان در شرایط تنفس کم آبی، استفاده از رابطه همزیستی میکوریزایی است. ۸۰ درصد از مطالعات انجام شده روی میکوریزا مربوط به بررسی افزایش تحمل گیاهان به تنفس آبی در حضور این قارچ بوده است (Ague, 2001). نتایج تحقیقات نشان داده است که قارچ میکوریزا آربوسکولار باعث افزایش تحمل گیاهان به خشکی می شود (Davies. et al., 1992, 1993; Von Reichenbach and Schonbeck., 1995; Smith and Read., 1997; Davies. et al., 2002; Ague, 2004) همچنین گزارش شده است که در شرایط خشکی گیاهان تلقیح شده با میکوریزا، آب و مواد غذایی بیشتری نسبت به گیاهان تلقیح نشده جذب می کنند (Subramanian and Charest., 1997, 1999; Al-Karaki, and Clark., 1999; Srivastava. et al., 2002) بسیاری از گیاهان به وسیله میکوریزای بومی خاک کلونیزه می شود. این قارچ ها قادر به جذب و انتقال مواد آلی به گیاهان هستند (Chalk et al., 2006). میکوریزا آربوسکولار قادر به افزایش جذب و انتقال و قابلیت دسترسی به عناصر معدنی مانند فسفر، نیتروژن، مس و روی به گیاه میزان خود است (Marschner and Dell, 1994; Clark and Zeto, 2000) تحقیقات نشان داده که میکوریزا باعث بهبود مقدار نسبی آب گیاه می شود، (Porel and Ruzi-lozano, 2004) گزارش دادند که میزان پتانسیل آب برگ در بوته های سویای تلقیح شده با میکوریزا در مقایسه با بوته های

محصول کلیه کرت های آزمایشی از مساحت دو متر مربع با دست برداشت شد و پس از جدا کردن دانه ها از طبق ها، تعداد دانه های پر و پوک شمارش و عملکرد دانه (با رطوبت ۱۴ درصد) محاسبه شد. برای اندازه گیری وزن هزار دانه، از دانه های برداشت شده از هر کرت آزمایشی ۱۰ نمونه ۲۰۰ تایی جدا و پس از توزین با ترازو، میانگین وزن نمونه ها به عنوان وزن دویست دانه در نظر گرفته شد و وزن هزار دانه آن محاسبه شد. میزان روغن دانه با استفاده از دستگاه (INFRAMATIC, 8620, Germany) اندازه گیری شد. به منظور بررسی اندام های قارچی در ریشه ها از روش رنگ آمیزی ریشه ها (Philips and Hayman, 1980) استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار MSTAC و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون دانکن انجام گرفت.

نتایج و بحث

تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تأثیر میکوریزا بر عملکرد دانه، تعداد دانه های پوک، درصد پوکی دانه ها، عملکرد روغن و وزن خشک گیاه در سطح یک درصد معنی دار بود. اثر تنش آب نیز بر تمام صفات گیاهی اندازه گیری شده معنی دار بود. اثر متقابل میکوریزا و تنش آب بر عملکرد دانه، تعداد دانه های پوک، درصد پوکی دانه ها و عملکرد روغن معنی دار بود (جدول ۱).

مقایسه میانگین ها نشان داد که تنش آبی باعث کاهش ارتفاع بوته می شود و بین سطوح تنش از نظر ارتفاع بوته اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (جدول ۲) مقایسه میانگین ها نشان داد که در مقایسه با گیاهان بدون تلقیح، گیاهان تلقیح شده با میکوریزا ارتفاع بوته بیشتری داشتند و بیشترین ارتفاع بوته در گیاهان تلقیح شده با گلوموس موسه

گرفت که هر بذر آفتابگردان آغشته به مایه تلقیح، حدود ۲۳۰ - ۱۸۰ اندام فعال قارچی دریافت نماید (مایه تلقیح دو نوع قارچ میکوریزا به صورت پودر و مخلوطی از اسپورها، ریسه (هیف) ها، ماسه (محیط کشت) و قطعات ریشه گیاه میزبان بود). مایه تلقیح مورد استفاده از ریشه های گیاه بارهنگ سرنیزه ای که با این دو نوع قارچ آغشته شده بود و توانایی تلقیح بیش از ۹۵ درصد گیاه میزبان را دارا بود، جداسازی شده، گیاهان بارهنگ از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تهیه شده بودند. قبل از کشت، میزان آلدگی خاک از نظر قارچ های بومی توسط روش غربال گیری اندازه گیری و از کم بودن میزان میکوریزای خاک اطمینان حاصل شد. میزان آلدگی میکوریزایی پس از برداشت به وسیله میکروسکوپ طبق روش گیووانی و موسی (Giovanetti and Mosse 1980) اندازه گیری شد. به منظور تعیین دقیق زمان آبیاری از دستگاه تعیین اندازه گیری رطوبت خاک (TDR, Trime-FM, Germany) که درصد حجمی رطوبت خاک را در عمق مورد نظر (۶۰ سانتی متر) اندازه گیری می کند، استفاده شد. به منظور آبیاری یکنواخت واحدهای آزمایشی از یک شبکه لوله کشی پلی اتیلنی و برای اندازه گیری مقدار آب مصرفی از یک کنتور حجمی استفاده شد. مجموع آب مصرفی در طول دوره رشد آفتابگردان برای تیمارهای بدون تنش (شاهد) و آبیاری پس از مصرف ۶۰ و ۸۰ درصد رطوبت قابل استفاده از خاک به ترتیب معادل ۷۴۰۰، ۵۷۰۰ و ۴۴۵۰ متر مکعب در هکتار بود. واحدهای آزمایشی تا مرحله ابتدایی تشکیل اندام های زایشی (مرحله ستاره ای شدن) بطور یکنواخت و پس از تخلیه ۴۰ درصد رطوبت قابل استفاده خاک آبیاری شده و بعد از آن تیمارهای آبیاری اعمال شدند. در مراحل R1 و R5 بوته های موجود در یک متر مربع از هر کرت انتخاب، پس از اندازه گیری ارتفاع آنها، مساحت برگ ها با استفاده از دستگاه (ΔT , UK) اندازه گیری شد. پس از رسیدگی فیزیولوژیک،

جدول ۱- تجزیه واریانس صفات گیاهی آفتابگردان در شرایط تنفس آبی و تلقیح با میکوریزا

Table 1. Analysis of variance for plant characteristics under drought stress and mycorrhiza inoculation in sunflower

S.O.V	منابع تغییر	درجه آزادی	df	(MS)		میانگین مربعات		وزن هزار دانه 1000 Seed weight
				عملکرد دانه Seed yield	تعداد کل دانه در متر مربع No. Total seeds.m ⁻²	تعداد دانه پوک در مترمربع No. of unfilled seeds. m ⁻²	تعداد دانه پر در مترمربع No. of filled seeds. m ⁻²	
Replication(R)	تکرار	3	12.3*	0.0018 ^{ns}	57.37*	14.4**	49.1*	9376.7**
Water stress(w.s)	تنفس آب	2	3.6**	5.82**	5017.8**	1.25 ^{ns}	351.9 ^{ns}	13742.9**
Error _a	خطای (الف)	6	2.4	0.0084	12.59	1.2	71.274	280.1
Mycorrhiza	میکوریزا	2	53.2**	0.099**	544.59**	86.3**	13805.5**	332794.1**
Mycorrhiza × Water stress	میکوریزا × تنفس آب	4	3.2**	0.122**	36.14**	1.5 ^{ns}	37.34 *	849.9 ^{ns}
Error _b	خطای (ب)	18	2.1	0.0128	11.24	1.3	9.1	327.7
C. V (%)	ضریب تغییرات (درصد)		3.1	4.97	6.06	5.1	8.02	14.1

ns: غیر معنی دار

* و **: به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

ns: Non-significant

*, **: significant at 5% and 1% probability levels, respectively

اثر میکوریزا آبوسکولار بر عملکرد....."

ادامه جدول ۱ - تجزیه واریانس صفات گیاهی آفتابگردان در شرایط تنش آبی و تلقیح با میکوریزا

Continue Table 1. Analysis of variance for Plant characteristics under drought stress and mycorrhiza inoculation in sunflower

S.O.V	منابع تغییر	درجه آزادی	df	(MS)				میانگین مریعات			
				میزان کلوبنیزاسیون				میزان روغن دانه			
				میکوریزا	Mycorrhiza colonization	شاخص سطح برگ	LAI	ارتفاع بوته	Plant height	Oil content	عملکرد روغن
Replication(R)	تکرار	3		12.3*	0.0018 ^{ns}	57.37*	14.4**	49.1*	9376.7**		
Water stress(w.s)	تنش آب	2		3.6**	5.82**	5017.8**	1.25 ^{ns}	351.9 ^{ns}	13742.9**		
Error _a	خطای (الف)	6		2.4	0.0084	12.59	1.2	71.274	280.1		
Mycorrhiza	میکوریزا	2		53.2**	0.099**	544.59**	86.3**	13805.5**	332794.1**		
Mycorrhiza × Water stress	میکوریزا × تنش آب	4		3.2**	0.122**	36.14**	1.5 ^{ns}	37.34 *	849.9 ^{ns}		
Error _b	خطای (ب)	18		2.1	0.0128	11.24	1.3	9.1	327.7		
C. V (%)	ضریب تغییرات (درصد)			4.1	4.345	3.32	2.63	4.23	3.54		

ns: غیر معنی دار

* و **: به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

ns: Non- significant

* ** significant at 5% and 1% probability levels, respectively

میزان اغلب منجر به افزایش میزان رشد و محتوای آب برگ، کاهش هدایت روزنگاری و افزایش (Dixon, *et al.*, 1994) میزان فتوسنتز خالص می شود (Dixon, *et al.*, 1994). مقایسه میانگین ها نشان داد که در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده با قارچ، گیاهان آلوده با گلوموس موسه و گلوموس هویی، عملکرد دانه بیشتری داشتند (جدول ۲). گزارش شده که در آفتابگردان شاخص سطح برگ با عملکرد دانه همبستگی مثبت داشته و باعث افزایش عملکرد دانه می شود (Shabana, 1974; Fereres *et al.*, 1986; Alza, 1995) در آفتابگردان حداکثر تابش خورشیدی جذب شده در شاخص سطح برگ بالا اتفاق می افتد و عملکرد دانه نیز زمانی به حداکثر می رسد که در مرحله ۶۰ درصد گلدهی، میزان شاخص سطح برگ بالا باشد (Merrien, 1992). مقایسه میانگین ها (جدول ۲) نشان داد که بین دو نوع میکوریزا از نظر تعداد دانه پر و تعداد دانه پوک در متر مربع، درصد پوکی، عملکرد روغن و وزن هزار دانه از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت. بین گیاهان تلقیح شده با گلوموس موسه و گیاهان تلقیح نشده در تمامی صفات یاد شده اختلاف معنی داری مشاهده شد، هر چند که بین گیاهان تلقیح شده با گلوموس هویی و گیاهان تلقیح نشده در تمامی صفات به جز تعداد دانه پوک و درصد پوکی، اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد، ولی مقادیر صفات ذکر شده و عملکرد دانه در گیاهان تلقیح شده با گلوموس هویی در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده، نسبتاً بیشتر بود (جدول ۲). اثرات مثبت ناشی از تلقیح میکوریزا بر اجزای عملکرد ممکن است ناشی از افزایش جذب مواد معدنی توسط ریشه گیاهان باشد که با یافته های سایر محققان که افزایش در اجزای عملکرد را ناشی از بهبود وضعیت جذب عناصر فسفر، نیتروژن، مس و روی (Dell, 1994; Clark and Zeto, 2000) و افزایش جذب آب به وسیله هیف (Marschner and

بدست آمد (جدول ۲). مقایسه میانگین اثرات متقابل نش با میکوریزا نشان داد که اگر چه تنفس خشکی موجب کاهش ارتفاع بوته می شود ولی قارچ های میکوریزا تا حدودی باعث جبران کاهش ارتفاع بوته ناشی از تنفس آبی شدند (جدول ۳). شاخص سطح برگ در شرایط تنفس کم آبی در گیاهان میکوریزایی و غیر تلقیح شده در مقایسه با وضعیت آبیاری مطلوب کاهش یافت (جدول ۳). این آزمایش نشان دهنده اثر مثبت میکوریزا بر شاخص های رشد تحت شرایط مطلوب آبی و کم آبی بود. نتایج سایر تحقیقات نیز نشان دهنده افزایش رشد و ماده خشک تولیدی تحت شرایط تنفس آبی و آبیاری مطلوب در سایر گیاهان بوده است (Azcon *et al.*, 1996; Khalvati *et al.*, 2005; Wu and Xia, 2006). گزارش شده است که این اثر مثبت ناشی از بهبود وضعیت جذب عناصر فسفر، نیتروژن، مس و روی (Clark and Zeto, 1994; Dell, 1994; Faber *et al.*, 2000) افزایش جذب آب به وسیله هیف (Fryla and Bryla, 1991)، افزایش طول و تراکم ریشه (Duniway, 1997) در اثر تلقیح با میکوریزا است. مهم ترین مرحله نموی آفتابگردان که در آن مرحله میزان عملکرد تعیین می شود تولید برآکته است، بنابراین وجود هر عامل بازدارنده در این مرحله باعث کاهش عملکرد دانه می شود (Chimenti and Hall, 1992; Connor and Sadras, 1992; Cantagallo *et al.*, 1997) مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که در شرایط تنفس نسبت به شرایط مطلوب آبیاری، میکوریزا تأثیری بیشتری بر شاخص سطح برگ داشت و بین دو گونه میکوریزا نیز در شرایط تنفس آبی از نظر شاخص سطح برگ اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (جدول ۳) که این موضوع احتمالاً به علت جذب بیشتر آب در تیمارهای تلقیح شده با میکوریزا باشد. مطالعات انجام گرفته نشان داده است که افزایش جذب آب به واسطه میکوریزا در گیاه

تعیین عملکرد دانه آفتابگردان است که متاثر از میزان آب قابل دسترس گیاه است و تحت شرایط کم آبی کاهش می‌یابد (Vranceanu, 1970; Shabana, 1974). (Kesteloot, et al., 1985) نتایج سایر مطالعات نیز نشان دادند که میزان روغن آفتابگردان در تنش‌های خشکی کاهش و میزان پرتوئین دانه افزایش می‌یابد (Shabana, 1974).

Fereres et al., 1986; Alza, 1995)

مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش آب با میکوریزا نشان داد که گونه‌های میکوریزا بر عملکرد دانه آفتابگردان تحت رژیم‌های مختلف آبیاری اثر معنی داری داشتند، به طوری که در شرایط بدون تنش بین گیاهان تلقیح شده با گلوموس موسه در مقایسه با میکوریز گلوموس هویی از نظر عملکرد دانه و عملکرد روغن اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (جدول ۳). با آنکه در شرایط بدون تنش بین گیاهان تلقیح شده با گلوموس هویی و گیاهان تلقیح نشده از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت، اما گیاهان تلقیح شده نسبت به گیاهان تلقیح نشده عملکرد دانه و روغن بیشتری داشتند. تحت شرایط تنش کم آبی، عملکرد دانه، روغن و وزن خشک دانه در گیاهان تلقیح شده با میکوریزا به ویژه گلوموس موسه از گیاهان تلقیح نشده بیشتر بود، به طوری که در شرایط تنش آب (۶۰ درصد) بین گیاهان تلقیح شده با گیاهان تلقیح نشده و همچنین بین گیاهان تلقیح شده از نظر عملکرد دانه، عملکرد روغن، وزن خشک گیاه و وزن هزار دانه اختلاف آماری معنی داری وجود داشت. نتایج نشان داد افزایش عملکرد ناشی از افزایش تعداد دانه‌ها، کاهش میزان پوکی و وزن هزار دانه آنها بوده است.

مقایسه میانگین اثرات متقابل رژیم آبیاری با تنش آب (۸۰ درصد) نشان داد که اگرچه بین گیاهان تلقیح شده با گلوموس هویی و گیاهان تلقیح نشده اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت، اما عملکرد دانه،

مقایسه میانگین‌ها نشان داد که بین سطوح آبیاری از نظر تأثیر بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان اختلاف آماری معنی داری وجود داشت و بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب از تیمار بدون تنش (۲۳۷/۸ گرم در متر مربع و تیمار تحت تنش (۱۰۸/۸ گرم در متر مربع) بدست آمد (جدول ۲). به نظر می‌رسد که تنش آب با تأثیر بر شاخص سطح برگ، باعث کاهش فتوستتر، ماده خشک تولیدی، عملکرد دانه، اجزای عملکرد و محتوى روغن دانه می‌شود. فری رز و همکاران (Fereres et al., 1986) نشان دادند که تنش خشکی باعث کاهش عملکرد دانه در تمام ژنوتیپ‌های مورد مقایسه آفتابگردان شد که علت آن کاهش تعداد دانه و وزن دانه‌ها بوده است. علت کاهش تعداد دانه در آزمایش نامبردگان کاهش قطر طبق و افزایش درصد پوکی دانه‌ها اعلام شد. کمبود آب از طریق کاهش تعداد دانه در طبق و کاهش فتوستتر نیز باعث کاهش عملکرد دانه گردید. کاهش عملکرد دانه آفتابگردان در اثر تنش رطوبتی و یا تیمارهای کم آبیاری توسط پژوهشگران دیگری نیز گزارش شده است (Unger, 1992; Karimzade asl, 2003 et al., 2003). با بروز تنش کم آبی در مراحل اولیه رشد آفتابگردان، میزان گسترش سطح برگ، به آهستگی کاهش می‌یابد ولی اگر تنش آبی در مراحل زایشی گیاه رخ دهد باعث کاهش تعداد برگ و پیر شدن سریع آنها و در نهایت کاهش شاخص سطح برگ می‌شود (Merrien, 1992). در چنین وضعیتی میزان عملکرد کاهش می‌یابد. بالدینی و همکاران (Baldini, et al., 1998) گزارش نمودند که تنش کم آبی نسبت به شرایط بدون تنش باعث کاهش عملکرد دانه آفتابگردان می‌شود. مطالعات نشان داده است که وزن دانه از عوامل مهم تعیین کننده میزان عملکرد است که به شدت تحت تأثیر میزان آب قابل دسترس گیاه قرار می‌گیرد (Fereres et al., 1986). تعداد دانه در طبق یکی دیگر از صفات بسیار مهم در

جدول ۲- مقایسه میانگین صفات گیاهی آفتابگردان در شرایط نتش آبی و تلقیح با میکوریزا

Table 2. Mean comparison of plant characteristics under drought stress and mycorrhiza inoculation in sunflower

Treatment	تیمارها	عملکرد seed yield g.m ⁻²	تعداد کل دانه در متر مربع Number total seed.m ⁻²	تعداد دانه پوک در متر مربع No. of unfilled seed.m ⁻²	وزن هزاردانه 1000 seed Wight (g)	درصد پوک Percentage of unfilled seed	وزن خشک Dry matter (g.m ⁻²)	شاخص سطح برگ LAI	ارتفاع بوته Plant high cm	عملکرد روغن Oil yield (g.m ⁻²)	درصد روغن Oil percentage	تعداد دانه پر در مترمربع Number of filled seed.m ⁻²
میکوریزا												
<i>G. mosseae</i>	گلوموس موسه	176.8a	5616a	132c	49.7a	2.4b	539.1a	2.72a	108.6a	77.1a	43.2a	5448a
<i>G. hoi</i>	گلوموس هوی	161.3ab	5391a	141bc	43.3ab	2.6b	522.3b	2.58b	101.1b	68.0ab	42.9a	5220ab
No inoculation	بدون تلقیح	151.3b	5337a	219a	39.5b	4.3a	473.9c	2.48c	93.1c	66.3b	42.8a	5118b
نششکی												
Well irrigated (1)	بدون نتش	237.8a	5951a	85c	59.2a	1.4c	686.8a	3.4a	126.1a	109.4a	46a	5866a
irrigate.60% water depl. (2)	آبیاری پس از مصرف ۶۰٪ درصد رطوبت قابل استفاده	142.8b	5312b	177b	40.69b	3.4b	493.2b	2.6b	97.1b	60.1b	42.2b	5195b
Irrigate. 80% water depl. (3)	آبیاری پس از مصرف ۸۰٪ درصد رطوبت قابل استفاده	108.8c	5081c	229a	32.6c	4.5a	355.3c	1.7c	79.3c	44.4c	40.8c	4852b

در هر ستون میانگین های که دارای حرف مشابه هستند، بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی داری ندارند

Means in each columns followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using Duncan's Multiple Range Test

اثر میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد....."

جدول ۳- مقایسه میانگین صفات گیاهی آفتابگردان در تیمارهای اثرات متقابل تنش آبی با میکوریزا

Table 3. Mean comparison of Plant characteristics under drought stress and mycorrhiza inoculation interaction in sunflower

Treatments		تیمارهای آزمایشی	میزان آلودگی میکوریزا (%)	عملکرد روغن (g.m ⁻²)	عملکرد seed yield (g.m ⁻²)	تعداد دانه پوک در متر مربع No. of unfilled seed. m ⁻²	وزن هزاردانه 1000 seed wight (g)	ارتفاع بوته Plant high (cm)	ارتفاع بوته LAI	تعداد دانه بر در مترومیغ Number of filled seed.m ⁻²	شاخص سطح برگ LAI	وزن خشک Dry matter (g.m ⁻²)
Well irrigated (1)	<i>G. mosseae</i>	آبیاری پس از مصرف ۴۰ درصد رطوبت قابل استفاده خاک	کلوموس موسه	54.1	114a	247a	80f	62.2a	135.6a	5887a	3.5a	713a
Well irrigate (1)	<i>G. hoi</i>	آبیاری پس از مصرف ۴۰ درصد رطوبت قابل استفاده خاک	کلوموس هوی	46.1	109b	233b	88f	58.8a	124.1b	5793ab	3.4ab	694a
Well irrigate (1)	No inoculation	آبیاری پس از مصرف ۴۰ درصد رطوبت قابل استفاده خاک	بدون تلقیح	1.3	107b	226b	93f	56.8ab	118.7c	5731ab	3.2b	672ab
irrigate.60% water depl. (2)	<i>G. mosseae</i>	آبیاری پس از مصرف ۶۰ درصد رطوبت قابل استفاده خاک	کلوموس موسه	40.4	67c	160c	133e	48.7c	106.1d	5467ab	2.9c	536c
irrigate.60% water depl. (2)	<i>G. hoi</i>	آبیاری پس از مصرف ۶۰ درصد رطوبت قابل استفاده خاک	کلوموس هوی	38.2	62d	146d	149d	42.8d	99.7e	5103bc	2.6d	493d
irrigate.60% water depl. (2)	No inoculation	آبیاری پس از مصرف ۶۰ درصد رطوبت قابل استفاده خاک	بدون تلقیح	1.4	51e	121e	251b	37.3e	85.7f	4803c	2.4e	460e
Irrigate. 80% water depl. (3)	<i>G. mosseae</i>	آبیاری پس از مصرف ۸۰ درصد رطوبت قابل استفاده خاک	کلوموس موسه	35.1	50.e	123e	183c	38.1e	84.2f	4883bc	2.1f	440e
Irrigate. 80% water depl. (3)	<i>G. hoi</i>	آبیاری پس از مصرف ۸۰ درصد رطوبت قابل استفاده خاک	کلوموس هوی	24.1	42f	104f	197c	33.5g	79g	4816c	1.8h	380f
Irrigate. 80% water depl. (3)	No inoculation	آبیاری پس از مصرف ۸۰ درصد رطوبت قابل استفاده خاک	بدون تلقیح	1.1	40f	99f	319a	32.3g	74.7h	4681c	1.6g	318g

در هر ستون میانگین های که دارای حرف مشابه هستند، بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی داری ندارند.

Means in each columns followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using Duncan's Multiple Range Test

موسه در مقایسه با گلوموس هویی بیشتر بود. در صد آلدگی ریشه با گلوموس موسه بین ۳۵ تا ۵۴ درصد و برای گلوموس هویی از ۲۴ تا ۴۶ درصد متغیر بود (جدول ۳). نتایج این آزمایش نشان می دهد که میزان توسعه میکوریزا با کاهش میزان رطوبت خاک، کاهش می یابد که نشان دهنده اثر تنفس آبی بر میزان همزیستی میکوریزا است. این آزمایش نشان داد که تنفس آبی دارای اثر بازدارنده ای بر توسعه فعالیت میکوریزا است. نتایج این آزمایش با نتایج سایر آزمایش های انجام گرفته نیز مطابقت دارد. تحقیقات مورت و همکاران (Morte *et al* 2000) نشان داد است که کمبود رطوبت خاک در مناطق خشک و نیمه خشک، اثر بازدارنده ای بر گسترش میکوریزا دارد. هر چند در برخی از آزمایشات مشاهده شده است تنفس آبی باعث افزایش میزان میکوریزا گردیده است.

نتیجہ گپٹی

نتایج این آزمایش نشان داد که عملکرد آفتابگردان به واسطه همزیستی با میکوریزا در شرایط بدون تنش و تنش آبی، افزایش می‌یابد. اثر میکوریزا بر عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط تنش آبی نسبت به شرایط بدون تنش بیشتر است. همچنین مشاهده شد که میکوریزا باعث افزایش تحمل گیاه در برابر تنش کم آبی شده و از افت زیاد عملکرد نسبت به گیاهان تلقیح نشده جلوگیری کند. به نظر می‌رسد که میکوریزا از طریق افزایش وزن هزار دانه، تعداد دانه‌ها و کاوش میزان پوکی دانه‌ها، باعث افزایش عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش و بدون تنش آبی می‌شود.

تأثیر دو گونه میکوریزای مورد استفاده در این آزمایش بر عملکرد و کاهش شدت خسارت تنفس متفاوت بود و قارچ میکوریزای گلوموس موسه دارای همزیستی بیشتری در مقایسه با گلوموس هویی بود و میزان افت عملکرد آفتابگردان در شرایط تنفس آبی را به طور نسبی کاهش داد.

روغن در گیاهان تلقیح شده نسبتاً بیشتر بود. در این شرایط بین گیاهان تلقیح شده با گلوموس هویی و گیاهان تلقیح شده با گلوموس موسه اختلاف معنی داری از نظر عملکرد دانه، عملکرد روغن و وزن هزار دانه وجود داشت. جفرایز (Jeffries, 1987) نیز نشان داده که همزیستی گیاه با میکوریزا به خصوص در شرایط حاصلخیزی کم خاک از طریق افزایش دسترسی به عناصر غذایی و انتقال آن به گیاه، باعث افزایش عملکرد می شود. این افزایش عملکرد مرتبط با افزایش میزان جذب عناصر غذایی مانند فسفر، روى و مس است (Nelson, 1982; Kothari, 1990; Nye, 1997). نتایج برخی از آزمایشات نیز نشان داده است که میزان افزایش ماده خشک توسط میکوریزا تحت شرایط تنش آبی در مقایسه شرایط مطلوب آبی، بیشتر بوده (Nelson, 1982; Allen, 1986; Sánchez-Díaz and Pizarro, 1994; Wu and Xia, 2006). تایج سایر آزمایش های انجام شده نشان داده است که تحمل به تنش در ذرت (Sylvia. et al., 1993; Subramanian (Bryla and, Duniway 1997) et al., 1995)، گندم (Tobar et al., 1998)، کاهو (Azco'n and Tobar, 1998) و سایر گونه هایی گیاهی (Ague, 2001) تلقیح شده با میکوریزا افزایش یافت. افزایش مقاومت به خشکی و جریان آب به داخل گیاه میزان از طریق چندین روش شامل: افزایش میزان جذب و انتقال آب به وسیله هیف های قارچ (Safir, 1972; Davies, 1992) باز و بسته شدن روزنه ها در واکنش به هورمون های ترشح شده از میکوریزا (Drüge; 1992; Goicoechea, 1995; Duan, 1996) کاهش پتانسیل اسمزی برگ جهت حفظ فشار آماس (Davies, 1993)، تغییر در میزان فتوستنت و متabolیسم (Subramanian, 1995) و تنظیم اسمزی برگ کاهش پتانسیل اسمزی برگ جهت حفظ فشار آماس (Wu and Xia, 2006) صورت گرفت. در آزمایش حاضر میزان آلودگی ریشه آفتباگر دان با گلوموس

منابع مورد استفاده

References

- Ague, R.M. 2001.** water relations, drought and vesicular-arbuscular mycorrhizal symbiosis. Mycorrhiza. 11, 3-42.
- Allen, E.B., M. F. Allen. 1986.** Water relations of xeric grasses in the field : Interactions of mycorrhizas and competition, New Phytol. 104, 559–571.
- Al-Karaki, G.N and R. B. Clark. 1999.** Varied rates of mycorrhizal inoculums on growth and nutrient acquisition by barley grown with drought stress. J. Plant Nutr. 22, 1775–1784.
- Alza, J.O. 1995.** Resistencia a sequia e interaccion genotipo-ambiente en girasol bajo condiciones ambientales condistinta disponibilidad de agua. Estudios geneticos de estabilidad. Tesis de doctorado. Escuela tecnica superior de ingenieros agronomos y de montes. Departamento de genetica. Universidad de Cordoba,Espana.
- Anonymous. 2001.** The objectives of conservation tillage: fewer trips, more rest soil and increased profitability. Monsanto Company. Available on the WWW.farmsource.com/Con_Till/contill-pl-objectives.asp
- Auge, R.M. 2004.** Arbuscular mycorrhizae and soil/plant water relations. Can. J. Soil Sci. 84, 373–381.
- Azcon, R., M. Go'mez. R. Tobar. 1996.** Physiological and nutritional responses by *Lactuca sativa* L. to nitrogen sources and mycorrhizal fungi under drought conditions. Biol. Fertil. Soil 22, 156–161.
- Azcon, R. and R. M. Tobar. 1998.** Activity of nitrate reductase and glutamine synthetase in root and shoot of mycorrhizal *Allium cepa*. Effect of drought stress. Plant Sci. 33:1–8.
- Baldini, M., F. Cecconi, G. P. Vanozzi and A. Benvenuti. 1998.** Effect of drought on yield reduction in different sunflower hybrids. Helia 14:71-76.
- Bryla, D.R. and J. M. Duniway. 1997.** Growth, phosphorous uptake, and water relations of safflower and wheat infected with an arbuscular mycorrhizal fungus. New Phytol. 136, 581–590.
- Cantagallo, J.E., C. A. Chimenti. A. J. Hall. 1997.** Number of seeds per unit area in sunflower correlates well with a photothermal quotient, Crop Sci. 37, 1780–1786.
- Clark, R. B. and S. K. Zeto. 2000.** Mineral acquisition by arbescular mycorrhizal plants. Journal of Plant Nutr. 23:876-902.
- Chalk, P. M., R. Souza. S, DeF. Urquiaga, B. J. R. Alves. And R. M. Boddey. 2006.** The role of arbuscular mycorrhiza in legume symbiotic performance. Soil Biology & Biochemistry 47 487-499.
- Chimenti, C.A., A. J. Hall. 1992.** Sensibilidad del número de frutos por capítulo de girasol (*Helianthus annuus* L.) a cambios en el nivel de radiación durante la ontogenia del cultivo, in: Actas XIX Reunión Argentina de Fisiología Vegetal. Sociedad Argentina de Fisiología Vegetal, Córdoba, Argentina, pp. 27–28.
- Connor, D.J., V.O. Sadras. 1992.** Physiology of yield expression in sunflower, Field Crops Res. 30, 333–389.
- Davies, F.T., J. R. Potter Jr. and R. G. Linderman. 1992.** Mycorrhiza and repeated drought exposure resistance affect drought resistance and extraradical hyphae development on pepper plants independent of

- plant size and nutrient content, J. Plant Physiol. 139, 289–294.
- Davies, F.T., J. R. Potter Jr. and R. G. Linderman. 1993.** Drought resistance of mycorrhizal pepper plants independent of leaf concentration response in gas exchange and water relations. Plant Physiol. 87, 45–53.
- Davies, F.T., V. Olalde-Portugal. L. Aguilera-Gomez, M. J. Alvarado. R. C. Ferrera –Cerrato. and T. W. Boutton. 2002.** Alleviation of drought stress of Chile ancho pepper (*Capsicum annuum* L. cv. San Luis) with arbuscular mycorrhiza indigenous to Mexico. Sci. Hortic. 92, 347–359.
- Dixon, R. K., M. V. Rao. V. K.Garg. 1994.** water relation and gas exchange of mycorrhizal *leucaena leucocephala* seedlings. J. of Trop. Forest Sci. 6, 542-552
- Drüge, U. and F. Schönbeck. 1992.** Effect of vesiculararbuscular mycorrhizal infection on transpiration, photosynthesis and growth of flax (*Linum usitatissimum* L.) in relation to cytokinin levels, J. Plant, Physiol. 141,40–48.
- Duan, X., D. S. Neuman, J. M.Reiber. C. D. Green, A. M. Saxton. and R. M. Augé. 1996.** Mycorrhizal influence on hydraulic and hormonal factors implicated in the control of stomatal conductance during drought, J. Exp. Bot. 47,1541–1550.
- Faber, B.A., R. J. Zasoske., D. N. Munns. and A. Shackellk. 1991.** Method for measuring hyphal nutrion and water uptake in mycorrhizal plants. Can. J. Bot. 69,87-94.
- Fereres, E., C. Gimenez. J. M. Fernandez. 1986.** Genetic variability in sunflower cultivars under drought. I. Yield reletationships. Aust. J. of Agric. Res. 37,573-582.
- Fitter, A. H. 1988.** Water relations of red clover *Trifolium pratense* L. as affected by VA mycorrhizal infection and phosphorus supply before and during drought. J. Expt. Bot. 39, 595–603.
- Giovanetti, M., B. Mosse. 1980.** An evaluation of techniques for measuring vesicular–arbuscular micorrhizal infections in roots. New Phytol. 84, 489–500.
- Goicoechea, N., K. Dolézal, M. C .Antolín. M. Strnad. and M. Sánchezdíaz. 1995.** Influence of mycorrhizae and *Rhizobium* on cytokinin content in drought-stressed alfalfa, J. Exp. Bot. 46,1543–1549.
- Jeffries, P. 1987.**Use of mycorrhizae in agriculture, Crit. Rev. Biotechnol. 5,319–357.
- Karimzade Asl, KH., D. Mazaheri and S. A. Pieghambari. 2003.** Effect of four irrigation intervals on seed yield and quality characteristics of three sunflower cultivars. J of Agric of Sci. 24(2). 293-300.(In Persian with English abstract).
- Kesteloot, J. A., J. Heursel. and F. M. Pauwels. 1985.** Estimation of heritability and genetic variation in sunflower(*Helianthus annuus* L.). Helia. 8, 17-20.
- Khalvati, M.A., Y. HU. Mozafar. and U. Schmidhalter. 2005.** Quantification of water uptake by arbuscular mycorrhiza hyphae and its significance for leaf growth, water relations, and gas exchange of barley subjected to drought stress. Plant Boil.7, 706-712.
- Kothari, S.K., H. Marschner. V. Romheld. 1990.** Direct and indirect effects of VA mycorrhizal fungi and

- rhizosphere microorganisms on acquisition of mineral nutrients by maize (*Zea mays* L.) in a calcareous soil, New Phytol. 116, 637–645.
- Marschner, H. and B. Dell. 1994.** Nutrient uptake in mycorrhizal symbiosis. Plant and Soil. 159(1), 89-102.
- Merrien, A. 1992.** Some aspect of sunflower crop physiology.IN: Proc. of 13th Int.Sunflower Conf., Vol. I. Pisa, Italy, pp. 481-498.
- Morte, A., C. Lovisolo. and A. Schubert. 2000.** Effect of drought stress on growth and water relation of mycorrhizal associationhelianthemun almeriense-terfezia claveryi. Mycorrhiza 10,115-119.
- Nelson, C.E. and G. R. Safir. 1982.** The water relations of well watered, mycorrhizal and non-mycorrhizal onion plants, J. Am. Soc. Hort. Sci. 107,271–274.
- Nye P.H. and P. B. Tinker. 1977.** Solute movement in the soil root system, University of California Press, Berkeley. pp.108-116.
- Philips, D.A., D. S. Hayman. 1970.** Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular– arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Trans. Br. Mycol. Soc. 55, 158–161.
- Porcel, R. and J. M. Ruiz-lozano. 2004.** Arbuscular mycorrhiza influence on leaf water potential, solute accumulation and oxidative stress in soybean plants subjected to drought stress. J lof Exp. Bot. 55, 1743-1750.
- Safir, G.R., J. S. Boyer. and J. W. Gerdemann. 1972.** Nutrient status and mycorrhizal enhancement of water transport in soybean, Plant Physiol. 49,700–703.
- Sánchez-Díaz, M. and M. Honrubia. 1994.** Water relations and alleviation of drought stress in mycorrhizal plants, in: Gianinazzi S., Schüepp H. (Eds.), Impact of arbuscular mycorrhizas on sustainable agriculture and natural ecosystems, Birkhäuser Verlag, Basel, pp. 167–178.
- Shabana, R. 1974.** Genetic variability of sunflower varieties and inbered lines. Proc. of 6th International Sunflower Conference.Bucharest.Romania.pp.263-269.
- Smith, S.E. and D. J. Read. 1997.** Mycorrhizal Symbiosis. Academic Press, London. Pp. 325.
- Subramanian, K.S. and C. Charest. 1995.** Influence of arbuscular mycorrhizae on the metabolism of maize under drought stress, Mycorrhiza 5, 273–278.
- Subramanian, K.S., C. Charest. L. M. Dwyer. R. I. Hamilton. 1997.** Effects of mycorrhizas on leaf water potential, sugar and P contents during and after recovery of maize. Can. J. Bot. 75, 1582–1591.
- Subramanian, K.S., C. Charest. 1999.** Acquisition of N by external hyphen of an arbuscular mycorrhizal fungus and its impact on physiological responses in maize under drought-stressed and well-watered conditions. Mycorrhiza 9, 69–75.
- Srivastava, A.K., S. Singh. and R. A. Marathe. 2002.** Organic citrus, soil fertility and plant nutrition. J. Sustain. Agric. 19, 5–29.
- Sylvia, D.M., L. C. Hammond, J. M. Bennet, J. H. Hass. and S. B. Linda. 1993.** Field response of maize to a

VAM fungus and water management. Agron. J. 85, 193–198.

Tobar, R. M., R. Azcon. and J. M. Barea. 1994a. Improved nitrogen uptake and transport from 15N-labelled nitrate by external hyphae of arbuscular mycorrhizae under water-stressed conditions. New Phytol. 126, 119–122.

Tobar, R.M., R. Azcon. J. M. Barea. 1994b. The improvement of plant N acquisition from an ammonium-treated, drought-stressed soil by the fungal symbiont in Arbuscular mycorrhizae. Mycorrhiza 4, 105–108.

Unger, P. W. 1992. Time and frequency if irrigation effects on sunflower production and water use. Soil Sci. Soc. Am. J. 46: 1072-1076.

Von Reichenbach, H. G. and F. Schonbeck. 1995. Influence of VA-mycorrhizaon drought tolerance of flax (*Linum usitatissimum* L). 2. Effect of VA mycorrhiza on stomatal gas exchange, shoot water potential, phosphorus nutrition and the accumulation of stress metabolites. J. Appl. Bot. 69, 183–188.

Vranceanu, V. 1970. Advanced in sunflower breeding in Romania. Proceedings of the 4th International Sunflower Conference. Memphis,Tenn., pp. 136-148.

Wu, Q-S. and R. X. xia. 2006. Arbuscular mycorrhiza fungi influence on growth, osmotic adjustment and photosynthesis of citrus under well watered and water stress conditions, J. Plant of Plant physiol. 4, 417-425.

Effect of Arbuscular mycorrhizal on yield, yield components and plant characteristics of sunflower (*Helianthus annuus* L.) under drought stress conditions

**Jamshidi¹, E., A. Ghalavand², A. Salehi³, M. Javad Zare⁴
and A. R. Jamshidi⁵**

ABSTRACT

Jamshidi, E. A. Ghalavnd, A. Salahi, M. G. Zare and A. R. Jamshidi. 2009. Effect of Arbuscular mycorrhizal on yield, yield components and plant characteristics of sunflower (*Helianthus annuus* L.) under drought stress conditions. *Iranian Journal of Crop Sciences*. 11 (1):136-150 (In Persian).

Water stress is one of the most important factors limiting growth and production of field crops in arid and semi-arid regions. One approach to increase drought tolerance in crop plants is through the symbiotic effect of the arbuscular mycorrhizal (AM) fungi. Water deficit stress is typical to semi arid environments and most of the crop plants are affected by drought, during the flowering-grain filling periods . To study the symbiotic effect of the arbuscular mycorrhizal (AM) fungi On drought tolerance and some plant characteristics in sunflower, a field experiment was conducted in split plot arrangements using randomized complete blocks with four replications at the Research Field of Tarbiat Modares University, Tehran, Iran in 2006 cropping season. Three soil available soil moisture contents ; 40%(w1), 60% (w2) and 80% (w3) were assigned to main plots and two mycorrhiza species; *Glomus mosseae*, *Glomus hoi* and a non- inoculated traetment were randomized in sub- plots. Results showed that the AM fungi species significantly affected all of measured plant traits, except 1000 seed weight, number of total seed m^{-2} , number of filled seed number per m^{-2} and oil content. However, water stress affected significantly all of measured traits. Water stress \times mycorrhiza interaction was negligible on all studied traits except on grain yield and number of unfilled seed per m^2 and oil yield. Results indicated that the highest and lowest grain yield and dry matter was obtained in available soil moisture content of 80% and inoculation with *G. mosseae* and non-inoculated treatments with 1230 and 990 kg. ha^{-1} of grain yield and 4400 and 3180 kg. ha^{-1} of dry matter, respectivly. Results also revealed that different AM fungi species had significantly diffrent effect on seed yield and root colonization under different soil moisture conditions. Seed yield and seed oil content were higher in well-watered with mycorrhiza and without mycorrhiza . Micorrhiza species affected seed yield of sunflower through their effect on seed weight and filled seed number m^{-2} under well -watered and water stress conditions.

Keywords: Arbuscular mycorrhizal, Sunflower, Yield and yield components and Water stress.

Received:January, 2007

1- PhD. student, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2- Associate Prof., Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (Corresponding author)

3- P. hD. student, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

4- Assist. Prof., The University of Ilam, Ilam, Iran

5- MSc. student, The Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran