

(*Avena ludovicina*)

(*Rapistrum rugosum*)

**Modelling light interception and distribution in mixed canopies of wild oat
(*Avena ludoviciana*) and turnip weed (*Rapistrum rugosum*)
in competition with wheat**

مجتبی حسن‌زاده دلویی^۱، مهدی نصیری محلاتی^۲، قربان نور‌محمدی^۳، حمید رحیمیان مشهدی^۴

) ()
() ()
INTERCOM ()

نور به عنوان مطلوب‌ترین روش برای تعیین میزان نور دریافتی هر گونه محسوب می‌شود (Berkowitz, 1988). در دهه‌های گذشته چندین مدل برای پیش‌بینی رقابت بسیار نور پیشنهاد شده است. مدل‌های فتوستزی نحوه جذب نور و مصرف آن توسط گونه‌های مختلف در کانوپی را بیان می‌کند (Hikosaka et al., 1999). اسپیترز و آئرتز (Spitters & Aerts, 1983) مدلی را پیشنهاد کردند که در آن کانوپی به چندین لایه تقسیم شد و جذب نور توسط هر لایه بر اساس سهم سطح برگ در آن

در شرایط مطلوب مدیریت، که شرایط برای رشد گیاهان مناسب باشد، بیشترین رقابت گیاهان بر سر نور صورت می‌گیرد (Keating & Carberry, 1983). اغلب تفاوت‌های مشاهده شده در عملکرد گونه‌های رقیب در کشت مخلوط ناشی از تفاوت در میزان نور دریافتی و یا کارایی مصرف آن است (Sinoquet et al., 1996). در کانوپی مخلوط، اندازه گیری جذب نور توسط هر گونه، امکان‌پذیر نیست و مدل‌سازی فرایند جذب

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۲/۷/۲۴

تاریخ دریافت: ۱۳۸۱/۱۲/۱۵

۱- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد گناباد ۲- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد ۳- استاد دانشگاه تهران ۴- استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات تهران

دو آزمایش به طور همزمان در سال زراعی ۱۳۷۹-۸۰ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد واقع در ده کیلومتری جنوب شرقی مشهد اجرا شد. هر دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در آزمایش اول فاکتورهای آزمایش شامل: تراکم گندم در سه سطح (۴۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰ بوته در متر مربع) و تراکم یولاف در پنج سطح (صفر، ۲۰، ۴۰، ۸۰، ۱۶۰ بوته در متر مربع) و در آزمایش دوم فاکتورها شامل تراکم گندم در سه سطح (۳۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ بوته در متر مربع) و تراکم شلمی در پنج سطح (صفر، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲ بوته در متر مربع) بود. رقم گندم مورد استفاده در هر دو آزمایش رقم پائیزه C ۷۳-۵ بود. هر دو آزمایش به صورت افزایشی اجرا گردید که در آن تراکم گندم در هرسطح، ثابت و تراکم یولاف و شلمی متغیر بود. کود اوره به میزان ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار (۵۵ کیلوگرم N) و کود فسفات آمونیوم به میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار (۷۲ کیلوگرم P₂O₅) استفاده گردید. کود فسفات آمونیوم قبل از کاشت با خاک مخلوط گردید و کود اوره طی سه نوبت (۱/۳ هنگام کاشت، ۱/۳ هنگام پنجه‌زنی و ۱/۳ موقع ساقه رفتن) استفاده گردید.

بر اساس تراکم مورد نظر و با توجه به وزن هزار دانه، میزان بذر مورد نیاز هر کرت محاسبه و در پاکت‌های جداگانه قرار گرفت. بذور گندم کاشت در تاریخ هشتم آبان ماه توسط کارگر در ردیف‌هایی به فاصله ۲۰ سانتیمتر کشت گردید. بلافاصله پس از کاشت گندم، بذر علف‌های هرز بر اساس تراکم مورد نظر در بین ردیف‌های گندم به طور یکواخت کشت گردید. در مورد یولاف تا حد ممکن سعی گردید تراکم موردنظر در زمان کاشت از طریق تنظیم تعداد بذر (با درنظر گیری درصد جوانه‌زنی) و در مورد شلمی از

لایه محاسبه گردید. در مدل کراف و همکاران (1994) (Kropff et al., 1994) به جای سطح برگ، از سطح برگ مؤثر در جذب نور (حاصل ضرب سطح برگ در یک ضریب توسعه) استفاده شد.

کاربرد مدل‌های جذب نور در کانوپی مخلوط بدون توصیف ساختار کانوپی و تأثیر آن بر جذب نور توسط گونه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست (Lantinga et al., 1999). تفاوت در ساختار کانوپی و تأثیر آن بر جذب نور یکی از عوامل مهم در رقابت گندم با علف‌های هرز گزارش شده است (Caldwell, 1987; Beyschlag et al., 1988) مطالعات انجام شده بر روی رقابت علف‌های هرز با گندم از مدل‌های رگرسیونی Cousense, 1985; Cousense, 1987 استفاده شده است (Cousense et al., 1991; Kropff, 1988; مذکور هیچ ایده‌ای از مکانیزم رقابت ارائه نمی‌دهند و از طرفی ضرایب رگرسیونی تحت تأثیر عوامل مختلف شدیداً تغییر می‌کنند. مدل‌های شبیه‌سازی با در نظر گیری مکانیزم رقابت و توجه به عوامل مهمی نظری زمان رقابت ابزار بسیار مناسبی برای مطالعه رقابت در جوامع گیاهی هستند (Kropff et al., 1992). با وجودی که کاهش عملکرد ناشی از رقابت گونه‌های مختلف علف هرز با گیاهان زراعی توسط مدل‌های رگرسیونی در سطح وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته است ولی اطلاعات موجود در مورد مکانیزم این فرایند به ویژه از نظر تفاوت‌های مرغولوژیکی و ساختاری گونه‌های پهن برگ و باریک برگ علف هرز به درستی شناخته نشده است. این تحقیق به منظور شبیه‌سازی نور دریافتی توسط دو گونه علف هرز باریک برگ یولاف وحشی (*Avena ludoviciana*) و پهن برگ شلمی (*Rapistrum rugosum*) در رقابت با گندم صورت گرفت تا میزان نور دریافتی هر گونه و عوامل مؤثر بر آن تعیین گردد.

: (Goudriaan, 1986)

معادله ۲

$$\rho = \left[\left(1 - \sqrt{1 - \sigma} \right) / \left(1 + \sqrt{1 - \sigma} \right) \right] \times \left[2 / (1 + 1.6 \sin \beta) \right]$$

که در آن:

σ ضریب انتشار تک برگ‌ها برای تشعشع قبل رویت و مقدار آن برای اغلب گونه‌های زراعی حدود ۰/۲ است
β ارتفاع خورشیدی

معادله (۱) برای کشت خالص مناسب است اما در کشت مخلوط که بیش از یک گونه در حال رقابت است و گونه‌ها دارای ارتفاع‌های مختلف هستند باید سطح برگ تجمعی هر گونه در بالای یک ارتفاع مشخص به طور جداگانه محاسبه گردد. در این حالت

معادله (۱) به صورت زیر خواهد بود:

$$I_h = (1 - \rho) I_0 \exp(-\sum K_i L_{h,i})$$

معادله ۳

که در آن:

$L_{h,i}$ شاخص سطح برگ تجمعی (به سمت پایین) گونه i در هر ارتفاع از کانوپی
 K_i ضریب خاموشی گونه i (مترمربع زمین بر مترمربع برگ)

سطح برگ تجمعی هر گونه بر اساس رابطه بین تراکم سطح برگ و ارتفاع گیاه محاسبه می‌شود. تراکم سطح برگ یا LAD (Leaf Area Density) نشان‌دهنده سطح برگ پیرامون یک نقطه خاص از ارتفاع کانوپی است (مترمربع برگ بر مترمربع زمین بر ارتفاع).

LAD در مدل‌های مختلف برای محاسبه پروفیل و جذب نور توسط گونه‌های مخلوط استفاده شده است (Spitters & Aerts, 1983; Kropff et al., 1993). در مدل‌های مختلف توابع متفاوتی برای توزیع سطح برگ در طول کانوپی در نظر گرفته شده است. کراف و INTERCOM (Kropff et al., 1993) در مدل همکاران (Kropff et al., 1993) توسعه سطح برگ در کانوپی را به صورت سهمی در نظر گرفتند. در تابع سهمی فرض بر این است که حداقل سطح برگ هر گونه در ۵۰ درصد ارتفاع حاصل می‌شود.

طریق تنک کردن، اعمال گردد. به منظور بررسی روند رشد و تعیین شاخص‌های رشدی از اواخر پنجه‌زنی گندم (۱۲۵ روز پس از کاشت) تا پایان رشد، هر دو هفته یکبار نمونه‌برداری انجام شد به این منظور در هر کرت بوته‌ها در سطح ۰/۱ متر مربع با استفاده از یک کوادرات (۵۰ × ۵۰) برداشت گردید. در هر بار نمونه‌برداری، گیاهان با ریشه از خاک خارج و پس از شستشو، تعداد گیاهان به تفکیک شمارش و ارتفاع، سطح برگ و وزن خشک نمونه‌ها تعیین گردید. در چهارمین نمونه‌برداری (۱۸۰ روز پس از کاشت) توزیع عمودی سطح برگ گونه‌ها با اندازه گیری شاخص سطح برگ در پنج لایه با ضخامت ۲۵ سانتیمتر (۰-۲۵، ۲۵-۵۰، ۵۰-۷۵، ۷۵-۱۰۰ و ۱۰۰-۱۲۵ سانتیمتر) اندازه گیری شد. به این منظور گیاهان در هر نمونه به لایه‌های ۲۵ سانتیمتری تقسیم گردید و برگ‌های موجود در هر لایه تفکیک شدند و سطح برگ‌ها تعیین گردید. به منظور بررسی توزیع نور در کانوپی در ۱۸۰ روز پس از کاشت، میزان نور در قسمت بالا و پایین لایه‌های مختلف کانوپی اندازه گیری شد.

درون یک کانوپی، تشعشع از بالا به سمت پایین به صورت نمایی بر اساس معادله زیر کاوش می‌یابد:

$$I_h = (1 - \rho) I_0 \exp(-KL)$$

که در آن:

I_h میزان تشعشع PAR (خالص) در ارتفاع h کانوپی (از سطح گیاه) بر حسب ژول بر مترمربع زمین در ثانیه
 I_0 میزان تشعشع در بالای کانوپی (ژول بر مترمربع زمین در ثانیه)

L شاخص سطح برگ تجمعی از بالا به پایین کانوپی (مترمربع برگ بر مترمربع زمین)

ρ ضریب انعکاس نور در کانوپی

K ضریب خاموشی نور (مترمربع زمین بر مترمربع برگ)
ضریب انعکاس نور در کانوپی بر اساس ضریب انتشار تک برگ‌ها (۵) به شکل زیر محاسبه می‌شود

$L_{h,i}$ شاخص سطح برگ تجمعی گونه i در ارتفاع h
 L_i شاخص سطح برگ کل گونه i
 h_i ارتفاع موردنظر در کانوپی
 H ارتفاع کل گونه i ,
 h_m ارتفاعی که در آن حداکثر LAD دیده شده است
با قرار دادن شاخص سطح برگ تجمعی ($L_{h,i}$) در معادله ۳ می‌توان مقدار تشبع PAR را در هر ارتفاع از کانوپی مخلوط محاسبه کرد.

به منظور تعیین اعتبار مدل، داده‌های جمع‌آوری شده در طول آزمایش با داده‌های ارائه شده توسط مدل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت، نتایج نشان داد که تابع مثلثی تراکم سطح برگ در مورد گونه‌های مورد بررسی مناسب بوده و در تمام موارد پیشگوئی مناسبی از داده‌های واقعی ارائه کرده است. (شکل‌های ۱ و ۲) حداکثر LAD_m از LAD_{d,m} (LAD_m) گندم در رقابت با یولاف بیشتر بالاتر بود. مقدار LAD_m گندم در رقابت با شلمی بود. این امر می‌تواند یکی از دلایل بالاتر بودن قدرت رقابت شلمی نسبت به یولاف باشد. حداکثر LAD گندم در رقابت با یولاف در ارتفاع ۳۶ سانتیمتری (۴۵ درصد ارتفاع کل) و در رقابت با شلمی در ارتفاع ۴۵ سانتیمتری (۵۰ درصد ارتفاع کل) مشاهده گردید. حداکثر LAD یولاف و شلمی به ترتیب در ارتفاع ۶۲ سانتیمتری (۶۰ درصد ارتفاع کل) و ۶۵ سانتیمتری (۵۵ درصد ارتفاع کل) مشاهده گردید. بارنز و همکاران (Barnes et al., 1990) گزارش کردند با گذشت زمان نسبت برگ‌های نیمه‌فوقانی گندم در رقابت با یولاف از ۵۹ به ۳ درصد کاهش یافت و علت این امر را تجمع برگ‌های یولاف در لایه‌های فوقانی کانوپی ذکر کردند. مقایسه مقادیر LAD در

در کشت مخلوط اغلب گونه‌ها توزیع سطح برگ سهمی نیست به عنوان مثال در کشت مخلوط شبدر با گراس، شبدر در قسمت فوقانی کانوپی بخش بیشتری از سطح برگ را دارا است (Nassiri & Elgersma, 1996). یولاف وحشی و شلمی نیز در لایه‌های فوقانی کانوپی سطح برگ بیشتری نسبت به گندم دارا هستند (حسین نیا، ۱۳۷۹، حسن زاده و همکاران ۱۳۸۱) و بنابراین توزیع سطح برگ به صورت سهمی نیست به این دلیل در این آزمایش به جای تابع سهمی LAD از تابع مثلثی (Pereira & Shaw, 1980; Nassiri & Elgersma, 1998)

به شکل زیر استفاده گردید:
معادله ۴ (الف)

$$LAD,h = Ld,m \frac{(H - h)}{(H - hm)} \quad hm \leq h \leq H$$

$$LAD,h = Ld,m \frac{h}{hm} \quad 0 \leq h \leq hm$$

که در آن:

LAD_h تراکم سطح برگ در ارتفاع h (m²/m³)
LAD_{max} حداکثر تراکم سطح برگ (m²/m³)
 h_m ارتفاعی که در آن حداکثر LAD دیده شده است (سانتیمتر)

H ارتفاع کل کانوپی
برای محاسبه L_{d,m} می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد:
معادله ۵

$$L_{d,m} = \frac{2LAI}{H}$$


پس از محاسبه LAD بر اساس روابط بالا می‌توان شاخص سطح برگ تجمعی (به سمت پایین) هر گونه i را در هر ارتفاع از کانوپی به شرح زیر محاسبه کرد:

$$L_{h,i} = \begin{cases} \left(1 - \left(\frac{hi}{Hi} \right) \right) Li & hm, i \leq hi \leq Hi \\ 1 - \left(\frac{hm,i}{Hi} \right) Li & \end{cases}$$

معادله ۶ (الف)


$$L_{h,i} = \begin{cases} 1 - \frac{(hi)}{(Hi \times hm,i)} Li & 0 \leq hi \leq hm, i \\ \end{cases}$$

که در آن:




نمودار ۱- توزیع عمودی سطح برگ گندم و یولاف در ۱۸۰ روز پس از کاشت در تراکم‌های ۳۰۰(A)، ۴۵۰(B) و ۶۰۰(C) بوته گندم در مترمربع در بالاترین تراکم یولاف (160 p/m^2)

Fig.1. Vertical distribution of wheat and wild oat leaf area density (LAD) in 180 days after planting in 300(A), 450(B), 600(C) wheat and 160 wild oat plants / m^2




نمودار ۲- توزیع عمودی سطح برگ گندم و شلمی در ۱۸۰ روز پس از کاشت در تراکم های ۳۰۰(A)، ۴۵۰(B) و ۶۰۰(C) بوته گندم در متر مربع در بالاترین تراکم شلمی ($32 p/m^2$)

Fig. 2. Vertical distribution of wheat and turnip weed leaf area density(LAD) in 180 days after planting in 300(A), 450(B),600(C) wheat and 32 turnipt weed plants / m^2



نمودار ۳- خاموشی نور در کانوپی مخلوط گندم و یولاف (سمت چپ)، گندم و شلمی (سمت راست) در تراکم‌های ۳۰۰(A)، ۴۵۰(B) و ۶۰۰(C) بوته گندم در مترمربع در بالاترین تراکم علف هرز

Fig. 3. Light extinction in mixture of wheat and wild oat (left), wheat and turnip weed (right) in 300(A), 450(B), 600(C) wheat plants /m² at highest density of weeds



نمودار ۴ - شبیه‌سازی درصد تشعشع جذب شده به ازی هر سانتیمتر ارتفاع کانونی در ۱۸۰ روز پس از کاشت در تراکم‌های ۳۰۰(A)، ۴۵۰(B) و ۶۰۰(C) بوته گندم در مترمربع در بالاترین تراکم علف‌های هرز

Fig. 4. Simulated absorbed PAR per cm height in 180 days after planting in 300(A), 450(B), 600(C) wheat plants/ m² in highest density of weeds

جدول ۱- حالت‌های مورد استفاده در آنالیز حساسیت مدل و نتایج حاصل در مورد درصد نور جذب شده توسط هر گونه

Fig. 1. Conditions used for the sensitivity analysis and corresponding results for absorbed PAR by each species

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LAI ₁	2.5	2.75	3	3.25	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
LAI ₂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
H ₁	80	80	80	80	88	96	104	80	80	80	80	80	80
H ₂	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
H _{m1}	40	40	40	40	40	40	40	44	48	52	40	40	40
H _{m2}	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
K ₁	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.54	0.48	0.42
K ₂	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
PAR ₁	0.45	0.47	0.49	0.51	0.48	0.51	0.53	0.46	0.48	0.49	0.47	0.49	0.51
PAR ₂	0.45	0.43	0.41	0.39	0.41	0.39	0.36	0.43	0.42	0.40	0.43	0.41	0.39

LAI: شاخص سطح برگ - H_m: ارتفاعی که در آن حداقل تراکم سطح برگ دیده شده - H: ارتفاع - K: ضریب خاموشی - PAR: نسبت تشعشع جذب شده برای گونه ۱ (گندم) و گونه ۲ (علف هرز)

LAI: Leaf area index-H_m: Height of maximum LAD-H: Height-K: Extinction coefficient-PAR: Ratio of absorbed PAR between wheat and weeds for species 1(wheat), 2 (weeds)

برای هر گونه ثابت فرض گردید. ضریب خاموشی گندم برابر با ۰/۶ (Spitters et al., 1989) و ضریب خاموشی یولاف ۰/۵ و ضریب خاموشی شلمی ۰/۷ در نظر گرفته شد مونتیس (1969) ضریب استهلاک گونه‌های برگ عمودی (تک لپه) را بین ۰/۴-۰/۷ و گونه‌های برگ افقی (دو لپه) را بین ۰/۶۵-۱/۱ گزارش کرد.

پروفیل عمومی جذب نورشیبه سازی شده در گونه‌ها (شکل ۱) بیانگرآئست که در همه تراکم‌های گندم جذب نور توسط علف‌های هرز بیش از گندم است هرچند با افزایش تراکم گندم، سهم گندم در جذب نور افزایش می‌یابد. از طرفی مقایسه میزان جذب نور گندم در رقابت با شلمی و یولاف مؤید آئست که گندم در رقابت با شلمی سهم کمتری از نور را جذب می‌کند و ۳۲ بوته شلمی در متر مربع تأثیر بیشتری از ۱۶۰ بوته یولاف دارد. این اختلاف را می‌توان با توجه به بیشتر بودن سطح برگ نسبی شلمی نسبت به یولاف توجیه کرد.

تراکم‌های مختلف نشان داد که ارتفاعی که در آن حد اکثر LAD مشاهده می‌شود (h_m) تحت تأثیر تراکم قرار می‌گیرد و با افزایش تراکم گندم مقدار آن افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد که با افزایش تراکم، رقابت بر سر نور افزایش یافته و این امر نه تنها ارتفاع را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه بر الگوی توزیع سطح برگ در طول کانوپی نیز تأثیر می‌گذارد

به منظور تعیین اعتبار مدل علاوه بر سطح برگ، از تشعشع جذب شده توسط کانوپی مخلوط نیز استفاده گردید به این منظور با استفاده از مدل، تشعشع جذب شده توسط کانوپی مخلوط برای هر تراکم گندم شبیه‌سازی شد، در مورد هر دو علف هرز بالاترین تراکم به کار رفته در آزمایش گردید، سپس مقادیر واقعی اندازه‌گیری شده تشعشع با مقادیر پیش‌گوئی شده توسط مدل مقایسه شد نتایج نشان داد که در کلیه موارد، مدل برآورد مناسبی از داده‌های واقعی ارائه کرده است (شکل ۳). در این مدل ضریب خاموشی

برگ بیشتر و ضریب استهلاک کمتری داشته و یا در لایه‌های فوکانی کانوپی تراکم سطح برگ بیشتری داشته باشد قادر به جذب نور بیشتری بوده و قابلیت رقابت بالاتری خواهد داشت. برتری ارتفاع یولاف و شلمی و تمرکز بیشتر سطح برگ هر دو علف هرز در لایه‌های فوکانی کانوپی نسبت به گندم از علل مهم برتری رقابتی این دو گونه نسبت به گندم گزارش شده است. (حسن زاده و همکاران Henson & Jordan, 1982; Araus & Tapia, 1981؛ ۱۳۸۱ Cudney et al., 1991; Cousense, 1994).

نتایج نشان داد که مدل Intercom پس از اصلاحات انجام شده، توانایی مطلوبی در شبیه‌سازی جذب و توزیع نور در کانوپی مخلوط گندم با علف‌های هرز پهن برگ و باریک برگ دارد. آنالیز انجام شده توسط مدل نیز امکان تعیین حساسیت میزان نور جذب شده توسط گونه‌های رابه و رویدی‌های مدل فراهم ساخت بنابراین مدل ارائه شده در این مقاله ابزار مناسبی جهت مطالعه مکانیزم رقابت برای نور و نیز طراحی تیپ ایده‌آل گندم جهت رقابت با علف‌های هرز خواهد بود.

به منظور بررسی میزان حساسیت مدل نسبت به هر یک از پارامترهای مؤثر در آن، شاخص سطح برگ، ارتفاعی که در آن حداکثر تراکم سطح برگ قرار دارد (h_m) و ضریب خاموشی (K) هر گونه بین ۵ تا ۳۰ درصد تغییر داده شد و در هر حالت میزان جذب نور هر گونه توسط مدل تعیین گردید (جدول ۱). در حالت ۱ مقادیر پارامترها برای هر دو گونه یکسان و مقدار h_m نیز در نیمه کانوپی (توزیع سهمی) در نظر گرفته شد.

در این شرایط نور جذب شده توسط هر دو گونه مساوی بود، در بین پارامترهای مورد بررسی، تغییر ارتفاع بیشترین تأثیر را بر جذب نور داشت به طوری که درصد افزایش ارتفاع گندم (حالت ۷) جذب نور این گونه را به میزان ۱۸ درصد نسبت به حالت ۱ و ۱۷ درصد نسبت به علف هرز افزایش داد. در حالی که درصد افزایش شاخص سطح برگ (حالت ۴) و h_m (حالت ۱۰) و یا همین مقدار کاهش در ضریب خاموشی (حالت ۱۳) به ترتیب سبب ۱۳، ۱۲ و ۹ درصد افزایش در جذب نور نسبت به حالت یک و ۱۱ درصد افزایش در جذب نور نسبت به علف هرز گردید. بنابراین هر گونه‌ای که ارتفاع بیشتر، سطح

References

- حسن زاده دل‌وی. م، م. نصیری محلاتی. ق. نورمحمدی. ۱۳۸۱. بررسی اثرات رقابتی یولاف وحشی در تراکم‌های مختلف. مجله علوم زراعی ایران. جلد چهارم، شماره ۲، ۱۳۸۱.
- حسین نیا، ع. ۱۳۷۹. بررسی اثرات رقابت سه گونه علف هرز پهن برگ خانواده شببو با گندم پائیزه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
- Araus, J.L. and L.Tapia. 1987. Photosynthetic gas exchange characteristics of wheat flag leaf and sheats during grain filling. Plant Physiol 85: 667-673.
- Barnes, P.W, W. Beyschlag, R. Ryel, S.D. Flint and M.M.Caldwell. 1990. Plant competition for light analyzed with a multispecies canopy model.III. Influence of canopy structure in mixtures and monocultures of wheat

- and wild oat.*Oecologia* **82**: 560-566.
- Berkowitz, A.R.1988. Competition for resource in weed crop mixtures.In “Weed management in agroecosystems: Ecological approaches” Altieri, M.A, M. Libman (eds.) .CRC Press Boca Raton F1.
- Beyschlag, W, P.W.Barnes, S.D.Flint and M.M.Caldwell.1988. Enhanced UV-B irradiation has no effect on photosynthetic characteristics of wheat and wild oat under greenhouse and field condition.*Photosynthetica* **22**: 516-525.
- Caldwell, M.M.1987. Plant architecture and resource competition in: Schulze E-D, H. Zwölfer, Ecological studies vol **61**: Springer Berlin Heidelberg. New York. pp. 166-179.
- Cousens, R.1985. An emperical model relating crop yield to weed and crop density and a statical comparison with other models. *J. of Agric. Sci.* **105**: 513-521.
- Cousens, R.1987. Theory and reality of weed control thresholds.*Plant Protection Quarterly* **2**(1), 13-20.
- Cousens, R, S.E.Weaver, T.D.Martin, A.M.Blair and J.Wilson.1991.Dynamics of competition between wild oats (*Avena fatua*) and winter cereals.*Weed Res.* **31**: 205-210.
- Cousens, R, G.Arms and R.Baweja.1994. Germination of *Rapistrum rugosum* L.All.From New South Wales, Australia.*Weed Res.* **34**: 127-135.
- Cudney, D.W, L.S. Jordan and A.E. Hall.1991. Effect of wild oat (*Avena fatua*) infestation on light interception and growth rate of wheat.*Weed Sci.* **39**: 175-179.
- Goudriaan, J. 1986. A simple and fast numerical method for the computation of daily totals of canopy photosynthesis. *Agric. Forest.Meteorol.* **43**: 251-255.
- Henson, J.F. and L.S. Jordan. 1982. Wild oat competition with wheat for nitrate.*Weed Sci.* **30**: 297-300.
- Hikosaka, K., S. Sudoh and T. Hirose.1999. Light acquisition and use of individuals competition in a dense stand of an annual herb, *Xanthium canadense*. *Oecologia* **118**: 388-396.
- Keating, B.A. and P.S.Carberry. 1983. Resource capture and use in intercropping: Solar radiation.*Field Crops Res.* **34**: 273-301.
- Kropff, M.J. 1988. Modelling the effect of weeds on crop production.*Weed Res.* **28**: 465-471.
- Kropff, M.J, S.E.Weaver and M.A. Smits. 1992. Use of ecophysiological models for crop-weed interference: Relation amongst weed density, relative time of weed emergence, relative leaf area, and yield loss.*Weed Sci.* **40**: 296-301.
- Kropff, M.J., H.H.Van Laar and H.F.M. Berge (eds).1993. ORYZAI: A basic model for irrigated lowland rice production. International Rice Research Insritute, Los Banos, Philippines 89 pp.
- Kropff, M.J, H.H.Vanlaar and R.B. Mathewes.1994 (eds). ORYZAI, an eco-physiological model for irrigated rice production. Proc. SARP Research September, 1994, 110 pp.
- Lantinga, E.A, M. Nassiri and M.J. Kropff. 1999. Modelling and measuring vertical light absorption within grass-clover mixtures. *Agric. Fores. Meteorology*. **96**: 71-83.

- Monteith, J.L. 1969. Light interception and radiative exchange in crop stands. In: Eastin, J.D., F.A.Haskins, C.Y.Sullivan and C.H.M.Bavel. (eds) *Physiological Aspects of Crop Yield*.American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Madison, Wisconsin, U.S.A., pp. 89-111.
- Nassiri, M and E.A.Elgersma.1996. Vertical distribution of leaf area, dry matter and radiation in grass-clover mixtures. In: Parente, G, Frame, J, Orsi, S. (eds).*Grassland and land use systems*.Proc.16th meeting of the European Grassland Federation,vol 1 pp. 269-274.
- Nassiri, M. and A.Elgersma.1998. Competition in perennial ryegrass-white clover mixtures. II. Leaf characteristics, light interception and dry matter production during regrowth .*Grass.Forage.Sci.* **53**:367-379.
- Pereira, A.R. and R.H. Shaw. 1980. A numerical experiment on the mean wind structure inside canopies of vegetation. *Agric. Meteorol* **22**: 3030-318.
- Sinoquet, H., M.Bruno, F. Gastal, R. Bonhomme. and C. Varlet-Grancher.1996. Modelling the radiative balance of the component of a well mixed canopy: application to a white clover-tall fescue mixture.*Acta Oecologia* **11**: 469-478.
- Spitters, C.J.T and R.Aerts.1983.Simulation of competition for light and water in crop-weed associations.*Aspects of Applied Biology* **4**: 467-484.
- Spitters, C.J.T., H. Van Keulen and D.W.G. Van Kralingen.1989. A simple and universal crop growth simulator: SUCROS87.In:Rabbinge, R., Ward, S.A. and Vanlarr, H.H. (eds) *Simulation and System Management in Crop Protection. Simulation Monographs*, Pudoc Wageningen, pp. 147-181.

Modelling light interception and distribution in mixed canopies of wild oat (*Avena ludoviciana*) and turnip weed (*Rapistrum rugosum*) in competition with wheat

**M. Hassan-Zadeh Delouie¹, M. Nassiri-Mahallati², G. Nour-Mohamadi³,
H. Rahimian-Mashadi⁴**

ABSTRACT

In order to simulate light intercepted by wheat and wild oat and turnip weed, two field experiments were conducted in agricultural research station of Mashhad University in 2000-2001. The experiments were carried out as factorial in a Randomized Complete Block design with four replications. In the first experiment, the factors included wheat densities at 3 levels (300, 450 & 600 p/m²) and wild oat densities at 5 levels (0, 20, 40, 80 & 160 p/m²). The factors of the second experiment consisted of the same wheat densities as the first one, and turnip weed densities at 5 levels (0, 4, 8, 16 & 32 p/m²). The INTERCOM model with triangular leaf area density function was used, instead of parabolic function. The results indicated that leaf area distribution around the canopy has a triangular function and the height of maximum leaf area density depends on the weed species, weed and wheat densities. Either weeds intercepted more radiation than wheat in the upper layer of canopy. Sensitivity analysis of model showed that: height, leaf area index, height of maximum leaf area density and light extinction coefficient are important parameters in light interception by each species.

Key words: competition, wild oat, turnip weed, wheat, light, interception modelling

1- Assist. Prof., I.A. Univ. Gonabad, Iran.

2- Assoc. Prof., Ferdousi Univ. Mashad, Iran.

3- Prof., I.A. Univ. Sciences & Research Unit, Tehran, Iran.

4- Prof., Tehran Univ., Tehran, Iran.