

برآورده ترکیب پذیری واثر ژن در لاین‌های ذرت با استفاده از تجزیه لاین \times تست در شرایط تنفس خشکی Estimation of combining ability and gene effect in maize lines using line \times tester analysis under drought stress conditions

سیده فاطمه حسینی^۱، رجب چوکان^۲، محمد رضا بی‌همتا^۳ و عبدالله محمدی^۴

چکیده

حسینی، س. ف.، ر. چوکان، م. ر. بی‌همتا و ع. محمدی. ۱۳۹۲. برآورده ترکیب پذیری واثر ژن در لاین‌های ذرت با استفاده از تجزیه لاین \times تست در شرایط تنفس خشکی. مجله علوم زراعی ایران. ۱۵(۱): ۶۰-۷۰.

به منظور برآورده ترکیب پذیری عمومی و خصوصی و نوع اثر ژن، تعداد ۳۰ لاین متوسطرس و دیررس ذرت با تست‌های K19.K18 MO17 و K19/1 به روش لاین \times تست تلاقی داده شده و ۱۲۰ هیبرید حاصل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (کرج) مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه، ارتفاع بوته، ارتفاع بالل، تعداد دانه در ردیف بالل، تعداد ردیف دانه بالل، عمق دانه و وزن هزار دانه بودند. نتایج تجزیه واریانس در هر دو شرایط آبیاری مطلوب و تنفس خشکی که به صورت ۱۴ روز یک‌بار آبیاری می‌شد، اختلاف معنی‌داری را بین هیبریدها برای تمام صفات مورد بررسی به استثنای تعداد دانه در ردیف بالل در شرایط آبیاری مطلوب نشان داد. معنی‌دار بودن میانگین مربوطات لاین \times تست در هر دو شرایط آبیاری نشان داد که واکنش لاین‌ها با تست‌های مختلف برای داد. نسبت $\sigma_{gca}^2 / \sigma_{sca}^2$ نشان دهنده نقش بیشتر واریانس غیرافزاشی (SCA) نسبت به واریانس افزایشی (GCA) در کنترل صفات مذبور بود. در مجموع هر دو اثر افزایشی و غیرافزاشی در کنترل این صفات نقش داشتند. لاین‌های K3651/2، K47/2-2-1-3-1-1-1-1، K47/2-2-1-4-1-1-1 و K3640/8 در شرایط تنفس خشکی دارای قابلیت ترکیب پذیری عمومی نسبتاً بالایی بودند. ارزیابی ترکیب پذیری خصوصی تلاقی‌ها در شرایط تنفس نشان داد که تلاقی T4 \times L18، T3 \times L30، T2 \times L23، T1 \times L18 دارای بالاترین و T1 \times L7، T3 \times L26 و T4 \times L23 دارای پایین‌ترین ترکیب پذیری خصوصی بودند، بنابراین به نظر می‌رسد که هر دو اثر افزایشی و غیرافزاشی در کنترل این صفات نقش داشتند.

واژه‌های کلیدی: اثر ژن، ترکیب پذیری عمومی، ترکیب پذیری خصوصی، ذرت و لاین \times تست.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۶/۲۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی شماره ۲۰۳-۸۸۰۴ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و پایان نامه نگارنده اول می‌باشد.
۱- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
۲- دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران (مکاتبه کننده)
(پست الکترونیک: r_choukan@yahoo.com)
۳- استاد پردازی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
۴- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

لاین \times تستر که در سال ۱۹۵۷ توسط کمپتوون (Kempthon, 1957) ارائه شد، گسترش روش تاپ-کراس است که در آن بیش از یک تستر به کار برده می‌شود (Sing, 1998). با این روش می‌توان اجزای واریانس ژنتیکی یعنی واریانس افزایشی (σ_A^2) و واریانس غالیت (σ_D^2) را نیز برآورد کرد (Farshadfar, 1997). برای ارزیابی ترکیب‌پذیری، روش‌های مختلف وجود دارد و در صورت زیاد بودن تعداد لاین‌ها کار چندان ساده‌ای نیست. از روش لاین \times تستر خصوصاً برای ارزیابی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی والدین استفاده می‌گردد. برای برآورد اثرات ژن نیز از این روش می‌توان استفاده نمود.

دستیابی به لاین‌های نر عقیم می‌تواند گرده‌افشانی را به صورت اقتصادی کنترل کند. اخیراً در بسیاری از گونه‌های گیاهی بذر هیریدهای F_1 با استفاده از نر عقیمی ایجاد می‌شود (He *et al.*, 2009) برای ارزیابی و تعیین بهترین هیرید بایستی ترکیب‌پذیری عمومی و ترکیب‌پذیری خصوصی را بدست آورد، به این معنی که در تهیه هیریدهای بذر از هر دو واریانس افزایشی و غیرافزایشی استفاده شود (Sing *et al.*, 1998)، در حالی که توانایی ترکیب‌پذیری خصوصی انعکاس اهمیت اثر غیرافزایشی در ترکیب هیریدهای حساس است (Basal and Turgut, 2005).

برآورد قابلیت ترکیب‌پذیری عمومیو خصوصی به اصلاح‌گران کمک می‌کند تا در مورد برنامه‌های اصلاحی و استراتژی‌های گزینش ژنتیک‌ها (De la Vega and Chapman, 1987; Prasad and Sastry, 1987) از ۲۰۰۶ پراساد و ساستری (Shree *et al.*, 1992; Choukan, 1999) این روش برای شناسایی والدین و هیریدهای قابل استفاده در برنامه‌های اصلاحی ذرت استفاده نمودند. پس از معرفی این روش محققان زیادی از آن استفاده کرده و نتایج ارزشمندی به دست آورده‌اند.

هدف از اجرای این آزمایش، برآورد ترکیب‌پذیری

مقدمه

برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌های بهزیادی در جهت بهبود عملکرد گیاهی مستلزم آگاهی از میزان تنوع ژنتیکی، روابط بین صفات، میزان اثر و عمل ژن‌ها روی ظاهر صفات و همچنین میزان توارث پذیری صفات است (Basel and Torgot, 2005) انتخاب روش اصلاحی مناسب برای بهره برداری از پتانسیل ژنتیکی صفات مختلف زراعی در یک گیاه بستگی به نوع عمل ژن‌های کنترل کننده یک صفت و نحوه توارث آنها دارد (Akhtar and Chowdhry, 2006). کومار و گوپتا (Kumar and Gupta, 2003) در تجزیه ژنتیکی صفات تعداد روز تا ظهور گل تاجی، ارتفاع بوته، ارتفاع بلال و عملکرد دانه در اینبرد لاین‌های ذرت دریافتند که اجزای واریانس غالیت و افزایشی نقش مهم و معنی داری در کنترل کلیه صفات به جز عملکرد دانه دارند. نتایج آزمایش اولاًکوجو و او لاوی (Olakojo and Olaoye, 2005) نشان داد که برای ارتفاع بوته در ذرت، اثرات افزایشی ژن نقش مهمی داشت. گارسیا و همکاران (Garcia *et al.*, 2005) نشان دادند که درجه و راثت‌پذیری برای ارتفاع بوته و ارتفاع بلال متعدد می‌باشد.

تجربه لاین \times تستر یک رویکرد مناسب برای تشخیص لاین‌های برتر برای تلاقی صفات مورد نظر می‌باشد. در بسیاری از مطالعات برای تعیین والدین مناسب از قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی (GCA) صفات و برای برآورد تلاقی از قابلیت ترکیب‌پذیری خصوصی (SCA) صفات استفاده می‌شود. اکبر و همکاران (Akbar *et al.*, 2008) نشان دادند که اثرات GCA و SCA برای انتخاب لاین‌ها بسیار حائز اهمیت بوده و اثر GCA در وزن هزار دانه در شرایط دمای بالا غیر معنی دار می‌باشد. برآوردهای ترکیب‌پذیری و واریانس‌های افزایشی و غالیت عمده‌تاً براساس تلاقی‌های دی‌آلل انجام می‌شود، ولی روش تلاقی

۷۵ سانتی متر، با سه بذر در هر کپه کشت و در مرحله سه تا پنج برگی تنک و در هر کپه یک بوته نگهداری شد. پس از تهیه زمین به میزان ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار کود فسفر (P_2O_5) از منبع فسفات آمونیوم و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن (از منبع اوره) استفاده شد. کل کود فسفات و نیمی از کود نیتروژن در زمان کاشت و نیمی دیگر از آن در مرحله هفت برگی به صورت سرک استفاده شد. این تحقیق در دو آزمایش جداگانه با شرایط کاشت یکسان و با آبیاری متفاوت انجام شد، در حالت اول، آبیاری معمول به صورت هفتگی و در آزمایش دوم آبیاری هر ۱۴ روز یکبار انجام شد. در هر آبیاری میزان آب آبیاریبا استفاده از کنتورهای هیدروفلوم اندازه گیری شده و رطوبت خاک تا حد ظرفیت مزرعه رسانده شد. تجزیه آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد (Soltani, 1998).

در ۳۰ لاین ذرت و مطالعه نحوه عمل ژن‌های موثر در تظاهر صفات گیاهی مرتبط با عملکرد دانه بوده است.

مواد و روش‌ها

به منظور برآورده ترکیب پذیری عمومی و خصوصی و نوع اثرات ژن، تعداد ۳۰ لاین خالص با تسترهای K19، MO17 و K18، K19 \times تست مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع ۱۲۰ هیبرید حاصل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (کرج) مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات مورد بررسی شامل عملکرد دانه، عمق دانه، ارتفاع بالا، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد ردیف دانه بالا و تعداد دانه در ردیف بالا بودند. هر هیبرید در یک خط ۳۲ کپه‌ای به فاصله ۸ سانتی متر و فاصله خطوط

جدول ۱ - اسامی لاین‌های ذرت مورد استفاده در آزمایش

Table1. The name of maize lines used in the experiment

No.	Maize lines	No.	Maize lines	No.	Maize lines
1	K166B	11	KLM77007/7-3-1-2-1-2-1-2	21	K1263/14-2
2	A679	12	KLM77020/1-1-2-1-1-1-1	22	K3544/4
3	K3615/2	13	KLM77021/4-1-2-1-2-3-1	23	K3544/3
4	K3640/5	14	KLM76012/1-3-1-1-1-2-1-1	24	K3547/3
5	K3653/2	15	K47/2-2-1-3-1-1-1-1	25	K3615/1
6	K3651/2	16	K47/2-2-1-4-1-1-1-1	26	K3640/2
7	K3547/5	17	K47/2-2-1-19-1-1-1-1	27	K3640/3
8	K3493/1-1	18	K47/2-2-1-21-2-1-1-1	28	K3640/5-1
9	KLM77007/7-2-6-3-1-3-1	19	K47/2-2-1-21-3-1-1-1	29	K3640/6
10	KLM77007/7-3-1-2-1-1-1	20	K48/3-1-2-7-1-1-1-1	30	K3640/8

هیبریدها برای کلیه صفات در هر دو شرایط مشاهده شد که نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی کافی بین تلاقی‌ها از نظر صفات مزبور بود. براساس اطلاعات جدول‌های ۲ و ۳ صفاتی که بین لاین‌ها و تسترهای آنها تفاوت معنی‌دار داشت، نشان دهنده اثرات افزایشی برای کنترل آن صفات بود و تفاوت غیر معنی‌دار بین لاین‌ها و تسترهای در صفات

نتایج و بحث

نتایج تجزیه وایانس، اختلاف معنی‌داری را بین هیبریدها برای تمام صفات مورد بررسی به استثنای تعداد دانه در ردیف در شرایط آبیاری معمول نشان داد (جدول ۲) (برای صفت تعداد دانه در ردیف در شرایط آبیاری معمول به علت غیر معنی‌دار بودن هیبریدها تجزیه لاین \times تست انجام نشد). اختلاف معنی‌دار بین

جدول ۲- تجزیه واریانس لاین × تستر برای صفات گیاهی ذرت در شرایط آبیاری معمول

Table 2. Analysis of variance for line×tester for plant characteristics in normal irrigation condition

SOV	متابع تغییر	درجه آزادی d.f	میانگین مربیات (MS)							
			عملکرد دانه Kernel yield	ارتفاع بوته Plant height	ارتفاع بالال Ear height	تعداد دانه در ردیف بالال Kernel.row ⁻¹	تعداد دانه در ردیف دانه در بالال Kernel row.ear ⁻¹	عمق دانه Kernel depth	وزن هزار دانه 1000 Kernel weight	
Replication	تکرار	2	3.930 ^{ns}	311.34 ^{**}	0.14 ^{ns}	7.2898 ^{ns}	7.952 ^{**}	0.048 ^{ns}	447.35 ^{**}	
Hybrid	هیبرید	119	12.830 ^{**}	656.27 ^{**}	344.78 ^{**}	14.058 ^{**}	1.011 ^{ns}	0.031 ^{**}	2364.0 ^{**}	
Line	لاین	29	11.608 ^{ns}	517.12 ^{ns}	131.41 ^{ns}	18.870 ^{ns}	0.878 ^{ns}	0.04 ^{ns}	2152.3 ^{ns}	
Tester	تستر	3	29.463 ^{ns}	2711.57 ^{**}	1777.07 ^{**}	0.788 ^{ns}	0.713 ^{ns}	0.005 ^{ns}	3315.3 ^{ns}	
Line×Tester	لاین × تستر	87	12.66 ^{**}	631.79 ^{**}	366.52 ^{**}	12.912 [*]	1.066 ^{ns}	0.029 ^{**}	2401.8 ^{**}	
Error	خطا	238	1.507	57.27	21.2	5.059	1.059	0.019	82.86	
SE σ^2_A	انحراف معیار افزایشی		0.0037	0.6825	-1.075	0.068	-	0.0001	2.224	
SE σ^2_D	انحراف معیار غیر افزایشی		44.62	2298	1381.2	31.41	-	0.047	9275.7	
$\sigma^2_{gca}/\sigma^2_{sca}$			0.00008	0.0002	-0.001	0.002	-	0.0028	-0.0002	

ns: Not significant

* and ** : Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

غير معنی دار

* و **: به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

جدول ۳- تجزیه واریانس لاین × تستر برای صفات گیاهی ذرت در شرایط نتش خشکی

Table 3. Analysis of variance for line× tester for plant characteristics in drought stress condition

SOV	متابع تغییر	درجه آزادی d.f	میانگین مربیات (MS)							
			عملکرد دانه Kernel yield	ارتفاع بوته Plant height	ارتفاع بالال Ear height	تعداد دانه در ردیف بالال Kernel.row ⁻¹	تعداد دانه در ردیف دانه در بالال Kernel row.ear ⁻¹	عمق دانه Kernel depth	وزن هزار دانه 1000 Kernel weight	
Replication	تکرار	2	0.55 ^{ns}	108.54 ^{**}	271.28 ^{**}	38.5 ^{ns}	1.62 ^{ns}	0.0001 ^{ns}	7.26 ^{ns}	
Hybrid	هیبرید	119	2.78 ^{**}	167.16 ^{**}	745.15 ^{**}	42.53 ^{**}	5.58 ^{**}	0.0311 ^{**}	3523.99 ^{**}	
Line	لاین	29	2.09 ^{ns}	162.50 ^{ns}	933.08 ^{ns}	92.54 ^{ns}	3.86 ^{ns}	0.0479 ^{**}	2384.87 ^{ns}	
Tester	تستر	3	27.73 ^{**}	57.011 ^{ns}	773.96 ^{ns}	67.17 ^{**}	79.97 ^{**}	0.0297 ^{ns}	3575.03 ^{**}	
Line×Tester	لاین × تستر	87	2.15 ^{**}	172.50 ^{**}	681.51 ^{**}	63.48 ^{**}	3.58 ^{**}	0.02566 ^{**}	2812.28 ^{**}	
Error	خطا	238	0.57	17.262	34.84	72.6	0.7399	0.004234	130.72	
SE σ^2_A	انحراف معیار افزایشی		0.027	-0.263	3.568	0.35	0.087	0.003	29.32	
SE σ^2_D	انحراف معیار غیر افزایشی		6.321	620.99	2586.6	167.65	11.38	0.086	10726.2	
$\sigma^2_{gca}/\sigma^2_{sca}$			0.004	-0.0004	0.001	0/002	0.008	0.004	0.002	

ns: Not significant

* and ** : Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

غير معنی دار

* و **: به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

در بیشتر تحقیقات نقش اثرات غیرافزایشی ژن(ها) برای وزن ۱۰۰ دانه و عملکرد دانه گزارش شده است (Choukan, 1998; Konak *et al.*, 1999; Nestares *et al.*, 1999; Singh *et al.*, 1998). رایس و همکاران (Rissiet *et al.*, 1991) برای عملکرد دانه نقش اثرات افزایشی را مهم‌تر ذکر کرده‌اند. این اختلاف در نتایج می‌تواند ناشی از روش آزمون مواد آزمایشی، تفاوت‌های بین مواد ژنتیکی و یا استفاده از پارامترهای مختلف برای برآورد عمل ژنی باشد (Konak, 1999). وجود هر دو اثرات افزایشی و غیرافزایشی واریانس ژنتیکی نشان دهنده لزوم بهره‌گیری از هر دو اجزای ثبیت‌پذیر و غیر ثبیت‌پذیر واریانس ژنتیکی در برنامه‌های بهنژادی ذرت می‌باشد.

با توجه به اینکه اثر تلاقی‌ها برای صفات (به استثنای تعداد ردیف دانه در شرایط آبیاری معمول) معنی دار بود، مقادیر ترکیب‌پذیری عمومی برای کلیه لاین‌ها و تست‌هادر شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی برآورده گردید (جدول‌های ۴ و ۵). نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین ترکیب‌پذیری عمومی لاین‌ها برای هر صفت وجود داشت. از آنجا که قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی بر مبنای اثرات افزایشی ژن‌ها می‌باشد، وجود تفاوت بین اثرات ترکیب‌پذیری عمومی نشان دهنده اختلاف ژنتیکی در منشاء لاین‌ها برای صفات مورد نظر می‌باشد، بنابراین لاین‌هایی که دارای قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی نسبتاً بالاتری هستند، برای صفات مزبور مناسب‌تر به نظر می‌رسند. برای صفات عملکرد دانه لاین ۱۸، ارتفاع بوته لاین ۲۵، ارتفاع بلال لاین ۳۰ و وزن هزار دانه لاین‌های ۹ و ۱۱ در هر دو شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی ترکیب‌پذیری عمومی بالایی را نشان دادند. در شرایط تنش خشکی برای صفت عملکرد دانه، لاین‌های ۶، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۰ و ۳۰ ارتفاع بوته لاین‌های شماره ۲، ۴، ۱۰، ۸، ۱۵، ۲۱، ۲۴، ۲۱، ۱۰، ۸، ۶، ۴ و ۳۰ برای ارتفاع بلال لاین‌های ۲، ۴، ۱۰، ۸، ۶ و ۱۳ برای صفت تعداد دانه در ردیف لاینهای

مورد بررسی نشان دهنده اثرات غیرافزایشی بود. در اصلاح نباتات گرینش برای اثرات افزایشی مطمئن‌تر بوده و در نتیجه انتقال صفات دارای واریانس افزایشی به نسل‌های بعدی آسان‌تر است. معنی دار بودن میانگین مربعات لاین \times تست نشان داد که واکنش لاین‌ها با تست‌های مختلف برای صفات مربوطه متفاوت بوده و حاکی از نقش اثر ژن غالبیت و غیرافزایشی در کنترل صفات مزبور بوده و ترکیب‌پذیری خصوصی بین تلاقی‌ها را نشان می‌دهد، بنابراین به نظر می‌رسد که هر دو اثر ژن افزایشی و غیرافزایشی در کنترل این صفات نقش داشتند. لازم به ذکر است که برای معنی دار شدن نقش اثر تلاقی‌های مربوط به یک صفت، لازم نیست که همه اجزای آن (لاین‌ها، تست‌ها و لاین \times تست) معنی دار شوند، بلکه معنی دار شدن حتی فقط یک جزء می‌تواند باعث معنی دار شدن آن گردد. البته عکس این مطلب صادق نیست (Kempforn, 1975)

اگر نسبت $\sigma_{gca}^2 / \sigma_{sca}^2$ بزرگ‌تر از یک باشد، نشان دهنده واریانس ژنتیکی افزایشی و در صورت کمتر بودن از یک، نشان دهنده اهمیت واریانس غیر افزایشی می‌باشد. برای صفات عملکرد دانه، ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، عمق دانه، وزن هزار دانه، تعداد ردیف دانه بلال در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی نقش واریانس غیر افزایشی (SCA) نسبت به واریانس افزایشی (GCA) بیشتر بوده و برآورده منفی یا صفر برای اجزای واریانس بر اساس نظر ماتر و جینکز (Mather and Jinks, 1982) و روی (Roy, 2000) می‌تواند ناشی از عدم کفایت مدل آماری و ژنتیکی، عدم کفایت نمونه برداری از جمعیت مرجع، خطای نمونه برداری در برآوردها و ضعف طرح آزمایشی باشد. در ذرت نقش بیشتر اثرات غیرافزایشی برای ارتفاع بوته توسط سینگ و سینگ (Singh and Singh, 1998) گزارش گردیده، در حالیکه کونا و همکاران (Konak *et al.*, 1999) اثرات افزایشی گزارش کرده‌اند.

جدول ۴- مقادیر ترکیب پذیری عمومی لاین‌های ذرت برای صفات مورد ارزیابی در شرایط آبیاری معمولی

Table 4. General combining ability of maize lines and testers for evaluated traits in normal irrigation condition

شماره لайн No.	عملکرد دانه Kernel yield	ارتفاع بوته Plant height	ارتفاع بالل Ear height	تعداد دانه در ردیف بالل Kernel.row ⁻¹	وزن هزار دانه 1000 Kernel weight	عمق دانه Kernel depth
1	-0.918	-12.113	-2.686	1.669**	6.722**	-0.147
2	-0.941	8.886**	1.230	2.252**	-8.02*	0.009
3	0.198	2.052	0.980	1.586	16.138**	0.003
4	-1.459	1.636	1.397	-0.830	-14.694	0.0008
5	0.904**	-11.363	-3.8527	0.086	1.3648	0.0342
6	0.36	1.969	-1.186	-0.580	-12.777	0.0508
7	-1.2058	-3.197	0.147	0.0027	16.055**	-0.007
8	-0.932	5.052**	0.730	-0.913	-1.44	-0.039
9	-0.922	-2.613	2.147	-0.163	20.722**	0.096**
10	1.476**	-4.947	-2.769	0.336	3.305	-0.011
11	0.138	4.469°	3.147**	1.086	9.805**	-0.053
12	0.812**	-12.947	-1.852	0.002	0.888	0.048
13	-1.109	4.302°	1.647	1.586**	18.888**	-0.0157
14	-0.549	6.969**	-0.602	-0.413	3.138°	-0.0032
15	0.175	10.05**	4.813**	-2.830	-20.027	-0.069
16	1.116**	2.2194	-3.019	0.669°	-8.527°	0.012
17	-0.199	3.552	-5.436	-1.580	-0.027	0.055
18	1.026**	-1.113	-0.686	-1.497	-10.194	-0.018
19	1.5173**	-0.780	-7.102	-0.663	9.888**	-0.119
20	-0.115	-3.197	0.813	-0.247	3.305	-0.097
21	-1.369	14.80**	1.313	-1.747	9.722**	0.080°
22	-0.374	-7.780	1.480	0.336	-15.777	0.046
23	1.575**	-0.530	2.730°	0.252	1.888	0.006
24	-1.034	1.719	6.147**	1.502**	-1.861	-0.011
25	-1.278	7.386**	3.897**	-1.163	8.0556**	0.042
26	0.859**	-3.697	-3.102	1.336°	11.472**	0.021
27	0.852**	-8.697	-3.769	-1.997	16.055**	-0.011
28	-0.577	-1.280	2.397	-0.413	-15.611	0.04672
29	0.907**	0.802	-4.602	0.919	-21.694	0.063°
30	1.060**	-1.613	5.647**	1.419°	6.805**	0.04672
SE _{gi}	0.306	1.891	1.151	0.562	2.275	0.034
SE (g _i -g _j)	0.434	2.675	1.628	0.795	3.218	0.049
Tester 1	0.806**	-0.2638	-2.380	-0.091	-0.1	-0.011
Tester 2	-0.32	0.5805	1.8861**	-0.069	-4.51	0.004
Tester 3	-0.475	6.54722**	5.2417**	0.0861	8.611**	0.002
Tester 4	-0.007	-6.86389	-4.747	0.075	-4	0.003
SE _{gi}	0.09831	0.6059	0.368	0.18009	0.7287	0.0111
SE(g _i -g _j)	1.3903	0.85688	0.52138	0.25468	1.0306	0.01583

*and**: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

* و **: به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

"برآورد ترکیب پذیری اثر ژن در لاین‌های ذرت"

جدول ۵- مقادیر ترکیب پذیری عمومی لاین‌های ذرت برای صفات مورد ارزیابی در شرایط تنفس خشکی

Table 5. Genera combining ability of maize lines and testers for evaluated traits in drought stress condition

شماره لاین No.	عملکرد دانه Kernel yield	ارتفاع بوته Plant height	ارتفاع بالل Ear height	تعداد دانه در ردیف Kernel.row ⁻¹	تعداد ردیف دانه Kernel row.ear ⁻¹	عمق دانه Kernel depth	وزن هزار دانه 1000 Kernel weight
1	-0.0123	-12.052	-4.4388	1.8464**	0.5060°	0.075**	7.525°
2	-0.4923	12.613**	2.8111**	-2.4202	0.6393**	-0.0152	4.1917
3	0.0081	-10.969	-0.4388	-1.1368	0.3393	0.0284	-20.3917
4	-0.2198	13.363**	3.7277**	-2.2035	0.8060**	-0.0727	9.6083**
5	-0.1048	-6.969	-5.7722	4.2214**	0.2393	-0.0119	-7.0583
6	0.7056**	1.6139	5.9777**	2.0739**	0.6727**	0.0198	-8.3083
7	0.0101	-2.1361	-2.6055	0.9797	-0.3106	-0.0373	4.9417
8	0.0262	6.0306**	3.4777**	-2.3785	-0.6356	-0.0377	-3.725
9	-0.5856	-2.969	-1.6055	1.4964**	-0.8606	-0.0102	24.608**
10	-0.2323	19.280**	6.0611**	-0.2702	-0.7272	-0.1036	1.6917
11	0.3376	-2.8028	-3.5222	0.1131	-1.3106	-0.4902	25.1917**
12	0.1821	-2.2194	0.4777	-1.0952	0.6393	0.0222	-3.3083
13	-0.5713	2.6972	3.0611**	-2.0785	-0.0772	0.01557	15.441**
14	-0.0098	-0.8861	-1.8555	1.8214**	0.4810	0.0772**	-17.475
15	0.6162**	6.8639**	-7.5222	0.8464	0.7893**	0.02973	-12.475
16	0.4949**	-6.3028	-1.0222	-0.2368	-0.1772	0.01723	-12.0583
17	0.1427	-2.8861	-1.438	1.3131**	0.4560	0.0422**	-7.6417
18	0.8330**	-1.6361	1.894	0.6922	0.1477	0.0930**	6.275*
19	0.0214	0.0306	-2.3555	3.1297**	0.3560	-0.0261	31.475
20	-0.1981	-4.2194	1.9777	-0.9502	-0.1772	0.0414°	-18.1417
21	-1.0446	5.7806**	3.3944**	-0.6868	0.1060	0.1355	-7.8917
22	-0.1117	-9.9694	1.9777	2.3131**	0.6727**	0.0784**	20.858**
23	0.4815°	-0.4694	-0.8555	0.6131	0.1560	-0.0386	7.4417**
24	-0.0915	13.1139**	-3.3555	0.3072	-0.2722	-0.0706	8.441**
25	-0.1008	13.7806**	-3.1055	0.4406	-0.2389	0.0409°	1.025
26	-0.2359	-4.3028	0.5611	-0.1868	-0.4606	-0.004	9.1917**
27	0.1091	-8.6361	1.1444	-1.2702	0.1393	-0.0596	16.358**
28	-0.5898	-17.6361	-2.52222	0.5506	-0.4772	0.0151	11.27**
29	0.1750	-7.4694	-2.68889	-7.4243	-0.9772	-0.1713	-19.558
30	0.4572**	9.3639**	8.56111**	-0.4202	-0.4439	-0.0244	-4.558
se _{gi}	0.1898	1.4757	1.03867	0.6483	0.0512	0.0162	2.583
Se (g _i -g _j)	0.26852	2.08697	1.46891	0.9169	0.3041	0.0230	4.0422
Tester 1	0.79715**	-3.4527	0.6388	-0.5282	-1/2577	-0.0094	17.2528**
Tester 2	-0.0968	-0.8305	-1.0611	0.9776**	0/1007	0.0267**	-9.3917
Tester 3	-0.2186	3.5583	-0.1611	3.0245**	0/1287	-0.0042	15.5083**
Tester 4	-0.4816	0.7250	0.5833	1.2896**	1/0282**	-0.013	-23.3694
Seg _i	0.0608	0.4726	0.3326	0.2367	0/0785	0.0520	0.91540
Se(g _i -g _j)	0.0859	0/6683	0/4704	0.3348	0/1110	0.7367	1.29457

* and ** : Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

* و **: به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

جدول ۶- مقادیر ترکیب پذیری خصوصی تلاقي لاین تستر برای صفات گیاهی ذرت در شرایط آبیاری معمول

Table 6. Specific combining ability of lines and testers for plant characteristics in normal irrigation condition

Line	Kernel yield in stress condition				Kernel yield in normal condition			
	Tester		Tester		Tester		Tester	
	1	2	3	4	1	2	3	4
1	0.57585	0.08215	-0.1746	-0.48333	4.581**	-1.740*	0.0985	-2.939
2	0.22727	0.48923	-0.8975*	0.18109	-0.150	1.769	-0.851	-0.767
3	-0.9422*	-0.2362	1.3085**	-0.13008	2.587**	-0.311	-0.827	-1.447
4	-0.4479	0.63765	-0.3941	0.20451	-0.175	-0.182	0.56	-0.202
5	0.06077	-0.1819	-0.0470	0.16826	1.514**	-3.453	-1.383	3.322**
6	0.60785	-1.3631**	0.32466	0.43067	-1.568	0.29	-0.063	1.33**
7	-1.2226**	-0.5733	0.99983**	0.79617*	-0.040	-1.338	0.847	0.531
8	-0.1554	-0.2791	0.27141	0.16309	-1.138	-0.698	2.911**	-1.073
9	-0.3271	0.29615	-0.0806	0.11167	0.297	-0.77	0.461	0.014
10	-0.6507	-0.6417	0.44574	0.84676*	-0.245	-3.131	3.906**	-0.529
11	0.84093*	-1.0501**	-0.1715	0.38076	0.057	-1.698	3.219**	-1.578
12	-0.1049	-0.5249	-0.0284	0.65826	2.225**	-2.293	-1.902	1.971**
13	-0.1508	-0.4671	0.38499	0.23301	1.821**	-1.782	0.244	-0.28
14	0.33677	-0.5172	-0.2200	0.40059	0.020	0.037	0.071	-0.129
15	-0.5444	1.8919**	-0.2725	-1.0749**	-0.127	2.709**	-1.77	-0.808
16	-0.2570	1.01357**	-0.6525	-0.10391	-0.971	3.369**	-0.511	-1.886
17	-1.0059**	1.34773**	0.23358	-0.57541	-0.330	1.770**	-1.015	-0.424
18	1.73052**	-0.1275	-0.5353	-1.0676**	0.860	-2.217	2.368**	-1.011
19	0.17443	-0.0312	-0.1680	0.02492	-0.040	-2.93	2.807**	0.164
20	-0.4306	1.19232**	-0.4195	-0.34216	1.789**	-0.299	-0.740	-0.749
21	0.07552	-0.0118	-0.7993*	0.73567	-0.3740	0.218	-3.305	3.461**
22	1.0616**	-0.8057**	0.03108	-0.28691	-0.592	-0.735	-1.265	2.593**
23	0.89835*	1.90232**	-1.4441**	-1.3564**	-3.010	3.764**	-1.456	0.702
24	-0.5029	0.04407	0.01191	0.44692	-0.148	-0.241	-1.310	1.702**
25	-0.3759	-0.0476	0.58658	-0.16308	-1.360	3.015**	-2.24	0.593
26	1.14652**	0.97882**	-1.6746**	-0.45066	-0.164*	1.298	-1.698	0.563
27	-0.2355	0.02607	-0.00009	0.20959	-0.787	1.460**	-2.470	1.797**
28	-0.2742	-0.7042	0.41591	0.56259	-1.344	0.081	0.673	0.589
29	0.55618	-0.5415	0.84999	-0.86466*	-1.215	3.005**	1.163**	-2.958
30	-0.6640	-1.7971*	2.11641**	0.34476	-1.970	1.030	3.488**	-2.548
Sesij	0.613				1.124			
Se(S _{ij} -S _{kl})	0.868				1.590			

* and ** : Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

* و **: به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

کرد. در فرآیند اصلاحی ذرت نایابستی هدف یافتن بهترین لاین خالص باشد، بلکه هدف یافتن بهترین ترکیب هیبریدی است که از نظر ژنتیکی و فنوتیپی مناسب باشد، زیرا مشاهده شده است که ترکیب بهترین لاین ها به لحاظ قابلیت ترکیب پذیری عمومی همیشه بهترین هیبرید را تولید نخواهد کرد. در گیاهانی مانند ذرت که هدف نهایی عمدتاً عملکرد دانه است، تأکید بر عملکرد دانه و نیز نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های مربوط به این صفت می تواند به عنوان

۱، ۵، ۶، ۹، ۱۷، ۱۴، ۱۹ و ۲۲، برای صفت تعداد ردیف دانه لاینهای ۲، ۴، ۶، ۱۵، ۲۲، برای صفت عمق دانه لاینهای ۱، ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۲ و وزن هزار دانه لاینهای ۱، ۴، ۱۱، ۱۳، ۲۶، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۱۳، ۹، ۶، ۲۷ و ۲۸ در سطح احتمال یک درصد تفاوت مثبت و معنی داری را نشان دادند. چوکان (Choukan., 1998) نیز معنی داری ترکیب پذیری عمومی عملکرد دانه را متأثر از ترکیب پذیری عمومی اجزای عملکرد، بخصوص تعداد دانه در ردیف بالا و تعداد ردیف دانه در بالا اعلام

تلاقی ها را نشان می دهد و در این آزمایش برای عملکرد دانه در شرایط آبیاری مطلوب هیریدهای حاصل از تلاقی $T_1 \times L_1$ و $T_2 \times L_2$ و $T_{10} \times L_{23}$ و $T_1 \times L_{18}$ و $T_4 \times L_{21}$ و در شرایط تنفس خشکی تلاقی های $T_3 \times L_3$ و $T_2 \times L_{23}$ بالاترین ترکیب پذیری خصوصی را داشتند.

سپاسگزاری

بدینوسیله از جناب آقای مهندس معینی و کارکنان محترم بخشن ذرت و گیاهان علوفه ای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و از تمام کسانی که نگارندهای را در انجام این تحقیق یاری رساندند، سپاسگزاری و قدردانی می شود.

یکی از کارآمدترین ابزارها مورد استفاده قرار گیرد، ولی در مواردی که عملکرد علوفه یا سایر مصارف گیاه مورد نظر باشد و بهنژادگر با چندین صفت با طبیعت متفاوت مواجه باشد، تنها با تأکید بر یک صفت، امکان تهیه یک هیرید مناسب نیست و صفات و ویژگی های گیاهی متفاوتی ممکن است مورد توجه قرار گیرند که ممکن است هر یک ساختار ژنتیکی خاص خود را داشته باشند. به عنوان نمونه صفاتی نظیر طول بلال، ارتفاع بلال و قطر بلال در افزایش و کاهش عملکرد موثر هستند. دارا بودن عملکرد بالا مستلزم مثبت بودن ترکیب پذیری عمومی و ترکیب پذیری خصوصی در این صفات است، در حالی که گاهی این صفات با یکدیگر همخوانی ندارند. ترکیب پذیری خصوصی واریانس غیرافزایشی (غالبیت و اپیستازی)

References

منابع مورد استفاده

- Akbar, M., M. Saleem, F. M. Azhar, M. Yasin Ashraf, and R.Ahmad.** 2008. Combining ability analysis in maize under normal and high temperature conditions. *J. Agric. Res.* 46(1): 27-38.
- Akhtar, N. and M. A. Chowdhry.** 2006. Genetic analysis of yield and some other quantitative traits in bread wheat. *Int. J. Agric. Biol.* 4: 523-527.
- Basal, H. and I. Turgut.** 2005. Genetic analysis of yield components and fiber strength in upland cotton (*G. hirsutum L.*). *Asian J. Plant Sci.* 4: 3. 293-298.
- Choukan, R.** 1999. Estimation of combining ability, additive and dominance variance in corn lines using line x tester cross. *Seed Plant J.* 15:65–73.
- De la Vega, A. J. and S. C. Chapman.** 2006. Multivariate analysis to display interactions between environment and general or specific combining ability in hybrid crops. *Crop Sci.* 46: 957-967.
- Farshadfar, E.** 1997. Plant Breeding Methodology. Razi University Press, Kermanshah, Iran. (in Persian).
- Garcia, S. A, A. C. Thuillet, J. Yu, G. Pressoir, S. M. Romero, S. E. Mitchell, J. Doebley, S. Kresovich, M. Goodman and E. S. Buckler.** 2005. Maize association population: a high – resolution platform for quantitative trait locus 'dissection. *The Plant J.* 44: 1054-1064.
- He.Y., H. G. Qi, Y. C. Sun YL, and M. Z. Bao.** 2009. Identification of a SCAR marker linked to a recessive male sterile gene and it's application in breeding of marigold (*Tagetes erecta*). *Plant Breed.* 128: 92–96.
- Kempthorn, O.** 1957. An Introduction to Genetic Statistics. Jhon Wiley and Nordskog Inc. London.
- Konak, C., A.Unay, E. Serter and H. Basal.** 1999. Estimation of combining ability effects, heterosis and

- heterobeltiosis by line × tester method in maize . Turk. J. Field Crops. 4: 1–9.
- Kumar, P. and S. C. Gupta.** 2003. Genetic analysis in maize. J. Res. Birsa Agric. Univ. 15: 107-110.
- Mather, K. and J. L. Jinks.** 1982. Biometrical genetics. The study of continuous variation: (3th Ed.) Chapman and Hall, London, New York, pp. 396.
- Nestares, G., E. Frutos and G. Eyherabide.** 1999. Combining ability evaluation in orange flint lines of maize . Pesquisa Agropecuaria Brasileira. 34: 1399–1406.
- Olakojo, S. A. and G. Olaoye .**2005. Combining ability for grain yield, agronomic traits and *Strigalutea* tolerance of maize hybrids under artificial striga infestation. Afr. J. Biotechnol. 4(9): 984– 988.
- Prasad, G. S. V, and M. V. S. Sastry.** 1987. Line × tester analysis for combining ability and heterosis in brown planthopper-resistant varieties . Indian Agric. 31:257–265.
- Rissi, R. De. and A. R. Hallauer.** 1991. Evaluation of four testers for evaluation maize (*Zea mays* L.) lines in a hybride development program. Revista Brasileira de Genetica, 14:467–481.
- Roy, D.** 2000. Plant Breeding, Analysis and Exploitation of variation. Alpha Science International Ltd., Pangbourne, U.K: 701pp.
- Shree, P. S., T. Henry, M. Albeiro and G. J. Ariel.** 1992. Combining ability for seed yield and it's components in common bean of Andean origin. Crop Sci.32: 81–84.
- Singh, D. N. and I. S. Singh.** 1998. Line × tester analysis in maize (*Zea mays* L.) J. Res. Birsa Agric. Univ. 10: 177-182.
- Soltani, A.** 1998. Application of Statistical Analysis . Mashhad University Press.182 pp. (In Persian).

Estimation of combining ability and gene effect in maize lines using line \times tester analysis under drought stress conditions

Hosseini, S. F.,¹ R. Choukan², M. R. Bihamta³ and A. Mohammadi⁴

ABSTRACT

Hosseini, S. F., R. Choukan, M. R. Bihamta and A. Mohammadi. 2013. Estimation of combining ability and gene effect in maize lines using line \times tester under drought stress conditions. **Iranian Journal of Crop Sciences.** 15(1): 60-70. (In Persian).

To estimate general combining ability, specific combining ability and gene effect, 30 maize inbred lines were crossed with four male sterile testers. One hundred and twenty developed hybrids were planted in randomized complete block design with three replications in research field station of Seed and Plant Improvement Institute of Iran (SPII), Karaj, in 2009. Kernel yield, plant height, ear height, kernel number.row⁻¹, row number.cob⁻¹, kernel depth and 1000 kernel weight were measured. Analysis of variance, in both irrigation conditions, showed significant difference among hybrids for all characteristics except the row number.cob⁻¹ in normal irrigation condition. Significant mean-square for line \times tester implied that responses of lines and testers differed in two irrigation conditions. Evaluation of $\frac{2}{GCA} \sqrt{\frac{2}{SCA}}$ indicated that there was greater dominance variance (SCA) than additive variance (GCA) for all traits. K3651/2, K47/2-2-1-3-1-1-1-1, K47/2-2-1-4-1-1-1-1, K47/2-2-1-21-2-1-1-1, and K3640/8 inbred lines showed the highest GCA in the moisture stress condition. The highest SCA in the moisture stress condition was observed for T1 \times L18, T3 \times L30, T2 \times L23 and T4 \times L10 and the lowest SCA for T1 \times L7, T2 \times L30, T3 \times L26, T4 \times L23 combinations. Overall both additive and non-additive gene effects were involved in controlling of measured traits.

Key word: Gene effect, General combining ability, Specific combining ability, Maize, and Line \times Tester.

Received: September, 2011 Accepted: March, 2013

1-MSc. Student, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2-Associate Prof., Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran (Corresponding author) (Email: r_choukan@yahoo.com)

3-Professor, Agriculture and Natural Resources Campus, University of Tehran, Karaj, Iran

4- Assistant Prof., Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran