

بررسی برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد کاه و دانه ارقام ارزن معمولی (*Panicum miliaceum L.*)
Study of some morphological traits and straw and grain yield in different
varieties of common millet (*Panicum miliaceum L.*)

اردلان مهرانی ، سیداوشین مساوات و احمدعلی شوشی

چکیده

مهاجران ، ا. ا. مساوات و ا. ع. برس
بات مرغولوژیک و عملکرد دانه و کاه در ارقام ارزن معمولی
(*Panicum miliaceum L.*). مجله علوم زراعی ایران. ()

به منظور و ارزیابی عملکرد دانه و کاه و صفات مورفولوژیکی مختلف ده رقم ارزن معمولی و همبستگی صفات مورفولوژیک عملکرد دانه، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در تکرار، به مدت سه سال (-) در سه منطقه کرج، گرگان و صفائی‌آباد دزفول اجرا شد. صفات مورفولوژیک و کمی مورد بررسی شامل تعداد پنجه در بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد در بوته، تعداد روزهای تا گلدهی، طول ، تعداد دانه در خوش و وزن هزار دانه بود. تجزیه واریانس مركب صفات مورفولوژیک و کمی در نشان داد که ارقام از نظر عملکرد دانه، تفاوت معنی‌دار داشتند. در بررسی همبستگی عملکرد با صفات نیز مشخص شد که در مناطق اجرای تحقیق عملکرد کاه با هیچ یک از صفات، همبستگی معنی‌داری نداشتند. در مقابل ضریب همبستگی، عملکرد دانه در کرج با وزن هزار دانه ($r = /$ **) و طول خوشه ($r = /$ *) در گرگان با تعداد برگ ($r = /$) و تعداد پنجه ($r = /$ *) و در دزفول با روزهای تا گلدهی ($r = /$ *) ، طول خوشه ($r = /$ **) ، تعداد بذر در خوش ($r = /$) وزن هزار دانه ($r = /$ *) و عملکرد کاه ($r = /$ **) داری است. روز تا گلدهی، تعداد برگ در بوته و تعداد پنجه در بوته در سه منطقه به ترتیب با ضرایب همبستگی / و / با میانگین عملکرد دانه در این مناطق همبستگی مثبت و معنی‌داری نشان داد.

واژه‌های کلیدی: ارزن معمولی، عملکرد دانه، صفات مورفولوژیک، روز تا گلدهی، خوش، وزن هزار دانه

تاریخ در: : / /

- عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (امکاتبه کننده)
- عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
- عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی صفائی‌آباد - دزفول

دانه بود، تنها صفات تعداد ساقه ثانویه، تعداد پنجه منتهی به کل و تعداد دانه در هر خوشه از همبستکی مثبت با عملکرد دانه در بوته برخوردار بود (Sahu, 2004).

در اندر اپردادش هند وراثت پذیری عملکرد دانه و اجزای عملکرد آن شامل روز تا % کلدهی، ارتفاع کیاه، تعداد پنجه های منتهی به کل در بوته و روزهای رسیدگی در ژنوتیپ ارزن دم رو باهی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که ارتفاع کیاه واجد بالاترین دامنه میانگین فنوتیبی (/)، تنوع ژنتیکی (/) و تنوع فنوتیبی (/) بود. در مطالعه اخیر وراثت پذیری برای صفت روز تا % درصد بود. ضمناً عملکرد دانه دارای بالاتر ضریب همبستکی ژنتیکی (/) و فنوتیبی (/) بود، ولی هیچ یک از صفات مورد بررسی همبستکی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه نداشتند (Muhammed and Shib, 2004). سانتا کومار (Santhakumar, 1999) در بررسی ژنوتیپ ارزن دم رو باهی از نظر هفت صفت مرتبط با عملکرد دانه اعلام کرد که عملکرد دانه همبستکی مثبت و معنی داری با ارتفاع کیاه، طول خوشه و عملکرد علوفه داشت. دامباران و پالانیزام (Chidambaram and palanisamy, 1995) در بررسی در ژنوتیپ ارزن دم رو باهی، نشان داد که بالاترین ضریب همبستکی فنوتیبی و ژنوتیبی مربوط به عملکرد وزن ریشه است و کمترین وراثت نیز مربوط عملکرد دانه و وزن خوشه بود. عملکرد دانه با وزن پانیکول و وزن کاه همبستکی مثبت دارد ولی در استراتژی انتخاب ژنوتیپ برتر، وزن کل خشک توصیه شده است، زیرا وزن خوشه و کاه واجد کمترین وراثت پذیری بود.

هاولادر (Hawlader, 1991) ژنوتیپ ارزن معمولی با منشاء متفاوت را از نظر صفت زراعی مهم مورد بررسی قرار داد. در بین صفات مورد بررسی، صفات عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد پنجه اولیه، تعداد

ارزن ها جزء غلات دانه ریز محسوب می شوند و به واده گندمیان (*Poacea*) تعلق دارند. از خانواده مذکور گونه های مختلفی نظیر ارزن معمولی (*Panicum miliaceum*)، ارزن دم رو باهی (Setaria italica) و چند گونه دیگر شناخته شده اند (De Wet, 1986). در روسیه ارقام زیادی در بخش اصلاح ارزن، مؤسسات تحقیقات کشاورزی، برای مناطق شرقی این کشوره است و ارقام اصلاح شده حدوداً درصد از کل ارزن های این کشور را تشکیل می دهد. در اصلاح این کونه ارزن، افزایش عملکرد از طریق افزایش اجزای عملکرد یکی از اهداف مهم می باشد (Ilyn and Zolotkin, 1986) در یک ازمایش Meslankova and Resh, 1990) رقم ارزن معمولی را مورد مطالعه قرار دادند و ارقام با عملکرد بالای دانه، کیفیت بالا و مقاوم به باری (Sphacelotheca destruens) را انتخاب کردند. پانوار و کاپ (Panvar and Kapila, 1992) در هند، در یک تحقیق بر صفات مختلف بر عملکرد دانه در بوته را در لاین داخلی و لاین خارجی ارزن معمولی بررسی نمودند. بیک این مطالعه نشان داد که در انتخاب ارقام پر محصول در مناطق معتدل و خشک، تعداد پنجه بارور در بوته و ارتفاع کیاه به عنوان برین صفات مطرح بودند و در مجموعه صفات مورد مطالعه، صفت روز تا رسیدگی، ارتفاع کیاه، تعداد پنجه بارور در بوته و طول خوشه نیز از وراثت پذیری برخوردار بودند.

در منطقه مظفرپور هند، همبستکی صفات در لاین ارزن معمولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین صفات مورد بررسی که شامل % کلدهی، تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع کیاه، قطر خوشه اصلی، تعداد شاخه اول، دوم و سوم، تعداد پنجه منتهی به کل در هر بوته، تعداد بذر در خوشه اول و وزن هزار

ژنوتیپ‌ها اختلاف معنی‌دار وجود دارد و عملکرد اد کل پنجه، تعداد پنجه منتهی به گل و ارتفاع کیاه همبستکی مثبتی داشتند ولی با طول خوشه دارای همبستکی منفی بودند. سن و حم (Sen and Hamid, 1986) در بررسی همبستکی ساده بین عملکرد دانه در بوته با هفت صفت دیگر در نمونه ارزن معمولی، نشان دادند که عملکرد دانه در بوته دارای همبستکی مثبت با صفت روز تا کلدھی، روز تا رسیدگی، ارتفاع کیاه، تعداد پنجه در بوته و طول خوشه بود. وزن کاه نیز دارای صفات روز تا کلدھی، ارتفاع کیاه و طول خوشه بود ولی با تعداد پنجه در بوته همبستکی منفی داشت. ارتفاع کیاه نیز همبستکی بسیار بالائی با روز تا رسیدگی و طول پانیکول نشان داد. تجزیه علیت در بق نشان داد که تعداد پنجه در بوته دارای اثرات مثبت و مستقیمی روی عملکرد دانه و به تبع آن روی روز تا کلدھی و ارتفاع کیاه بود. اثر مستقیم دوره رسیدگی روی عملکرد بذر منفی گزارش شد.

گودوات (Godawat, 1980) در بررسی و مقایسه عملکرد دانه و اجزای آن در رقم ارزن نشان داد که عملکرد دانه در بوته همبستکی مثبت و معنی‌داری با تعداد خوشه در بوته، طول خوشه، وزن هزار دانه و تعداد روزهای تا رسیدگی داشت. تجزیه علیت انجام شده در نشان داد که وزن هزار دانه و تعداد خوشه در بوته مهمترین صفت در افزایش عملکرد ارقام بود. اغلب تحقیقات انجام شده در ای اخیر جهت دسته به اطلاعات کافی در زمینه عملکرد دانه با اجزای عملکرد بوده است، تا بتا مشخص شود که برای انتخاب یک رقم مطلوب مدد به کدام یک از صفات بیشتر تکیه شود، بنابراین در بن راستا و برای دسته به استراتژی اولیه در انتخاب رقم یا ارقام برتر، تحقق حاضر درسه منطقه مختلف کشور که از شرایط مختلف آب و هوا برخوردارند به اجرا در آمد.

پنجه ثانویه از تنوع ژنتیکی بالائی برخوردار بود و به شد که در انتخاب رقم برتر مدنظر قرار گرفت. در این مطالعه عملکرد دانه در بوته نیز دارای همبستکی منفی با وزن هزار دانه و تعداد پنجه در بوته بود. (Reddy and Larshmi, 1991) همبستکی عملکرد دانه را با صفت مورفولوژیک را در رقم ارزن دم روپاوهی مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه عملکرد دانه همبستکی ژنوتیپی معنی‌دار و مثبتی با صفاتی نظیر تعداد کل پنجه، پنجه‌های منتهی به گل، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت نشان دادند و شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیکی مهمترین بات در تعیین عملکرد دانه بودند بنابراین عنوان صفات مهم، در انتخاب ارقام برتر ارزن دم روپاوهی بتوانند مورد استفاده قرار گیرند. بنک و رائو (Singh and Rao, 1989) با بررسی رقم ارزن دم روپاوهی نشان دادند که بین عملکرد دانه با وزن کاه، وزن خوشه، طول خوشه و تعداد پنجه همبستکی مثبت وجود داشت. (Godowat and Choudhary, 1990) در بررسی پنجاه نمونه ارزن معمولی در فصل بارانی نشان دادند که برای انتخاب مستقیم ارقام با عملکرد دانه بالا، صفت شاخص برداشت و وزن خوشه موثرترین صفات بودند. (Abraham and Burthakur, 1987) در بررسی همبستکی صفات در ژنوتیپ ارزن نشان دادند که، صفات تعداد روز تا کلدھی %، تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد خوشه در بوته و وزن هزار دانه دارای عملکرد دانه بودند. در بین صفات مورد بررسی در این مطالعه، صفت روز تا رسیدگی و تعداد خوشه در پنجه بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه داشتند. ناوال و هارینارا (Navale and Harinarayana, 1987) در بررسی پنج صفت زراعی در لاین ارزن دم روپاوهی اعلام کردند که از نظر کلیه صفات مورد بررسی بین

سال نخست آزمایش در دزفول؛ بجای سال‌های آزمایش، هر سال و هر منطقه، محیط در نظر کرد و نهایتاً این محیط، یکدیگر مقایسه شدند و تجزیه و تحلیل آماری لازم برای محیط، مورد نظر انجام شد. تجزیه واریانس مرکب صفات مختلف ارقام ارزن معمولی در (جدول) نشان داد که اثر محیط در رابطه با صفات کاملاً معنی‌دار است (جزء تعداد برک در ارقام مورد مطالعه در رابطه با همه صفات). اعداد روز تا گلدهی و عملکرد کاه تفاوت معنی‌داری داشتند. اثر متقابل × رقم در رابطه با صفات موردنی (تعداد پنجه در بوته) دار بود. مقایسه میانگین صفات مختلف ارزن معمولی در تحت بررسی (جدول) نشان داد که اکرچه / بیشترین تعداد پنجه را رقم شماره، پنجه در بوته داشته است ولی با سایر ارقام تفاوت داری نشان نداد. ارقام شماره (KCM₁) و (KCM₂) / و / عدد برک در بوته، (جدول) بیشترین تعداد برک را دارند. در محیط‌های ساقه را رقم شماره (KCM9) دارا بود (جدول). از نظر تعداد روز تا گلدهی تفاوتی بین ارقام مشاهده نشده و تمام ارقام از این نظر در یک گروه قرار گرفتند (جدول). رقم شماره (KCM1) دارای بلندترین میانگین طول. / سانتیمتر بود. تعداد دانه در . رقم شماره (KCM9) دانه در خوشة تعلق داشت، این رقم وزن هزار دانه را نیز با / گرم داشت. عملکرد کاه در ارقام و در، محیط موردنی بررسی، تفاوت معنی‌داری نشان نداد. بیشترین عملکرد کاه را رقم شماره (KCM2) / تن در هکتار تولید نمود، در انتخاب رقم برتر از نظر تولید کاه به دیگر صفات نظیر روز تا گلدهی و مقاومت به خواییدگی توجه شد، و ارقام شماره (KCM2) شماره (KCM4) و شماره (KCM7) به عنوان

مواد و روش

بمنظور ارزیابی و ده رقم ارزن معمولی ازما در قالب طرح بلوک‌های تصادفی در سه تکرار و در سه منطقه کرج، گرگان و دزفول برای مدت سال (-) به اجرا درآمد. هر کرت سانیمتر بود. در انتخاب زمین برای کار رفت: کنواخت خاک، فاقد علف، می‌هرز باشد و مهمتر اینکه در سال قبل جای کشت ارزن و کیاهان هم خانواده آن نبوده باشد. در مدت سه سال اجرای طرح همه ساله بعد از انتخاب زمین و کاشت تیمارها، عملیات داشت، شامل ایباری، وجین، سله‌شکنی و تنک و واکاری انجام شد. یادداش برداری از صفات رویشی و زایشی کیاه و واکنش کیاه نسبت عوامل زنده و غیر زنده انجام . صفات مورد نظر در ا . تعداد پنجه در بوته، تعداد برک در بوته، تعداد ساقه در بوته، تعداد روز تا اغاز گلدهی، طول ، تعداد دانه در. ، وزن هزار دانه بود. که برای ثبت آنها در هر تیمار ده بوته بصورت تصادفی تعیین و اندازه کری شد. برای تعیین عملکرد کاه و دانه در تیمارها، همزمان با تغییر رنگ عمومی . حذف حواشی در سطح متر مربع از هر تیمار برداشت بعمل آمد. تجزیه مرکب سه منطقه بر اساس، (ون احتساب سال نخست در دزفول به دلیل عدم دستیابی به عملکرد دانه) انجام شد و مقایسه میانگین‌های با استفاده از آزمون دانکن صورت گرفت. ضرایب همبستگی صفات مورد، با عملکرد دانه و کاه نیز محاسبه شد تا ضمن مشخص شدن رقم یا ارقام همبستگی عملکرد دانه و صفات مورفو‌لژیک در ارقام در .

نامتناسب بودن وضعیت ارقام از نظر صفات بررسی شده در کرج، گرگان و دزفول و عدم تولید دانه در

جدول - تجزیه واریانس مرکب برای صفات مختلف در ارقام ارزن معمولی در محیط‌های مختلف در سه منطقه کرج، گرگان و دزفول

Table 1. Combined analysis of variance for grain and straw yields and some morphological traits in common millet varieties in different environments in Karaj, Gorgan and Dezful

S.O.V.	تغییرات	درجه آزادی d.f.	میانگین مربعات MS									عملکرد دانه Grain yield.
			تعداد پنجه Tillor No.	تعداد برگ Leaf No.	تعداد پیرگ Stem diameter	روزهای Days to Flowering	طول پانیکول Panicle length	تعداد دانه در پانیکول Grain no./panical	وزن هزار دانه 1000 grain weight	عملکرد کاه Straw yield		
Environment (Env.)		7	39.6 **	2.207 ns	0.962 **	3029.9 **	1716.28 **	7195380 **	14.923 **	171.3 **	0.073	
Error	اشتباه	16	1.477	3.547	0.009	6.183	5.645	10343.28	0.08	2.068	2.005 **	
Variety(Var.)	رقم	9	6.753 **	18.6 **	0.161 **	97.532 ns	426.86 **	435179 **	3.155 **	5.763 ns	0.552 **	
(Var × Env.)	× رقم	63	1.476 **	3.54 **	0.026 **	54.29 **	29.221 **	34.35 **	0.211 **	5.689	0.145	
Error	اشتباه	144	0.651	0.746	0.005	10.257	3.507	13258	0.042	1.748	0.073	

* and **: Significant at 5% and 1% levels of probability, respectively.

ns: Non-significant

* و ** به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۱٪ و ۰.۵٪

غیر معنی دار

صفات
ارقام ارزن

Table 2. Mean comparison for grain and straw yields and some morphological traits in common millet varieties

رقم Variety	تعداد پنجه در بوته Tiller No.	تعداد برگ در بوته Leaf No.	() Stem diamelor (mm)	روز تا گلدهی Days to flowering	() طول خوشة (cm) Panicle length	تعداد دانه در خوشة Grain No/ panicle	وزن هزار دانه (گرم) 1000 grain weight (g)	عملکرد کاه (تن در هکتار) Straw Yield (t/h)	عملکرد بذر (تن در هکتار) Grain Yield (t/h)
KCM1	4.175a	9.5a	7.15ab	62.5a	35.70a	571c	4.026d	7.190a	0.892b
KCM2	4.325a	9.2a	7.29ab	59.5a	33.12abc	861abc	4.63bc	7.560a	1.360ab
KCM3	5.546a	8.2ab	5.81ab	55.0a	29.13bcd	817bc	4.010d	7.990a	1.859a
KCM4	5.546a	8.1ab	5.61ab	56.7a	30.79abcd	779bc	4.170cd	6.810a	1.239ab
KCM5	5.400a	7.5ab	6.57ab	57.1a	27.51bcde	853abc	4.452bcd	8.310a	1.700ab
KCM6	4.910a	8.6ab	4.61b	58.2a	22.27e	887ab	4.230bcd	7.870a	1.440ab
KCM7	5.496a	7.8ab	6.64b	58.87a	26.87cde	799bc	4.230bcd	7.640a	1.690ab
KCM8	5.617a	6.4b	6.61b	57.4a	28.50bcde	755bc	4.510bcd	6.930a	1.70ab
KCM9	4.830a	7.8ab	8.54a	56.7a	33.6abc	1111a	5.106a	7.150a	1.70ab
KCM10	5.340a	7.8ab	6.58b	57.4a	24.42de	763bc	4.760ab	7.220a	1.490ab

ن های، در هر ستون، دارای حداقل یک حرف مشابه بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۱٪ اختلاف معنی دار ندارند.

Means. in each column, followed by at least one similar letter are not significantly different at the 5 % probability level- using Duncan's Multiple Range Test.

جدول ' - ضرایب همبستگی ساده (درجه آزادی =) عملکرد دانه و کاه و صفات مورد بررسی در ارقام ارزن معمولی در کرج (-)

Table 3. Simple correlation coefficients ($df=8$) between grain and straw yields and some traits in common millet varieties in Karaj (2001-2003)

Traits	صفات	تعداد پنجه در Tiller No.	تعداد پنجه در Leaf No.	تعداد برگ در بوته	Stem diameter	روز تا Days to flowering	طول خوشة Panicle length	تعداد دانه در خوشة Grain No./panicle	وزن هزار دانه 1000 grain weight	عملکرد کاه Straw yield	عملکرد دانه Grain yield
Tiller No.	تعداد پنجه در بوته	1									
Leaf No.	تعداد برگ در بوته	-0.134 n.s	1								
Stem Diameter.		-0.417 n.s	0.205 n.s	1							
Day to fl.	روز تا	-0.539 n.s	0.035 n.s	0.158 n.s	1						
Panicle length.	طول خوشة	0.587 n.s	-0.518 n.s	-0.505 n.s		-0.124 n.s	1				
Grain No/panicle	تعداد دانه در خوشة	-0.046 n.s	-0.565 n.s	-0.299 n.s		-0.031 n.s	0.449 n.s	1			
1000 grain weight	وزن هزار دانه	0.447 n.s	0.465 n.s	-0.488 n.s		-0.513 n.s	0.069 n.s	-0.434 n.s	1		
Straw yield	عملکرد کاه	0.264 n.s	0.159 n.s	-0.421 n.s		-0.437 n.s	0.413 n.s	-0.315 n.s	-0.335 n.s	1	
Grain yield	لکرده دانه	0.332 n.s	-0.225 n.s	-0.549 n.s		0.226 n.s	0.638 *	-0.189 n.s	-0.773 **	0.315 n.s	1

* and **: Significant at 5% and 1% levels of probability, respectively.

ns: Non-significant

* و ** به ترتیب معنی دار در سطح احتمال % و %

ns: غیر معنی دار

جدول ۱ - ضرایب همبستگی ساده (درجه ازادی =) عملکرد دانه و کاهو صفات مورد بررسی در ارقام ارزن معمولی در گرگان (-)

Table 4. Simple correlation coefficients(df=8) between grain and straw yields and some traits in common millet varieties in Gorgan (2001-2003)

Traits		تعداد پنجه در بوته Tiller No.	تعداد برگ در بوته Leaf No.	تعداد برگ در بوته Leaf No.	روز تا Days to flowering	طول خوشة Panicle length	تعداد دانه در خوشة Grain No./panicle	وزن هزار دانه 1000 grain weight	عملکرد کاه Straw yield	عملکرد دانه Grain yield
Tiller No.	تعداد پنجه در بوته	1								
Leaf No.	تعداد برگ در بوته	-0.685 *	1							
Stem Diameter.		-0.838 **	0.665 *	1						
Day to flowering	روز تا	-0.462 n.s	0.662 *	0.521 n.s	1					
Panicle length	طول خوشة	-0.356 n.s	0.570 n.s	0.027 n.s	0.179 n.s	1				
Grain No./panicle	تعداد دانه در خوشة	-0.237 n.s	-0.137 n.s	0.365 n.s	-0.476 n.s	-0.136 n.s	1			
1000 grain weight	وزن هزار دانه	-0.153 n.s	-0.175 n.s	0.292 n.s	-0.315 n.s	0.038 n.s	-0.761 *	1		
Straw yield	عملکرد کاه	0.026 n.s	0.171 n.s	-0.046 n.s	0.186 n.s	0.146 n.s	0.407 n.s	0.235 n.s	1	
Grain yield	عملکرد دانه	0.687 *	0.685 *	-0.413 n.s	0.554 n.s	-0.417 n.s	0.412	0.424 n.s	0.475 n.s	1

* and **: Significant at 5% and 1% levels of probability, respectively.

% به ترتیب معنی دار در سطح احتمال: % و *

ns: Non-significant

غير معنی دار ns

جدول ۱ - ضرایب همبستگی ساده (درجه آزادی=) عملکرد دانه و کاه و صفات مورد بررسی در ارقام ارزن معمولی در دزفول (-)

Table 5. Simple correlation coefficients ($df=8$) between grain and straw yields and some traits in common millet varieties in Gorgan (2001-2003)

Traits	صفات	تعداد پنجه در Tiller No.	تعداد برگ در بوته Leaf No.	تعداد برگ در بوته Leaf No.	Stem diameter	روز تا Days to flowering	طول خوش Panicle length	ادهانه در خوش Grain No./panicle	وزن هزار دانه 1000 grain weight	عملکرد کاه Straw yield	عملکرد دانه Grain yield
Tiller No.	تعداد پنجه در	1									
Leaf No.	تعداد برگ در بوته	-0.529 n.s	1								
Stem Diamameter		-0.240 n.s	0.448 n.s	1							
Day to flowering	روز تا	0.030 n.s	0.294 n.s	0.570 n.s	1						
Panicle length	طول خوش	-0.515 n.s	0.249 n.s	0.276 n.s	0.505 n.s	1					
Grain No./panicle	تعداددانه در خوش	0.044 n.s	0.344 n.s	0.632 *	0.892 **	0.458 n.s	1				
1000 grain weight	وزن هزار دانه	-0.220 n.s	0.205 n.s	0.679 *	0.809 **	0.531 n.s	-0.889 **	1			
Straw yield	عملکرد کاه	-0.230 n.s	0.318 n.s	0.295 n.s	0.586 n.s	0.578 n.s	0.530 n.s	0.454 n.s	1		
Grain yield	عملکرد دانه	-0.439 n.s	0.541 n.s	0.371 n.s	0.703 *	0.858 **	0.685 *	-0.635 *	0.780 **	1	

* و **: Significant at 5% and 1% levels of probability, respectively. % و به ترتیب معنی دار در سطح احتمال :

n.s: Non-significant

ns: غیر معنی دار

جدول ' - ضرایب همبستگی ساده (درجه آزادی =) عملکرد دانه و کاه و صفات مورد بررسی در ارقام ارزن معمولی در' (-)

Table 6. Simple correlation coefficients ($df=8$) between grain and straw yields and some traits in common millet varieties in three locations (2001-2003)

Traits	صفات	Tiller No.	تعداد پنجه در تعداد برگ در بوته	تعداد گل در بوته	Leaf No.	روز تا flowering	طول خوشة	تعداد دانه در خوشة Grain No./panicle	وزن هزار دانه 1000-grain weight	عملکرد کاه Straw yield	عملکرد دانه Grain yield
Tiller No.	تعداد پنجه در بوته	1									
Leaf No.	تعداد برگ در بوته	-0.793 **	1								
Stem Diameter		-0.598 n.s	0.109 n.s	1							
Day to flowering	روز تا گلدهی	-0.765 **	0.590 n.s	0.325 n.s	1						
Panicle length	طول خوشة	-0.559 n.s	0.374 n.s	0.472 n.s	0.394 n.s	1					
Grain No./panicle	تعداد دانه در خوشة	0.066 n.s	-0.221 n.s	0.487 n.s	- 0.542 n.s	0.081 n.s	1				
1000- grain weight	وزن هزار دانه	-0.110 n.s	-0.315 n.s	0.736 *	- 0.199 n.s	0.086 n.s	0.684 *				
Straw yield	عملکرد کاه	-0.582 n.s	0.106 n.s	0.267 n.s	0.542 n.s	0.435 n.s	0.695 *	0.302 n.s			
Grain yield	عملکرد دانه	0.657 *	0.677 *	- 0.025 n.s	0.782 **	- 0.412 n.s	0.573 n.s	0.293 n.s	0.783 **	1	

* and **: Significant at 5% and 1% levels of probability, respectively.

% به ترتیب معنی دار در سطح احتمال، % و %

ns: Non-significant

ns: غیر معنی دار

برگ در بوته، روز تا گلده و عملکرد کاه همبستک مثبت و معنی داری داشت (جدول ۱). با توجه به نتایج بدست امده در هر یک از مناطق صفات با عملکرد دانه و کاه متفاوت بود. در کرج عملکرد کاه با همکاری از صفات همبستک نشان نداد، و عملکرد دانه با طول خوش همبستک مثبت و داری و با وزن هزار دانه همبستک داشت، در بن رابطه هاولادر (Hawlader, 1991) بزرگتر و ژنتیک پارزن معمولی گزارش داد که عملکرد دانه در بوته با وزن هزار دانه و تعداد پنجه در بوته همبستکی منفی داشت، ولی در تحقیق دیگر کوداوات (Godawat, 1980) نشان داد که عملکرد دانه دارای همبستکی مثبت و معنی داری با تعداد خوش در بوته، طول خوش، وزن هزار دانه و تعداد روز تا رسیدگی است و به همین علت وزن هزار دانه و تعداد خوش در بوته را مهمترین صفت در افزایش عملکرد ارقام گزارش کرد. در گرگان بزرگتر کرج عملکرد کاه با همکاری از صفات دارند داشت و در مقابل عملکرد دانه با تعداد بزرگ در بوته و تعداد پنجه در بوته همبستکی مثبت داشت، بنابراین برای انتخاب ارقام پرمحصول از نظر عملکرد دانه میتوان تعداد بزرگ و تعداد پنجه را مردم نظر قرار داد. از دو موارد قابل توجه در گرگان وجود همبستک تعداد دانه در خوش و وزن هزار دانه در گاه بود. استنباط می شود با افزایش تعداد دانه در خوش از اندازه بذر کاسته میشود. مالو و فیلیپ (Maloo and Philip, 2001) از سال ۲۰۰۱ در ارزش رقم ارزش دم روپاهم در سه منطقه نشان دادند که که در هر سه منطقه عملکرد دانه در بوته با صفات وزن پانیکول، تعداد دانه در پانیکول، وزن هزار دانه، عملکرد فیریولوژیکی و شاخص برداشت همبستکی داشت. توجه به اثر مستقیم و غیر مستقیم صفات در عملکرد دانه در هر سه منطقه این استراتژی اعلام شد که در انتخاب ژنتیکهای برتر ارزش دم روپاهم از نظر عملکرد

ارقام برتر تعیین شدند. ارقام مورد بررسی از نظر عملکرد دانه، دارای تفاوت معنی دار بودند و بیشترین عملکرد دانه را رقم شماره ۱ / (KCM3) تن در هکتار تولید نمود، بنابراین از نظر عملکرد دانه اساس مقایسه (جدول ۱) رقم شماره ۱ (KCM3) به عنوان رقم برتر مشخص شد.

ضرایب همبستکی بین صفات در هر یک از مناطق محاسبه شد و دار بودن ضرایب همبستکی بین صفات، مورد بررسی قرار گرفت (Snedecor and Cochran, 1967). در کرج با درجه آزادی ($n=1$) از مجموع همبستکی ساده فنوتیپی، مورد دار وجود داشت، در این منطقه، عملکرد کاه با همکاری از صفات همبستک نداشت ولی عملکرد دانه با طول خوش همبستک مثبت و با وزن هزار دانه از همبستک منف برخوردار بود (جدول ۱). در گرگان نیز با درجه آزادی ($n=1$) از مجموع همبستکی ساده دار بود و مورد معنی دار بود و عملکرد کاه با همکاری از صفات دارند داشت، ولی عملکرد دانه با تعداد بزرگ در بوته و تعداد پنجه در بوته همبستکی مثبت داشت. از دو موارد قابل توجه در این منطقه وجود همبستک تعداد دانه در خوش و وزن هزار در دانه گاه بود (جدول ۱). در دزفول با درجه آزادی ($n=1$) از مجموع همبستکی ساده فنوتیپی مورد از دار بوده است در این منطقه وجود همبستک تعداد دانه با هیچکدام از صفات همبستک نداشت، ولی عملکرد دانه با روز تا گلده، طول خوش، تعداد دانه در خوش و عملکرد کاه همبستک مثبت و با وزن هزار دانه همبستک داشت (جدول ۱).

در این مجموع همبستکی ساده فنوتیپی تنها در مورد دار بود، در این بررسی عملکرد کاه با صفت تعداد دانه در خوش همبستک دار و مثبت داشت، و اعملکرد دانه با تعداد پنجه در بوته، تعداد

داشته است.

(Sahu, 2001) نشان داد که عملکرد دانه در

بوته ارزن معمول با صفات % کلدهی، روز تا رسیدگی، ارتفاع، قطر پانیکول اصلی، تعداد شاخه اول، دوم و سوم، تعداد پنجه متنه به کل در هر بوته، تعداد دانه در خوش اول و وزن هزار دانه کیا همبستکی مثبت داشت.

در تحقیق حاضر تفاوت همبستکی های محاسبه شده در مناطق مورد مطالعه مین تفاوت واکنش ارقام مختلف ارزن به شرایط کوناکون آب هوائی است. (Howlader et al., 1989) در هاولادر و همکاران (Howlader et al., 1989) در بررسی و مقایسه رقم ارزن معمول که در شرایط و دیم انجام گرفت، های متفاوت را در هر دو محیط برای عملکرد دانه ارتفاع کیا، طول عملکرد کاه و تعداد پنجه بارور در ارقام کزارش نمودند.

ارقامی قابل انتخاب هستند که واجد عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، وزن پانیکول، عملکرد دانه در پانیکول بالاتری .

در دزفول عملکرد کاه با هیچ کدام از صفات نداشت و عملکرد دانه با تعداد روز تا طول خوش، تعداد دانه در خوش و عملکرد

کاه همبستک مثبت و با وزن هزار دانه همبستک داشت. ولی بنگ و راؤ (Singh and Rao, 1989) در سال نشان دادند که عملکرد دانه در ارزن با وزن کاه، وزن پانیکول، طول پانیکول و تعداد پنجه ۱۰ ماه همبستکی مثبت دارد، در حالیکه سن و حمیث (Sen and Hamid, 1986) روز تا مثبت، روز تا ، روز تا رسیده، ارتفاع کیا، تعداد پنجه در بوته و طول خوش را با عملکرد دانه نشان دادند. در مجموع سه منطقه عملکرد دانه با تعداد پنجه در بوته، تعداد برگ در بوته، روز تا کلدهی

منابع مورد استفاده

- Abraham, M. J. and D. N., Borthakur. 1987.** Selection indices for grain yield in foxtail millet. Expt. Genet. 3(1-2):71-76.
- Chidambaram, S. and S. Palanisamy. 1995.** Variability and correlation studies of dry matter with reference to selection criteria in foxtail millet (*Setaria italica* L.). Madras Agricultural Journal. 82(1):1-10 .
- De Wet, J. M. J. 1986.** Origin, evaluation and systematics of minor cereals. P. 19-30. In small millet agriculture. OXFORD & IBH. Publishing Co. PVT. LTD.
- Godowat, S.L. and B. R., Choudhary. 1990.** Correlated response of grain yield in proso millet (*Panicum miliaceum* L.). Indian Journal of Agricultural Sciences. 60(11):758-759.
- Howlader. S. H. 1991.** Genetic parameters and character association in foxtail millet [*setari italica* (L.) Beauv] Bangladesh Journal of Scientific and Industrial Research. 26(1-4):74-78.
- Ilyn, V. A. and E. N. Zolotukin. 1986.** Breeding proso millet (*Panicum miliaceum*) in volga region. USSR. 105-111. In: Small millet in global agriculture OXFORD & IBH. Publishing Co. PVT. LTD.
- Maloo, S. R. and J. Philip. 2001.** Magnitude and nature of associations in foxtail millet [*Setaria italica* (L.) Beauv]. Indian Journal of Genetics and Plant Breeding. 61(4):377-378 .
- Meslankova, L. I. and L. P. Resh. 1990.** Sources of resistance to head smut in proso millet. Nauchno-Tekhnicheskii-Byulleten-VASKNIL-Sibrikoe-Otdelenie-Sibrikii-Nauchno-Issleddovatel'skii Institut sel

skogo- Khzyaistva. No.6:28

Muhammed, B. and K. H. Shib 2004. Genetic variability and correlation studies in foxtail millet (*Setaria italica*) , AICSIP Regional Agricultural Research Station, Palem-509215, Mahbubnagar District (Andhra Pradesh), India. Crop Research (Hisar). 28(1-3):94-97 .

Navale, P. A. and G. Harinrayana. 1987. Character correlation heritability and selection response in a population of foxtail millet. Journal of Maharashtra Agricultural Universities.12(2):152-155.

Panwar, K. S. and R. K. Kapila. 1992. Variation and character association in proso millet. Crop Improvement.19(2):130-133 .

Reddy, C. D. R. and K. Jhansilakshim. 1991. Variability and path analysis of component characters in foxtail millet. Jounal of Maharashtra Agricultural Universities. 16(7):44-47.

Sahu, R. S. 2004. Correlation in proso millet (*Panicum miliaceum*). Journal of Applied Biology.14(2):12-14.

Santhakumar, G. 1999. Correlation and path analysis in Foxtail millet. Journal of Maharashtra Agricultural Universities. 24(3):300-301.

Sen, D. K. and M. A. Hamid. 1986. Character association and path analysis in proso millet (*Panicum miliaceum*). Thai Journal of Agricultural Science. 19(4):307-312.

Singh, K. D. and M. N. Rao. 1989. Association analysis in foxtail millet [*Setaria italica* (L.) Beauv]. Indian Journal of Research APAU. 17(7):68-69.

Study of some morphological traits and straw and grain yield in different varieties of common millet (*Panicum miliaceum* L.)

A. Mehrani¹, A. Mosavat² and A. A. Shooshi³

ABSTRACT

Mehrani, A., A. Mosavat and A. A., Shooshi. 2007. Study of some morphological traits and straw and grain yield in different varieties of common millet (*Panicum miliaceum* L.). *Iranian Journal of Crop Sciences*. 9(3): 282-295

This experiment was conducted to study straw and grain yield and morphological traits in 10 common millet by using a RCB design with three replications in Karaj, Dezful and Gorgan in three consecutive growing seasons (2000-2003). Data were recorded on traits such as tiller no.plant⁻¹, leaf no.plant⁻¹, stem diametere, days to 50% flowering, panicle length, seed number per panicle, 1000- grain weight. The grain and straw yields of each variety was also determined by harvesting a 5 m² area of two center rows in each plot, and the weights were then adjusted to 14% of moisture. Results indicated that there were significant differences for all traits among varieties at 0.01 probability level, except for, days to 50% flowering and straw yield. Mean comparisons showed that var. 2 with 9.2 leaves, var. 9 with the stem diameter of 8.54 mm, var. 1 with panicle length of 35.7 cm, var. 9 with 1111 grain per panicle, var. 9 with 1000- grain weight of 5.16 g, and var. 3 with the grain yield of 1.859 t/ha had the highest values among the other varieties. Meanwhile, the results showed that there were significant and positive correlation between straw yield and number of grain per panicle (0.695*) but there were significant and positive correlation between grain yields and tiller number per plant (0.657*), leaf number per plant(0.677*), days to 50% flowering(0.782*) and straw yield (0.782*).

Key words: Common millet, Grain yield, Morphological traits, Days to flowering, Panicle, 1000 grain weight

Received: April, 2006.

1- Faculty member, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran (Corresponding author).

2- Faculty member, Golestan Agriculture and Natural Resources Research Center, Gorgan, Iran.

3- Faculty member, Safiabad Agriculture and Natural Resources Center, Dezful, Iran.