

## ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های جدید برنج (*Oryza sativa* L.) با منشاء ارقام محلی ایرانی Analysis of grain yield stability of new rice (*Oryza sativa* L.) genotypes originated from Iranian local cultivars

مهرزاد اله‌قلی پور<sup>۱</sup>

### چکیده

م. اله‌قلی پور. ۱۳۹۵. ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های جدید برنج (*Oryza sativa* L.) با منشاء ارقام محلی ایرانی. مجله علوم زراعی ایران. ۱۸(۴): ۲۸۸-۳۰۱

اثر متقابل ژنوتیپ در محیط برای پژوهشگران علوم اصلاح‌نباتات دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و آگاهی از آن به به‌نژادگران کمک می‌نماید تا بتوانند ژنوتیپ‌ها را با دقت بیشتری ارزیابی کرده و ژنوتیپ‌های برتر از نظر پایداری و عملکرد بالا را انتخاب نمایند. در این آزمایش تعداد ۱۳ ژنوتیپ اصلاح‌شده برنج با منشاء ارقام محلی ایرانی همراه با دو رقم هاشمی و صالح به عنوان شاهد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سه منطقه رشت، آبکنار و چپرس طی دو سال (۱۳۹۴-۱۳۹۳) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس ساده نشان داد که عملکرد دانه ارقام برنج در سه مکان تفاوت معنی‌داری داشتند. نتایج حاصل از روش GGE بای‌پلات نشان داد که دو مولفه اصلی اول (معرف اثر اصلی ژنوتیپ) و دوم (معرف اثر متقابل ژنوتیپ در محیط) به ترتیب ۷۷ و ۲۰ درصد و در مجموع ۹۷ درصد از تغییرات کل داده‌ها را توجیه کردند. در این آزمایش، دو محیط بزرگ و مجزا مشخص شدند. اولین محیط بزرگ واقعی شامل مناطق رشت و آبکنار با ژنوتیپ‌های برتر RI18430-47، RI18430-56، RI18430-60، RI18430-87، RI18430-12 و RI18430-72 و دومین محیط بزرگ واقعی شامل منطقه چپرس با ژنوتیپ برتر RI18430-77 بود. در بین ژنوتیپ‌های انتخابی از نظر میزان عملکرد دانه و پایداری، دو لاین RI18430-12 و RI18430-47 به دلیل دارا بودن میزان آمیلوز متوسط، طول دوره رشد و ارتفاع بوته مناسب و میزان برنج سفید بالاتر و برنج خرد کمتر، به عنوان لاین‌های برتر شناسایی شدند. دو ژنوتیپ انتخابی حاصل از تلاقی بین رقم اصلاح‌شده صالح (به عنوان والد مادری) و رقم محلی هاشمی (به عنوان والدی پدری) هستند. از نظر مورفولوژی و ساختار ظاهری، لاین RI18430-12 شبیه ارقام محلی بوده و دارای دانه‌های بلند و ریشک‌های کوتاه به رنگ سیاه می‌باشد. کیفیت پخت لاین خالص مذکور بسیار عالی و شبیه کیفیت پخت ارقام محلی مانند هاشمی و دمسپاه است، در حالی که لاین RI18430-47 شبیه رقم اصلاح‌شده صالح بوده و مانند آن دارای دانه‌های بلند و قطور و دارای ریشک بوده و کیفیت پخت آن به دلیل داشتن میزان آمیلوز متوسط (۲۱ درصد)، برتر از رقم صالح می‌باشد، اما نسبت به ارقام محلی ایرانی کیفیت پخت ضعیف‌تری دارد. ارتفاع بوته در هر دو ژنوتیپ انتخابی کوتاه بوده و جزء ژنوتیپ‌های زودرس تا میان‌رس محسوب می‌شوند.

واژه‌های کلیدی: اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، برنج، پایداری، تجزیه GGE بای‌پلات و محتوای آمیلوز دانه.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی به شماره مصوب ۹۳۱۰۰-۰۴-۰۳ می‌باشد.

۱- استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

(پست الکترونیک: mehrzadallahgholipour@yahoo.com)

## مقدمه

جمعیت جهان در حال حاضر با نرخ رشدی معادل یک میلیارد نفر در هر ۱۰ تا ۱۲ سال، رو به افزایش است و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۲۵ جمعیت جهان از ۷/۵ میلیارد نفر کنونی به حدود ۱۰ میلیارد نفر افزایش یابد (FAO, 2015). دسترسی به واریته های برنج با پتانسیل عملکرد و پایداری بالاتر برای تأمین غذای جمعیت در حال افزایش از اهداف ضروری و مهم به شمار می آید (Khush, 2005). سطح زیر کشت برنج در جهان ۱۶۳ میلیون هکتار و میزان تولید برابر ۷۲۰ میلیون تن شلتوک معادل ۴۹۴/۴ میلیون تن برنج سفید است. متوسط عملکرد شلتوک در دنیا برابر با ۴۴۱۰ کیلوگرم در هکتار می باشد (FAO, 2015). در ایران نیز برنج جایگاه ویژه ای دارد، به طوری که قسمت اعظم غذای مردم ایران به ویژه در استان های گیلان و مازندران را به خود اختصاص می دهد. سطح زیر کشت ارقام مختلف برنج در کل کشور ۵۳۹۰۹۱ هکتار با تولید ۲۳۴۷۲۹۰ تن شلتوک برآورد گردیده است. متوسط عملکرد برنج در ایران ۴۳۵۴ کیلوگرم در هکتار برآورد شده و مصرف سرانه آن حدود ۳۸ کیلوگرم می باشد، بنابراین هر ساله برای تأمین برنج جمعیت کنونی نیاز به تولید ۷۰۰ تا یک میلیون تن برنج سفید می باشد (Anonymous, 2015). تولید محصولات کشاورزی را می توان از طریق افزایش بهره وری در استفاده از منابع مانند افزایش بهره وری در واحد زمین و پول و به واسطه درک و استفاده بهتر از اثر متقابل ژنوتیپ × محیط افزایش داد. اثر متقابل ژنوتیپ × محیط به دلیل حضور گسترده و پیامدهای آن، یک موضوع عمده بین به نژادگران، متخصصان ژنتیک، زراعت و زارعین است. وجود اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، انجام آزمایش های چند محیطی را ایجاب می کند که این موضوع منجر به تکوین و کاربرد معیارهای پایداری متعددی شده است. آگاهی از اثر متقابل ژنوتیپ × محیط به به نژادگران کمک می کند تا بتوانند ژنوتیپ ها را با دقت بیشتری

ارزیابی کرده و ژنوتیپ های برتر از نظر پایداری و عملکرد بالا را انتخاب نمایند. روش های گوناگونی برای بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و تعیین ژنوتیپ های پایدار ارائه شده است که شامل روش های پارامتری تک متغیره، چند متغیره و ناپارامتری می باشند. اگر چه محاسبه و استفاده از روش های پارامتری تک متغیره و ناپارامتری آسان است، ولی این روش ها نمی تواند ماهیت پیچیده و چند بعدی اثر متقابل را به خوبی تفسیر نمایند. از این رو استفاده از روش های چند متغیره برای رفع این مشکل پیشنهاد شده است (Gauch, Moreno-Gonzalez et al., 2004). با استفاده از ویژگی های نمودار بای پلات (Gabriel, 1971) و روش چند متغیره تجزیه به مولفه های اصلی، روش نوین GGE بای پلات معرفی شد (Yan et al., 2000). این روش بر خلاف مرسوم ترین روش چند متغیره تجزیه پایداری که تنها اثر متقابل ژنوتیپ × محیط را مدنظر قرار می دهد، از اثر اصلی ژنوتیپ نیز استفاده می کند. روش GGE بای پلات با بهره گیری از روش های چند متغیره و رسم نمودارهای دو بعدی، علاوه بر تجزیه و تحلیل مناسب داده ها، کار تفسیر نتایج را هم تسهیل می نماید و از این رو یک روش مناسب برای تجزیه پایداری محسوب می شود. به تصویر کشیدن نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بسیار ارزشمندتر از ارائه آنها به صورت جدول است، به ویژه اگر پژوهشگر با مجموعه ای از داده های پیچیده روبرو باشد (Yan and Kang, 2003). بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در پی ابداع مفهوم اثر متقابل متقاطع (Becker, 1981) یا تغییر رتبه (Huhn, 1996) معنی پیدا کرد، یعنی فقط اثر متقابل ژنوتیپ × محیط متقاطع که موجب تغییر رتبه ارقام در محیط های مختلف می شود بر گزینش ژنوتیپ ها اثر می گذارد. برای تعیین اثر متقابل متقاطع یا تغییر رتبه ارقام در محیط های مختلف، باید هر دو اثر ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در نظر گرفته شوند. به این معنی که بررسی اثر متقابل

متوسط (۲۱-۲۰ درصد) و ارتفاع بوته مطلوب (۱۱۰-۱۰۵ سانتی‌متر) برخوردار می‌باشد. لاین مذکور با شباهت بسیار به ارقام محلی، خصوصاً رقم آبجی‌بوجی یا دم‌سرخ، به عنوان رقم برتر با عملکرد و پایداری مناسب انتخاب و در سال ۱۳۹۵ رسماً با نام گیلانه به عنوان یک رقم جدید برنج معرفی گردید. هدف از این مطالعه، ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های امیدبخش حاصل از ارقام محلی برنج با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی GGE بای‌پلات و گزینش و معرفی ژنوتیپ‌های) برتر از نظر عملکرد دانه و پایداری بوده است.

### مواد و روش‌ها

در این آزمایش تعداد ۱۳ ژنوتیپ اصلاح‌شده با دارا بودن خصوصیات کمی و کیفی مطلوب و طول دوره رشد مناسب به همراه دو رقم هاشمی و صالح در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سه منطقه رشت، آبکنار انزلی (گیلان) و ایستگاه تحقیقات برنج چپرسر (تکابن- مازندران) طی دو سال (۱۳۹۴-۱۳۹۳) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مطالعه لاین‌های مورد بررسی شامل RI18430-1، RI18430-12، RI18430-21، RI18430-27، RI18430-41، RI18430-47، RI18430-56، RI18430-60، RI18430-72، RI18430-75، RI18430-77، RI18430-83 و RI18430-87 بودند که تمامی آنها حاصل انتخاب از جمعیت اصلاحی هاشمی × صالح می‌باشند. لاین‌های امیدبخش مورد استفاده در این آزمایش کاملاً خالص بوده و حاصل گزینش از نسل دهم ( $F_{10}$ ) می‌باشند. مساحت هر کرت ۱۸ مترمربع و فاصله نشاکاری ۲۵ سانتی‌متر روی ردیف و ۲۵ سانتی‌متر بین ردیف و تعداد گیاهچه‌ها در هر کپه ۳-۴ عدد بود. در هر سال، خزانه‌گیری در فروردین و نشاکاری در اردیبهشت ماه در مرحله ۴-۵ برگی انجام شد. کلیه عملیات زراعی از قبیل آبیاری، کوددهی، مبارزه با علف‌های هرز و آفات مطابق توصیه‌های فنی

ژنوتیپ × محیط هنگامی که در ترکیب با اثر ژنوتیپ است، بسیار مفهوم دارد. اصطلاح GGE ترکیب G با GE است، بای‌پلاتی که اثر اصلی ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط را در مورد مجموعه داده‌های آزمایش چندمحیطی نشان می‌دهد، GGE بای‌پلات نامیده می‌شود.

در مورد بررسی آثار متقابل ژنوتیپ × محیط دربرنج گزارشات متعددی در دست است و مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته است. سامونته و همکاران (Samonte et al., 2005) با ارزیابی شش ژنوتیپ برنج طی سه سال زراعی (۲۰۰۲-۲۰۰۰) در چهار منطقه تگزاس آمریکا با استفاده از دو روش AMMI و تجزیه رگرسیون مکانی GGE بای‌پلات، ژنوتیپ Cocodrie را به عنوان بهترین رقم از نظر عملکرد دانه و پایداری گزارش نمودند. مصطفوی و همکاران (Mostafavi et al., 2011) با ارزیابی ۱۴ ژنوتیپ برنج در نه محیط (سه منطقه طی سه سال) در شمال ایران با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی GGE بای‌پلات گزارش کردند که سه ژنوتیپ G12، G14 و G4 به ترتیب بیشترین میزان عملکرد دانه و پایداری را داشتند. لاکو و همکاران (Lakew et al., 2014) با ارزیابی ۱۶ ژنوتیپ برنج آپلند در سه منطقه در شمال غربی ایتویپی طی سه سال زراعی (۲۰۱۰-۲۰۰۸) با استفاده از دو روش AMMI و GGE بای‌پلات، ژنوتیپ شماره ۱۵ (G15) را به عنوان رقم پرمحصول پایدار و مقاوم به بیماری بلاست معرفی نمودند. اله‌قلی‌پور (Allahgholipour, 2016) با ارزیابی عملکرد دانه و پایداری ۱۰ رقم محلی و اصلاح‌شده برنج در سه منطقه رشت، آبکنار و چپرسر طی دو سال (۱۳۹۳-۱۳۹۲) با استفاده از روش GGE بای‌پلات گزارش نمودند که لاین حاصل از تلاقی برگشتی [آبجی‌بوجی × (آبجی‌بوجی × صالح)] دارای پایداری متوسط و عملکرد دانه بالا (۵/۵-۵ تن در هکتار) بوده و از دوره رشد مناسب (۱۱۵-۱۱۰ روز)، میزان آمیلوز

$$\eta_{jl}^* = \lambda l^{1/2} \eta_{jl} = \eta_{jl} \lambda l^{1/2} \quad (\text{رابطه ۳})$$

مقدار منفرد برای یک مولفه اصلی برابر ریشه دوم مجموع مربعات توجیه شده توسط آن مولفه اصلی است، بنابراین ریشه دوم مقادیر منفرد برای مولفه اصلی  $\lambda_{lk}$  بر اساس رابطه زیر به دست آمد:

$$\lambda l^{1/2} = (x_l n)^{1/4} \quad (\text{رابطه ۴})$$

$x_l$  مقدار منفرد برای مولفه اصلی  $\lambda_{lk}$  و  $n$  تعداد ژنوتیپ‌ها هستند. پس از مقیاس‌بندی متقارن بردارهای ویژه ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها، مقادیر مورد نیاز برای رسم نمودارهای بای‌پلات حاصل می‌شود (Yan and Kang 2003). نرم‌افزار GGE بای‌پلات به‌طور خودکار تمامی این مراحل را انجام داده و نمودارهای مورد نیاز را تولید می‌کند. به عبارت دیگر میانگین ژنوتیپ‌ها در محیط‌های آزمایش به صورت یک ماتریس دو طرفه به نرم‌افزار معرفی شد. در این تحقیق نمودارهای بای‌پلات بر اساس چهار الگوی زیر رسم شدند:

۱. کدام ژنوتیپ برای کدام محیط مناسب‌تر است (Which- Win- Where).

۲. رتبه‌بندی گرافیکی ژنوتیپ‌ها بر اساس ترکیب همزمان عملکرد دانه و پایداری

۳. رتبه‌بندی گرافیکی ژنوتیپ‌ها بر اساس ژنوتیپ فرضی ایده‌آل

۴. گروه‌بندی محیط‌ها بر اساس میزان تشابه و تفاوت آن‌ها در تفکیک ژنوتیپ‌ها

### نتایج و بحث

مقایسه میانگین عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج نشان داد که لاین RI18430-56 و RI18430-60 به ترتیب با ۷۱۶۷ و ۷۰۲۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را در منطقه رشت در سال اول آزمایش داشتند. سه لاین RI18430-47، RI18430-56 و RI18430-87 به ترتیب با ۶۳۱۰، ۶۱۰۷ و ۶۰۱۰ کیلوگرم در هکتار، بیشترین عملکرد دانه را در سال دوم در منطقه رشت

موسسه تحقیقات برنج کشور انجام شد. عملکرد دانه با برداشت محصول از مساحت ده مترمربع متن هر واحد آزمایشی، پس از حذف حاشیه، با رطوبت ۱۴ درصد محاسبه شد. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین به روش توکی (با استفاده از نرم‌افزار MSTATC ver 1.42 و SPSS ver 9) بطور جداگانه برای هر سال انجام شد و در پایان دو سال آزمایش، پس از اطمینان از یکنواختی واریانس اشتباه‌های آزمایشی با استفاده از آزمون بارتلت، تجزیه واریانس مرکب با فرض تصادفی بودن اثر سال و مکان و ثابت بودن اثر ژنوتیپ و آزمون F بر اساس امید ریاضی میانگین مربعات انجام شد. با معنی دار شدن اثر متقابل ژنوتیپ  $\times$  محیط برای صفت عملکرد دانه، تجزیه پایداری به روش تجزیه رگرسیون مکانی GGE بای‌پلات (Yan and Kang 2003؛ Yan *et al.*, 2001) با استفاده از نرم‌افزار GGEbiplot ver 3.8 انجام شد. تجزیه GGE بای‌پلات بر اساس تجزیه به مقادیر منفرد (Singular value decomposition) با استفاده از رابطه زیر انجام شد:

$$Y_{ij} - \mu - \beta_j = \sum \lambda_l \xi_{il} \eta_{lj} + e_{ij} \quad (\text{رابطه ۱})$$

$Y_{ij}$  میانگین ژنوتیپ  $i$  در محیط  $j$ ،  $\mu$  میانگین کل،  $\beta_j$  اثر اصلی محیط  $j$ ،  $\lambda_l$  مقادیر منفرد برای مولفه اصلی  $l$  (PCI،  $l=1,2$ ) و برای بای‌پلات دو بعدی)،  $\eta_{lj}$  بردار ویژه محیط  $j$  برای PCI و  $e_{ij}$  باقیمانده مدل هستند. این روش در واقع نوعی تجزیه به مولفه‌های اصلی برای مجموع اثر اصلی ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ  $\times$  محیط است که در آن از راهبرد تجزیه به مقادیر منفرد استفاده می‌شود. داده‌های مربوط به ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها به صورت یک ماتریس دو طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقادیر و بردارهای ویژه ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها استخراج می‌شوند. برای مقیاس‌بندی متقارن (Symmetrical scaling) بردارهای ویژه ژنوتیپ‌ها و محیط‌ها از روابط زیر استفاده شد:

$$\xi_{il}^* = \lambda l^{1/2} \xi_{il} = (\lambda_l \xi_{ik}) \lambda l^{1/2} \quad (\text{رابطه ۲})$$

ژنوتیپ‌ها به سال‌ها و مکان‌های مختلف نمی‌تواند مبنای صحیحی برای مقایسه و انتخاب قرار گیرد. وجود اثر متقابل ژنوتیپ × محیط ایجاب می‌کند که عملکرد ژنوتیپ‌ها در دامنه وسیعی از تغییرات محیطی در مکان‌ها و سال‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد تا بر مبنای اطلاعات حاصله بتوان کارآیی مربوط به گزینش و معرفی ارقام را افزایش داد. بنابراین به منظور محاسبه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، تجزیه مرکب برای داده‌های حاصل از ارزیابی خصوصیات مختلف در سال‌ها و مکان‌های مختلف انجام شد. با توجه به معنی دار نبودن تفاوت واریانس‌های اشتباه آزمایشی در آزمایش‌های مختلف بر اساس آزمون بارتلت ( $\text{Chi-square} = 1/545$ )، نسبت به ادغام اشتباهات آزمایشی و انجام تجزیه مرکب مبادرت شد. نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده‌ها نشان داد که اثر سال برای صفت عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود (جدول ۲) و نشان‌دهنده غیریکسان بودن عوامل جوی، خاک و سایر عوامل طی

داشتند. عملکرد دانه ژنوتیپ‌های مورد بررسی در هر سه مکان در سال اول آزمایش بیشتر از سال دوم بود. این موضوع را می‌توان به مناسب بودن شرایط آب و هوایی در سال اول منتسب نمود. لاین‌های RI18430-47 با دامنه عملکرد دانه بین ۶۳۱۰-۵۰۵۰ کیلوگرم در هکتار و رقم اصلاح شده صالح با دامنه عملکرد ۴۶۳۰-۴۳۴۷ کیلوگرم در هکتار و رقم محلی هاشمی با دامنه عملکرد دانه ۳۵۷۳-۳۳۱۷ کیلوگرم در هکتار، کمترین نوسان را در بین ژنوتیپ‌های مورد ارزیابی طی دو سال داشتند (جدول ۱). متفاوت بودن عملکرد دانه ژنوتیپ‌های مورد بررسی در محیط‌های مختلف به وضوح نقش محیط و اهمیت مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در برنامه‌های اصلاحی برنج را نشان می‌دهد. به همین دلیل هر ساله آزمایش‌های مقایسه عملکرد در محیط‌های مختلف برای محصولات زراعی در سرتاسر دنیا انجام می‌شود (Ma et al., 2004). جهت گزینش و معرفی ارقام اصلاح شده جدید، داده‌های حاصل از آزمایش یک سال و یک مکان به علت واکنش متفاوت

جدول ۱ - مقایسه میانگین عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) ژنوتیپ‌های برنج به تفکیک منطقه و سال

Table 1. Mean comparison of grain yield of rice genotypes (kg/ha) for locations and years

ژنوتیپ‌های برنج Rice genotypes	والدین Parents	۱۳۹۳ 2014			۱۳۹۴ 2015		
		رشت Rasht	آبکنار Abkenar	چپرسر Chaparsar	رشت Rasht	آبکنار Abkenar	چپرسر Chaparsar
RI18430-1	هاشمی × صالح	4397 <sup>def</sup>	3290 <sup>f</sup>	5277 <sup>bcd</sup>	4940 <sup>cdef</sup>	4443 <sup>cde</sup>	4663 <sup>ab</sup>
RI18430-12	هاشمی × صالح	5437 <sup>bcd</sup>	3987 <sup>de</sup>	5877 <sup>a</sup>	5093 <sup>cde</sup>	5050 <sup>ab</sup>	4300 <sup>bc</sup>
RI18430-21	هاشمی × صالح	5157 <sup>bcd</sup>	4213 <sup>cd</sup>	4163 <sup>g</sup>	5290 <sup>bcd</sup>	5040 <sup>ab</sup>	5577 <sup>a</sup>
RI18430-27	هاشمی × صالح	3927 <sup>ef</sup>	3637 <sup>ef</sup>	5123 <sup>cde</sup>	5843 <sup>ab</sup>	4140 <sup>e</sup>	5377 <sup>a</sup>
RI18430-41	هاشمی × صالح	4943 <sup>bcd</sup>	5277 <sup>a</sup>	5277 <sup>bcd</sup>	4467 <sup>f</sup>	3563 <sup>f</sup>	3257 <sup>d</sup>
RI18430-47	هاشمی × صالح	5613 <sup>bc</sup>	5667 <sup>a</sup>	5050 <sup>def</sup>	6310 <sup>a</sup>	5260 <sup>a</sup>	5327 <sup>a</sup>
RI18430-56	هاشمی × صالح	7167 <sup>a</sup>	5757 <sup>a</sup>	5410 <sup>abcd</sup>	6107 <sup>a</sup>	4730 <sup>bcd</sup>	5360 <sup>a</sup>
RI18430-60	هاشمی × صالح	7020 <sup>a</sup>	5507 <sup>a</sup>	5787 <sup>ab</sup>	5370 <sup>bc</sup>	4380 <sup>cde</sup>	4610 <sup>ab</sup>
RI18430-72	هاشمی × صالح	5620 <sup>b</sup>	4640 <sup>bc</sup>	5760 <sup>ab</sup>	5277 <sup>bcd</sup>	4470 <sup>cde</sup>	5290 <sup>ab</sup>
RI18430-75	هاشمی × صالح	4460 <sup>cdef</sup>	3680 <sup>ef</sup>	5653 <sup>abc</sup>	5033 <sup>cdef</sup>	4297 <sup>de</sup>	5297 <sup>ab</sup>
RI18430-77	هاشمی × صالح	5763 <sup>b</sup>	4747 <sup>b</sup>	5713 <sup>ab</sup>	5210 <sup>cde</sup>	3573 <sup>f</sup>	5470 <sup>a</sup>
RI18430-83	هاشمی × صالح	4947 <sup>bcd</sup>	4167 <sup>cd</sup>	4510 <sup>fg</sup>	4713 <sup>def</sup>	4797 <sup>abc</sup>	5130 <sup>ab</sup>
RI18430-87	هاشمی × صالح	5157 <sup>bcd</sup>	4637 <sup>bc</sup>	5300 <sup>bcd</sup>	6010 <sup>a</sup>	4243 <sup>e</sup>	4667 <sup>ab</sup>
Saleh	صالح	4347 <sup>def</sup>	4450 <sup>bcd</sup>	4630 <sup>efg</sup>	4653 <sup>ef</sup>	4437 <sup>cde</sup>	4560 <sup>ab</sup>
Hashemi	هاشمی	3573 <sup>f</sup>	3520 <sup>ef</sup>	3530 <sup>h</sup>	3403 <sup>g</sup>	3317 <sup>f</sup>	3340 <sup>cd</sup>

در هر ستون میانگین‌هایی که دارای حروف مشترک هستند، بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی‌داری ندارند. Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 1% probability level, using Tukey's test

دو سال آزمایش بوده که به تبع آن تفاوت‌هایی در عملکرد دانه ایجاد شده است. اثر مکان نیز بسیار معنی‌دار و نشان‌دهنده متفاوت بودن عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج در مکان‌های مختلف و اثر عوامل مختلف محیطی بر عملکرد دانه بود. با وجود معنی‌دار شدن آثار اصلی سال و مکان، اثر متقابل سال × مکان معنی‌دار نبود. از دلایل معنی‌دار نشدن اثر متقابل سال × مکان می‌توان به خنثی شدن اثرات مکان‌ها و سال‌های مختلف با یکدیگر اشاره نمود. به نظر می‌رسد که اثرات مثبت و منفی سال‌ها و مکان‌های مختلف، یکدیگر را خنثی نموده و مانع از معنی‌دار شدن این عامل شده‌اند. ژنوتیپ‌های مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری را از نظر عملکرد دانه داشتند که نمایانگر اختلاف بین ارقام از نظر ژنتیکی می‌باشد. اثر متقابل ژنوتیپ × سال و اثر متقابل سه جانبه ژنوتیپ × سال × مکان برای عملکرد دانه معنی‌دار بود و بدین معنی است که ژنوتیپ‌های مختلف، عملکرد متفاوتی در ترکیبات مختلف سال و مکان داشتند. با توجه به معنی‌دار نشدن اثر متقابل ژنوتیپ × مکان برای عملکرد دانه، به نظر می‌رسد که ژنوتیپ‌های مورد بررسی عکس‌العمل مشابهی در مکان‌های مختلف داشتند، ولی معنی‌دار شدن اثر متقابل سه جانبه ژنوتیپ × سال × مکان برای این صفت نشان‌دهنده وجود اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بود و برای شناسایی ارقام یا ژنوتیپ‌هایی که نوسان عملکرد کمتری از سالی به سال دیگر داشتند، مبادرت به اجرای تجزیه پایداری شد.

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب، سهم هر یک از منابع محیط، ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط برای عملکرد دانه برآورد گردید (جدول ۲).

نتایج نشان داد که سهم اثر اصلی محیط از سهم اصلی ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بیشتر بود که نشان‌دهنده آن است که صفت مذکور در ژنوتیپ‌های مورد مطالعه کمی بیشتر تحت تاثیر عوامل غیرقابل کنترل و تصادفی محیط بوده و سهم اثر اصلی ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط آنها کمتر بود (جدول ۲). نتایج سایر پژوهش‌ها نشان داده است که در بیشتر آزمایش‌های تجزیه پایداری اثر اصلی محیط زیاد است، در حالی که تغییرات توجیه شده به وسیله اثر اصلی ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط که قابل توصیه و تفسیر می‌باشند، کم است. با توجه به اینکه محیط یک عامل غیرقابل کنترل است، از این‌رو در روش GGE بای‌پلات از منابع تغییرات ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط استفاده می‌شود تا بتوان نتایج قابل اعتمادی را به دست آورد (Yan et al., 2000؛ Yan et al., 2007). روش تجزیه گرافیکی GGE بای‌پلات به دلیل استفاده همزمان از اثر اصلی ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط نسبت به روش مرسوم AMMI که تنها اثر متقابل ژنوتیپ × محیط را مد نظر قرار می‌دهد، نتایج جامع و قابل قبول‌تری را ارائه می‌نماید. بنابراین با توجه به سهم قابل توجه اثر اصلی ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط می‌توان انتظار داشت که نتایج حاصل از تجزیه پایداری معتبر و قابل اعتماد باشد.

در این آزمایش، دامنه عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج مورد ارزیابی ۷/۹۱-۲/۰۸ تن در هکتار بود و نتایج حاصل از برآورد میانگین صفات در ژنوتیپ‌های مورد ارزیابی در سه منطقه طی دو سال (۶ محیط) نشان داد که لاین RI18430-56 با ۰/۲۱ ± ۵۷۶۱ کیلوگرم در

جدول ۲ - سهم آثار اصلی ژنوتیپ، محیط و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط برای عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج

Table 2. Proportion of the genotype, environment and G×E interaction effects for grain yield of rice genotypes

S.O.V	منابع تغییر	واریانس (%)
Environment	اثر اصلی محیط	35.4
Genotype	اثر اصلی ژنوتیپ	33.7
Genotype × Environment	اثر متقابل ژنوتیپ × محیط	30.9

ژنوتیپ شامل لاین حاصل از تلاقی برگشتی سپیدرود × (محمدمی × سپیدرود)، لاین حاصل از تلاقی برگشتی آبی‌بوی بوجی × (آبی‌بوی بوجی × صالح)، لاین RI18446-13 (لاین حاصل از تلاقی سالاری × سپیدرود)، حسنی، آبی‌بوی بوجی و لاین RI18435-13 (لاین حاصل از تلاقی اهلمی طارم × صالح) در رأس چندضلعی قرار گرفتند.


برای شناسایی محیط‌های بزرگ و ژنوتیپ‌های برتر، نمودار چندضلعی GGE بای‌پلات، با استفاده از میانگین دو ساله عملکرد دانه در سه منطقه رسم شد. در این شکل، ژنوتیپ‌هایی که حداکثر فاصله را از مبدأ بای‌پلات دارند، توسط خطوط مستقیمی به یکدیگر وصل شده و یک چندضلعی حاصل می‌شود. سپس از مبدأ مختصات، خطوطی عمود بر اضلاع این چندضلعی رسم شده و محیط‌های بزرگ مشخص می‌شوند. ژنوتیپ‌های واقع در رأس چندضلعی هر محیط، ارقام برتر آن محیط محسوب می‌شوند (Yan et al., 2000). بر اساس نحوه قرار گرفتن ژنوتیپ‌ها در چندضلعی بدست آمده، پنج بخش حاصل گردید که ژنوتیپ‌های موجود در هر بخش دارای شباهت زیادی با یکدیگر بودند و پنج ژنوتیپ شامل لاین‌های RI18430-47، RI18430-56، RI18430-77، RI18430-75 و رقم محلی هاشمی در رأس چندضلعی قرار گرفتند (شکل ۱). این ارقام از نظر عملکرد دانه بهترین یا ضعیف‌ترین در بعضی از محیط‌ها و یا همه محیط‌ها بودند، زیرا بیشترین فاصله را از مرکز بای‌پلات داشتند. بر این اساس، لاین‌های RI18430-47، RI18430-56 و RI18430-77 در مناطق آبکنار، رشت و چپر سر بیشترین عملکرد دانه را داشتند، در حالی که ژنوتیپ RI18430-75 و رقم محلی هاشمی علیرغم واقع شدن در رأس چندضلعی، در هیچ یک از محیط‌ها عملکرد دانه خوبی نداشتند و جزء ژنوتیپ‌های ضعیف در این آزمایش بودند. بنابراین، لاین‌های RI18430-41، RI18430-83 و رقم صالح با قرار گرفتن در بخش مربوط به رقم محلی هاشمی و لاین‌های RI18430-1 و

هکتار بیشترین و رقم محلی هاشمی با  $0/21 \pm 3430$  کیلوگرم در هکتار کمترین میزان عملکرد را داشتند. بررسی روند تغییرات میانگین عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های برنج در سه منطقه طی دو سال آزمایش نیز نشان داد که ژنوتیپ‌های مورد ارزیابی روند تغییرات عملکرد ثابت و مشخصی را در شرایط محیطی مختلف نداشتند و از نظر عملکرد دانه در محیط‌های مختلف دارای نوسانات زیادی بودند که این موضوع نشان‌دهنده اثر متقابل ژنوتیپ × محیط از نوع تغییر در رتبه است. با توجه به وجود اثر متقابل تغییر در رتبه یا کراس‌اور، تجزیه واریانس و مقایسه میانگین معمولی قادر به توجیه پایداری و شناسایی ژنوتیپ‌های برتر نیست و لازم است تا با استفاده از روش‌های آماری پیشرفته، ماهیت پیچیده این نوع اثر متقابل بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان ژنوتیپ‌های با عملکرد بیشتر و پایدار را شناسایی نمود.

نتایج حاصل از تجزیه GGE بای‌پلات نشان داد که دو مولفه اصلی اول (معرف اثر اصلی ژنوتیپ) و دوم (معرف اثر متقابل ژنوتیپ × محیط) به ترتیب ۷۷ و ۲۰ درصد و در مجموع ۹۷ درصد از تغییرات کل داده‌ها را توجیه کردند (شکل ۱)، بنابراین دو مولفه اول و دوم می‌توانند به منظور توجیه عملکرد دانه ژنوتیپ‌ها مورد استفاده قرار گیرند. لاکو و همکاران (Lakew et al., 2014) با ارزیابی ژنوتیپ‌های آپلند برنج در محیط‌های مختلف با استفاده از روش GGE بای‌پلات گزارش کردند که دو مولفه اصلی اول و دوم، به ترتیب ۳۳/۹ و ۲۵/۸ درصد و در مجموع ۵۹/۷ درصد از تغییرات کل داده‌ها را برای عملکرد دانه توجیه کردند. اله‌قلی‌پور (Allahgholipour, 2016) نیز با ارزیابی ارقام امیدبخش برنج در سه منطقه طی دو سال زراعی با استفاده از روش GGE بای‌پلات اعلام نمود که دو مولفه اصلی اول و دوم به ترتیب ۶۵ و ۲۷ درصد و در مجموع ۹۲ درصد از تغییرات کل مربوط به عملکرد دانه ارقام را توجیه می‌نمایند. در این ارزیابی، شش

به منظور انتخاب ژنوتیپ پرمحصول و پایدار با استفاده از روش GGE بای پلات سه محیط بزرگ واقعی را شناسایی و ژنوتیپ شماره ۱۲ را به عنوان ژنوتیپ برتر و ایده آل معرفی نمودند. اله‌قلی‌پور (Allahgholipour, 2016) نیز با ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط با استفاده از روش GGE بای پلات دو محیط بزرگ و مجزا را شناسایی و ژنوتیپ‌های RI18446-13، BC25 و BC4 را به عنوان لاین‌های برتر معرفی نمودند.

RI18430-27 با قرار گرفتن در بخش مربوط به لاین RI18430-75 جزء ارقام با عملکرد دانه ضعیف می‌باشند (شکل ۱). در این آزمایش، دو محیط بزرگ و مجزا مشخص گردید. اولین محیط بزرگ واقعی شامل مناطق رشت و آبکنار با ژنوتیپ‌های برتر RI18430-47، RI18430-56، RI18430-60، RI18430-87، RI18430-12 و RI18430-72 و دومین محیط بزرگ واقعی شامل منطقه چپ‌سر با ژنوتیپ برتر RI18430-77 بود. مصطفوی و همکاران (Mostafavi *et al.*, 2011)



شکل ۱ - نمودار چندضلعی بای پلات برای شناسایی محیط‌های بزرگ و ژنوتیپ‌های برتر برنج

Fig. 1. GGE biplot polygon for identification of mega-environments and superior rice genotypes

پایداری و عملکرد ژنوتیپ‌ها استفاده می‌شود. خط افقی با دایره و پیکان نشان‌دهنده پایداری است و هر ژنوتیپی که به این محور نزدیک باشد، پایدارتر است (Yan *et al.*, 2000). خط عمودی نشان‌دهنده میانگین عملکرد ژنوتیپ‌ها است و ژنوتیپ‌های موجود در سمت چپ این خط دارای عملکرد پایین‌تر و ژنوتیپ‌های موجود در سمت راست این خط دارای


استفاده از نمودار دوبعدی مختصات تستر متوسط در روش GGE بای پلات از روش‌های مفید و موثر تجزیه پایداری به شمار می‌رود و اطلاعات خوبی از نحوه تظاهر ژنوتیپ‌های مورد بررسی ارائه می‌دهد (Kaya *et al.*, 2006؛ Samonte *et al.*, 2005). از نمودار محور پایداری یا دوبعدی مختصات تستر متوسط (Average tester coordinate) برای بررسی همزمان





RI18430-75 و هاشمی بیشترین فاصله را از این ژنوتیپ فرضی دارند و به عنوان نامناسب‌ترین ژنوتیپ‌ها در این آزمایش بودند. در بین ژنوتیپ‌های انتخابی از نظر میزان عملکرد دانه و پایداری، دو لاین RI18430-12 و RI18430-47 به دلیل برخورداری از میزان آمیلوز متوسط، طول دوره رشد و ارتفاع بوته مناسب و دارا بودن میزان برنج سفید بالا و برنج خرد کمتر، به عنوان لاین‌های برتر شناسایی شدند. لازم به ذکر است که سه لاین RI18430-60، RI18430-72 و RI18430-87 به دلیل دارا بودن میزان آمیلوز بالا (۲۵-۲۴ درصد) و متعاقب آن عدم کیفیت پخت مناسب و میزان برنج خرد بالا و لاین RI18430-56 با دارا بودن خصوصیات کمی و کیفی مناسب، به دلیل خرد شدن دانه برنج بعد از پخت، علیرغم پایداری و دارا بودن عملکرد دانه مناسب مورد گزینش نهایی واقع نشدند (جدول ۵).

روی محور میانگین عملکرد ژنوتیپ‌ها نشان داده می‌شود و هر ژنوتیپی که نزدیک‌ترین فاصله را از این ژنوتیپ فرضی داشته باشد، به عنوان ژنوتیپ برتر محسوب می‌شود (Yan and Kang, 2003). برای استفاده از ژنوتیپ مطلوب به عنوان مرکز ارزیابی، دایره‌های هم‌مرکزی در بای‌پلات به منظور تعیین گرافیکی فاصله بین ژنوتیپ‌های مورد ارزیابی با ژنوتیپ مطلوب ایجاد شد (شکل ۳). هر ژنوتیپی که در مرکز دایره‌ها بوده و یا نزدیک‌ترین فاصله را از این ژنوتیپ فرضی داشته باشد، به عنوان یک ژنوتیپ برتر با عملکرد و پایداری بالا محسوب می‌شود. در شکل ۳، دو لاین RI18430-12 و RI18430-87 کمترین فاصله را از ژنوتیپ مطلوب فرضی دارد، بنابراین برترین ژنوتیپ‌ها هستند و پس از آنها لاین‌های RI18430-83، RI18430-21 و RI18430-60 مناسب‌ترین ژنوتیپ‌ها بودند. در مقابل، ژنوتیپ‌های



شکل ۳- نمودار ژنوتیپ مطلوب بای‌پلات برای مقایسه ژنوتیپ‌های برنج بر اساس پایداری و عملکرد دانه

Fig. 3. GGE biplot for comparing the studied rice genotypes with the ideal genotype

" ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های... "

جدول ۳- رتبه‌بندی ژنوتیپ‌های برنج مورد ارزیابی از نظر عملکرد دانه و پایداری

Table 3. Ranking of the studied rice genotypes based on grain yield and stability

ژنوتیپ‌های برنج Rice genotype	رتبه عملکرد دانه Rank of grain yield	رتبه پایداری Rank of stability	میانگین دو رتبه Mean of ranks	رتبه نهایی Final rank	عملکرد دانه Grain yield	پایداری Stability
RI18430-1	11	4	7.5	7	Intermediate to Low	متوسط به پایین
RI18430-12	6	1	3.5	3	Intermediate to High	High
RI18430-21	7	3	5	5	Intermediate to High	High
RI18430-27	10	5	7.5	7	Intermediate to Low	Low
RI18430-41	11	7	9	9	Intermediate to Low	Intermediate
RI18430-47	2	7	4.5	4	High	پرمحصول
RI18430-56	1	3	2	1	High	پرمحصول
RI18430-60	3	3	3	2	High	پرمحصول
RI18430-72	4	3	3.5	3	Intermediate to High	متوسط به بالا
RI18430-75	8	8	8	8	Intermediate to Low	متوسط به پایین
RI18430-77	5	6	5.5	6	Intermediate to High	متوسط به بالا
RI18430-83	9	2	5.5	6	Intermediate to Low	متوسط به پایین
RI18430-87	6	1	3.5	3	Intermediate to High	متوسط به بالا
Hashemi	13	7	10	10	Low	کم محصول
Saleh	12	3	7.5	7	Intermediate to Low	متوسط به پایین

جدول ۴- خصوصیات مهم کمی و کیفی ژنوتیپ‌های برنج انتخابی برتر

Table 4. Important quantitative and qualitative characteristics of the superior selected rice genotypes

ژنوتیپ‌های برنج Rice genotype	رتبه پایداری و عملکرد دانه Rank of stability and grain yield	عملکرد دانه Grain Yield (kg.ha <sup>-1</sup> )	میزان آمیلوز Amylose content (%)	ارتفاع بوته Plant height (cm)	دوره رشد Growth duration (day)	برنج سفید Head rice recovery (%)	برنج خرد Broken rice (%)
RI18430-12	1	4960	21.8	112.2	112.2	62.3	8.9
RI18430-47	2	5540	21.4	107.3	115	53.9	12.5
RI18430-56	3	5760	21.3	110.3	115	56.8	17.7
RI18430-60	3	5540	24	109.3	121	54	20.1
RI18430-72	3	5180	25	109.6	115	50.8	27.3
RI18430-87	4	5000	24.6	114.3	125	55.5	20

RI18430-47 شبیه رقم اصلاح شده صالح بوده و همانند آن دارای دانه‌های بلند و قطور است. دانه‌ها دارای ریشک کوتاه به رنگ سفید روشن تا زرد بوده و کیفیت پخت آن به دلیل داشتن میزان آمیلوز متوسط، بسیار بهتر از رقم صالح است، اما نسبت به ارقام محلی کیفیت پخت ضعیف‌تری دارد. ارتفاع بوته در هر دو ژنوتیپ انتخابی کوتاه بوده و جزء ژنوتیپ‌های زودرس تا میان‌رس محسوب می‌شوند.

دو ژنوتیپ انتخابی (RI18430-12 و RI18430-47)، حاصل تلاقی بین رقم اصلاح شده صالح به عنوان والد مادری و رقم محلی هاشمی به عنوان والدی پدری هستند. لاین RI18430-12 از نظر مورفولوژی و ساختار ظاهری شبیه ارقام محلی بوده و دارای دانه‌های بلند و ریشک‌های کوتاه به رنگ سیاه می‌باشد. کیفیت پخت این لاین خالص بسیار عالی و شبیه کیفیت پخت ارقام محلی مانند هاشمی و دمسیاه است. در مقابل لاین

## References

## منابع مورد استفاده

- Allahgholipour, M. 2016.** Genotype  $\times$  environment interaction effect in rice genotypes using GGE biplot. *Cereal Res.* 6 (1): 1-14. (In Persian with English abstract).
- Anonymous. 2015.** Agricultural statistics in Iran. The first volume of crops in the growing season of 2013-2014. Ministry of Jihad-e-Agriculture of Iran, Planning and Economic Deputy, Office of Statistics and Information Technology.
- Becker, H. C. 1981.** Correlation among some statistical measures of phenotypic stability. *Euphytica*, 30: 835-840.
- FAO. 2015.** <http://www.faostat.fao.org>.
- Gabriel, K. R. 1971.** The biplot graphic display of matrices with application to principal component analysis. *Biometrika*, 58: 453-467.
- Gauch, H. G. 2006.** Statistical analysis of yield trials by AMMI and GGE. *Crop Sci.* 46: 1488-1500.
- Huhn, M. 1996.** Nonparametric Analysis of Genotype  $\times$  Environment Interactions by Ranks, p. 235-271. In: M. S. Kang and H. G. Gauch, Jr. (Eds.), *Genotype-by-Environment Interaction*, CRC Press, Boca Raton, FL., USA.
- Kaya, Y., M. Akcura and S. Taner. 2006.** GGE-biplot analysis of multi-environment yield trials in bread wheat. *Turk. J. Agric. Forest.* 30: 325-337.
- Khush, G. S., 2005.** What it will take to feed 5.0 billion rice consumers in 2030. *Plant Molecular Biology* 59: 1-6.
- Lakew, T., S. Tariku, T. Alem and M. Bitew. 2014.** Agronomic performances and stability analysis of upland rice genotypes in North West Ethiopia. *Int. J. Sci. Res. Pub.* 4 (4):1-9.
- Ma, B. L., W. Yan, L. M. Dwyer, J. Fregeau-Reid, H. D. Voldeng, Y. Dion and H. Nass. 2004.** Graphic analysis of genotype, environment, nitrogen fertilizer and their interaction on spring wheat yield. *Agron. J.* 96: 169-180.
- Moreno-Gonzalez, J., J. Crossa and P. L. Cornelius. 2004.** Genotype  $\times$  environment interaction in multi-environment trials using shrinkage factors for AMMI models. *Euphytica*, 137: 119-127.
- Mostafavi, K., S. S. Hosseini Imeni and M. Zare. 2011.** Stability analysis of rice genotypes based GGE biplot method in north of Iran. *J. Appl. Sci. Res.* 7(11): 1690-1694.

- Samonte, S. O. P. B., L. T. Wilson, A. M. McClung and J. C. Medley. 2005.** Targeting cultivars onto rice growing environments using AMMI and SREG GGE biplot analyses. *Crop Sci.* 45: 2414–2424.
- Yan, W., L. A. Hunt, Q. Sheng and Z. Szlavnic. 2000.** Cultivar evaluation and mega-environment investigation based on the GGE biplot. *Crop Sci.* 40: 597–605.
- Yan, W., P. L. Cornelius, J. Crossa and L. A. Hunt. 2001.** Two types of GGE biplots for analyzing multi-environment trial data. *Crop Sci.* 41: 656-663.
- Yan, W. and M. S. Kang. 2003.** GGE biplot analysis: A graphical tool for breeders, geneticists and agronomists. CRC Press, Boca Raton, FL., USA.
- Yan, W., M. S. Kang, B. Ma, S. Woods and P. L. Cornelius. 2007.** GGE biplot vs. AMMI analysis of genotype-by-environment data. *Crop Sci.* 47: 643–655.
- Zobel, R., W. M. J. Wright and H. G. Gauch. 1988.** Statistical analysis of a yield trial. *Agron. J.* 80: 388–393.

## Analysis of grain yield stability of new rice (*Oryza sativa* L.) genotypes originated from Iranian local cultivars

Allahgholipour, M. <sup>1</sup>

### ABSTRACT

Allahgholipour, M. 2017. Analysis of grain yield stability of new rice (*Oryza sativa* L.) genotypes originated from Iranian local cultivars. **Iranian Journal of Crop Sciences**. 18(4): 288-301. (In Persian).

Genotype  $\times$  environment interaction (GEI) effect is very important for plant breeders. Identifying the GEI effect would help breeders for better evaluation of different genotypes and select the superior genotypes based on both high grain yield and its stability. In this study, thirteen advanced rice genotypes originated from the Iranian local rice varieties including two local rice cultivars (Hashemi and Saleh) as checks were evaluated in randomized complete block design with three replications at three locations (Rasht, Abkenar and Chaparsar) in two rice growing seasons (2014-2015). Analysis of variance indicated significant differences among rice genotypes for grain yield in three locations. GGE biplot analysis revealed that the first principal component (PC<sub>1</sub>) explained 77% of the total variation while PC<sub>2</sub> explained 20%. Thus, the two components together accounted for 97% of the G + GE variation for the grain yield in all environments. Two distinct mega-environments were also identified. The first mega-environment included; Rasht and Abkenar in which genotypes RI18430-47, RI18430-56, RI18430-87, RI18430-12 and RI18430-72 were the winners. The second mega-environment included; Chaparsar in which genotype RI18430-77 was the winner. RI18430-12 and RI18430-47 genotypes were selected as superior genotypes for their higher grain yield and its stability, intermediate amylose content, early maturity, suitable plant height, high head rice recovery and lower breakage. These two genotypes have been obtained from crossing between Saleh (improved cultivar) as a female parent and Hashemi (local) as male parent. Considering phenotypic characteristics, RI18430-12 was similar to the local rice variety with long grains and short black awns. The cooking quality of this line was as good as local rice cultivars such as Hashemi and Domsiah. However, RI18430-47 genotype was similar to Saleh cultivar with bold and long grains. RI18430-47 has short awns and its grain quality with intermediate amylose content is better than Saleh cultivar, but lower than Hasehmi. Plant height of these two selected rice genotypes are short, and could be classified in early to medium maturity groups.

**Key words:** Amylose content, Genotype  $\times$  Environment interaction, GGE biplot analysis, Grain yield stability and Rice.

Received: November, 2016

Accepted: February, 2017

1. Assistant Prof., Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Rasht, Iran. (Email: mehrzadallahgholipour@yahoo.com)