

ارزیابی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی جو پاییزه غرب ایران Genetic diversity of winter barley landraces collected from west of Iran

عظمی خرایی^۱، محمد مقدم^۲ و سعید نورمحمدی^۳

چکیده

خرابی، ع. م. مقدم و س. نور محمدی. ۱۳۹۰. ارزیابی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی جو پاییزه غرب ایران. مجله علوم زراعی ایران. ۱۳(۳): ۶۷۱-۶۸۳.

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در جوهای پاییزه غرب ایران، ۳۲ توده بومی و چهار ژنوتیپ شاهد EBYTC74-10، EBYTC74-12 و ماکوبی در یک آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۷۹-۸۰ در مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان مورد ارزیابی قرار گرفته و تعداد ۲۳ صفت زراعی براساس دستورالعمل مؤسسه بین‌المللی ذخایر توارثی (IPGRI) اندازه‌گیری شدند. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که توده‌های مورد مطالعه از نظر اکثر صفات اختلاف معنی‌داری داشتند. این موضوع نشان دهنده وجود اختلاف ژنتیکی قابل ملاحظه در ژرم پلاسم مورد مطالعه است. توده بومی جو دو ردیفه گیلان غرب با عملکرد دانه ۶۰۵۴ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را داشته و با میانگین هر چهار رقم شاهد و میانگین کل توده‌ها اختلاف معنی‌داری نشان داد گروه‌بندی این توده‌ها با روش تجزیه خوش‌های انجام و سه خوش‌های حاصل شد. توزیع توده‌ها در درون خوش‌های الگوی نسبی از نقاط جمع‌آوری شده در مناطق غرب کشور را نشان داد. عدم مطابقت کامل توده‌ها از محل‌های جمع‌آوری آنها در تجزیه خوش‌های می‌تواند به علت تبادل ژرم پلاسم بین مناطق مختلف غرب کشور و یا مشخص نبودن مبدأ دقیق آن‌ها باشد. وراثت پذیری عمومی عملکرد دانه و اجزای آن، یعنی تعداد پنجه‌های بارور، طول سنبله اصلی، تعداد دانه در سنبله اصلی و وزن هزار دانه، به ترتیب ۰/۷۹، ۰/۸۲، ۰/۹۸ و ۰/۹۳ و ۰/۹۳ براورد شد. با توجه به بالا بودن وراثت پذیری عمومی، ضریب تغییرات ژنتیکی و میزان بازده ژنتیکی در بین توده‌ها برای عملکرد دانه و اجزای آن، می‌توان اظهار داشت که امکان گزینش ژنوتیپ‌های مطلوب و استفاده از آن‌ها در دورگ‌گیری برای تولید لاین‌های اصلاح شده وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: تجزیه خوش‌های، تنوع ژنتیکی، توده‌های بومی و جو.

تاریخ دریافت: ۸/۹/۹۰ تاریخ پذیرش: ۹/۹/۹۰

۱- عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران (مکاتبه کننده)

(پست الکترونیک: az42095@yahoo.com)

۲- استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

۳- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

جو تنوع ژنتیکی زیادی در دنیا، به ویژه در مناطق پیدایش آن، وجود دارد. ایران نیز یکی از مراکز تنوع جو در منطقه خاورمیانه و هلال حاصلخیز به شمار می‌رود که به دلیل وجود تنوع ژنتیکی وسیع و بومی بودن جو در این منطقه، دارای اهمیت خاصی برای بهثزادگران است. استفاده از ارقام بومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در برنامه‌های دورگ گیری حائز اهمیت است (Karimi, 1996, 1999). گندمکار (Gandomkar, 1999) با مطالعه تنوع ژنتیکی ۲۹ توده بومی جو پاییزه شمال غرب ایران از لحاظ ۳۲ صفت در منطقه اردبیل نشان دادند که برای اکثر صفات مورد بررسی تفاوت ژنتیکی معنی داری بین آن‌ها وجود داشت. این محققان توده‌های بومی مورد مطالعه را در چهار خوشه گروه بندی کردند. فاریس و کلینک (Faris and Klink, 1982) گزارش نمودند که بین ارقام جو از نظر تاریخ ظهرور سنبه تنوع زیادی وجود دارد. سکارلی و همکاران (Ceccarelli *et al.*, 1987) نتاج تک بوته حاصل از جوهای بومی سوری و اردن را از نظر صفات زراعی، مورفولوژیکی و کیفیت محصول در شمال سوریه مورد ارزیابی قرارداده و تنوع زیادی در بین و درون مناطق جمع آوری مشاهده کردند. در بین نتاج تک بوته مورد ارزیابی، ژنوتیپ‌هایی که دارای عملکرد بالاتر و صفات زراعی مطلوب‌تری نسبت به توده‌های بومی بودند، شناسایی شدند. آن‌ها بهره‌برداری از این مواد گیاهی را در برنامه‌های اصلاحی مورد تأکید قرار دادند. هادادو و همکاران (Hadado *et al.*, 2010) با بررسی توده‌های بومی جو اتیوپی به کمک نشانگرهای مولکولی عنوان کردند که تنوع زیادی درون این جمیعت‌ها وجود داشته و پتانسل آن‌ها را از نظر دارا بودن الی‌های مفید، مورد تأکید قرار دادند. این محققان همچنین وجود یک نوع شبی سازگاری به ارتفاعات مختلف را بین این توده‌ها گزارش کردند. عشقی و آکوندوا (Eshghi and Akhundova, 2010) ۶۳ نمونه از جوهای

مقدمه

منابع ژنتیکی گیاهی، علاوه بر اینکه اساس توسعه کشاورزی به شمار می‌رونده، همانند عوامل محافظتی در برابر تغییرات محیطی عمل می‌کنند. بنابراین فرسایش این منابع می‌تواند امنیت غذایی در جهان را تهدید نماید. اصلاح نباتات و سیستم‌های کشاورزی مدرن تنوع ژنتیکی جو زراعی را کاهش داده است (Nevo *et al.*, 1986). نیاز به حفظ و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی گیاهی، از جمله توده‌های بومی، در برنامه‌های اصلاحی برای کنترل مشکلات غیرقابل پیش‌بینی در آینده ضرورت داشته و چشم‌انداز از بین رفتن تنوع ژنتیکی به همراه تقاضای روزافزون به این منابع، آن‌ها را در مرکز توجه جهانی جای داده است (Abde Mishani and Shahnejat Boushehri, 1992).

تنوع و گزینش دو رکن اصلی هر برنامه اصلاحی محسوب می‌شوند و گزینش در صورتی کارایی بالایی دارد که در صفت مورد مطالعه، تنوع مطلوبی از نظر ژنتیکی موجود باشد متخصصان اصلاح نباتات از تنوع ژنتیکی موجود جهت استفاده در برنامه‌های اصلاحی و یا انتقال ژن‌های مطلوب به ارقام دیگر استفاده می‌نمایند (Ramanujam *et al.*, 1974; Ehdaei, 1994). بنابراین، متخصصان اصلاح نباتات به حفظ ذخایر ژنتیکی بستگی دارد (Sakti and Khadag, 1995).

در بانک‌های ژن با ارزیابی ژنوتیپ‌های موجود و محاسبه فواصل ژنتیکی آنها می‌توان تعداد زیادی ژنوتیپ را در دسته‌های محدود گروه‌بندی نمود. روش خوشبندی به خصوص در مواردی که تعداد توده‌ها زیاد باشد، برای جلوگیری از اتلاف وقت مفید است، زیرا براساس این روش خوشبندی دور یا نزدیک شناخته شده و متخصص بهثزادی برنامه دورگ گیری را بر اساس عدم قربت ژنوتیپ‌ها تنظیم می‌نماید. محققان مختلف نشان داده‌اند که در ژرم پلاسم‌های

نبودن مبدأ دقیق آنها عنوان نمودند. مطالعات مختلفی برای تعیین الگوپذیری تنوع ژنتیکی و جغرافیایی غلات و سایر گیاهان زراعی صورت گرفته است و نشان داده است که تنوع در سازگاری نمونه‌ها به متفاوت بودن مناطق رویش آنها مربوط می‌شود. در این رابطه اگر از نمونه‌هایی از توده‌های بومی هر منطقه با مبدأ معین استفاده شود، اغلب مطابقت خوبی بین تنوع ژنتیکی و محیط‌های جغرافیایی وجود خواهد داشت (Kato and Yokoyama, 1992).

با توجه به نقش تنوع در پیشبرد برنامه‌های به نژادی و اهمیت توده‌های بومی در ایجاد تنوع، این تحقیق به منظور دستیابی به میزان تنوع موجود در بین توده‌های بومی جو پاییزه غرب کشور و گروه‌بندی آنها برای استفاده در برنامه‌های اصلاحی انجام شد.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق ۳۲ توده بومی جو پاییزه از مناطق غربی کشور شامل استان‌های لرستان، کردستان، همدان، کرمانشاه و ایلام (جدول ۱) به همراه چهار رقم شاهد (EBYTC74-10، EBYTC74-12، EBYTC74-2)، ماکویی (در سال زراعی ۱۳۷۹-۸۰ براساس طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان به صورت دیم کشت شدند. هر کرت شامل چهار خط کاشت به طول ۴ متر به فاصله ۲۰ سانتی‌متر بود و فاصله بوته‌ها روی ردیف ۵ سانتی‌متر در نظر گرفته شد. برای اندازه‌گیری صفات در هر کرت ۱۰ بوته به طور تصادفی انتخاب گردید. در هر کرت ردیف اول و آخر حذف و محصول دو ردیف وسط برای اندازه‌گیری عملکرد برداشت شدند. صفات اندازه‌گیری شده عبارت بودند از: عملکرد ماده خشک، ارتفاع بوته، تعداد کل پنجه‌ها، تعداد پنجه‌های بارور، درصد باروری پنجه‌ها (نسبت تعداد پنجه‌های بارور به کل پنجه‌ها)، طول سنبله اصلی، طول ریشک در سنبله اصلی، تعداد دانه در

بدون پوشینه از ایکاردا را از لحاظ صفات زراعی، مورفو‌لوزیکی و نشانگرهای RAPD مورد مطالعه قرار دادند. در بین ۲۰ صفت زراعی و مورفو‌لوزیکی مورد ارزیابی، تنوع قابل ملاحظه‌ای از نظر عملکرد دانه در واحد کرت، وزن هزار دانه و طول پدانکل دیده شد. افرون براین وراثت پذیری بالایی برای برخی صفات از جمله تعداد دانه در سنبله و تعداد پنجه‌ها به دست آمد. آن‌ها این دو صفت را برای گزینش غیرمستقیم به منظور بهبود عملکرد دانه توصیه کردند. تجزیه خوش‌های نمونه‌ها از نظر صفات زراعی و نیز نشانگرهای RAPD آن‌ها را به گروه‌های مختلف تقسیم کرد. ابراهیم و همکاران (Ibrahim et al., 2011) یک مجموعه از ژنوتیپ‌های جو (۳۹ ژنوتیپ از ایکاردا و یک ژنوتیپ بومی از مصر) را از لحاظ صفات زراعی مورد ارزیابی قرار دادند. بین ژنوتیپ‌ها از نظر صفات مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری وجود داشت. تجزیه خوش‌های آن‌ها را در پنج گروه تقسیم بندی کرد. ولکون (Valkoun, 1992) با بررسی ژرم پلاسم جو موجود در بانک ژن وزارت کشاورزی آمریکا که از کشورهای مختلف از جمله ایران جمع‌آوری شده بودند، مشاهده کردند که نمونه‌های ایران، یمن و پاکستان غالباً پاکوتاه و بیش از ۹۰ درصد از نمونه‌های هند، ژاپن، نیپال و یوگسلاوه از نوع شش ردیفه هستند. وی تنوع موجود در صفات را عمدتاً به علت تفاوت در مبدأ بذر مربوط دانست.

بابایی و وجданی (Babaei and Vojdani, 1992) آزمایشی را روی ۳۲۰ نمونه از مجموعه جوهای ۲۹ کشور موجود در کلکسیون جو بانک ژن ملی ایران بر اساس ۱۰ صفت انجام دادند. براساس تجزیه خوش‌های روی چهار صفت طول سنبله، تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته و وزن بوته، ژنوتیپ‌های جو مربوط به کشورهای مختلف در ۹ گروه قرار گرفتند. آنها غیریکنواختی‌هایی در بین این ۹ گروه مشاهده کردند و دلیل آن را تبادل ژرم پلاسم بین کشورها و یا مشخص

محاسبات آماری شامل واریانس ژنتیکی و بازده ژنتیکی بین و درون توده‌ها، ضرایب تغییرات ژنتیکی و محیطی و راثت‌پذیری عمومی بود. برای برآورد واریانس ژنتیکی بین توده‌ها از امید ریاضی میانگین مربعات در تجزیه واریانس استفاده شد. به منظور برآورد واریانس ژنتیکی درون توده‌ها، ابتدا واریانس محیطی برای هر صفت از طریق ارقام شاهد محاسبه و از واریانس فتوتیپی درون هر توده کسر گردید و تفاضل آنها به عنوان واریانس ژنتیکی درون توده‌ها در نظر گرفته شد.

سبله اصلی، عملکرد دانه در سبله اصلی، عملکرد دانه در بوته، نسبت عملکرد دانه سبله اصلی به عملکرد دانه در بوته، عملکرد کاه در بوته، تراکم دانه در سبله اصلی، عملکرد دانه در کرت، عملکرد کاه در کرت، شاخص برداشت، میزان پوشش سبز در کرت، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، تعداد روز تا ظهور سبله، وزن هزار دانه و تعداد بوته در کرت. برای محاسبه میزان پوشش سبز، تعداد بذرهای جوانه زده در هر کرت یک هفته بعد از سبز شدن در واحد سطح (متر مربع) شمارش شد.

جدول ۱- مشخصات نوع و محل جمع‌آوری توده‌های بومی جو

Table 1. Type and place of collection of barley landraces

نوع سبله Type of spike	محل جمع‌آوری Location of collection	نام توده‌های جو Barley landraces
دو ردیقه	بروجرد	1 Broujerd
دو ردیقه	خرم‌آباد	2 Khoramabad
دو ردیقه	ایلام	3 Ilam
دو ردیقه	قصیر شیرین	4 Ghasr Shirin
دو ردیقه	اسلام‌آباد غرب	5 Eslamabad Gharb
شش ردیقه	سقز	6 Saghez
شش ردیقه	همدان	7 Hamedan
شش ردیقه	سنندج	8 Sanandaj
دو ردیقه	مریوان	9 Marivan
شش ردیقه	ملایر	10 Malayer
دو ردیقه	بیجار	11 Bijar
دو ردیقه	همدان	12 Hamedan
دو ردیقه	خرم‌آباد	13 Khoramabad
شش ردیقه	بروجرد	14 Broujerd
دو ردیقه	دهلران	15 Dehloran
شش ردیقه	ملایر	16 Malayer
دو ردیقه	قروه	17 Ghorveh
دو ردیقه	کرمانشاه	18 Kermanshah
شش ردیقه	توبیسر کان	19 Touicerkan
شش ردیقه	نهاوند	20 Nahavand
دو ردیقه	سنندج	21 Sanandaj
دو ردیقه	الیگودرز	22 Aligoudarz
دو ردیقه	اسلام‌آباد غرب	23 Eslamabad Gharb
دو ردیقه	قروه	24 Ghorveh
دو ردیقه	همدان	25 Hamedan
شش ردیقه	ملایر	26 Malayer
شش ردیقه	توبیسر کان	27 Touicerkan
دو ردیقه	سقز	28 Saghez
دو ردیقه	گیلان غرب	29 Gilan Gharb
دو ردیقه	گیلان غرب	30 Gilan Gharb
دو ردیقه	کرند	31 Kerend
دو ردیقه	کرمانشاه	32 Kermanshah
شش ردیقه	E BYTC74-2	33 EBYTC74-2
شش ردیقه	E BYTC74-10	34 EBYTC74-10
شش ردیقه	E BYTC74-12	35 EBYTC74-12
شش ردیقه	رقم ماکویی	36 cv. Makouee

بوته (۱۹/۴۹ درصد)، تعداد دانه در سنبله اصلی (۷/۸۰ درصد) و وزن هزار دانه (۸/۷۳ درصد)، کمتر از عملکرد دانه به دست آمد. بنابراین، مشخص است که عملکرد دانه بیشتر از اجزای آن از تغییرات محیطی متأثر می‌شود.

توده بومی شماره ۳۰ (جو دو ردیفه گیلان غرب) با میانگین عملکرد دانه ۶۰۵۴ کیلو گرم در هکتار، بیشترین عملکرد دانه را داشت و با میانگین هر چهار رقم شاهد یعنی ژنوتیپ‌های EBYTC74-2 (شماره ۳۳)، EBYTC74-10 (شماره ۳۴)، EBYTC74-12 (شماره ۳۵) و رقم ماکویی (شماره ۳۶) و میانگین کل توده‌ها به ترتیب با عملکرد دانه ۴۲۴۰/۳، ۴۴۰۲/۵، ۴۶۶۵/۷ کیلو گرم در هکتار، در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی‌دار داشت. توده شماره ۳۰ که دارای بالاترین عملکرد دانه بود، از لحاظ برخی از صفات مانند ماده خشک، تعداد پنجه و وزن هزار دانه و همچنین از نظر فنوتیپ و شکل ظاهری در مزرعه، دارای ارزش بالاتری بود. از لحاظ شاخص برداشت هیچ کدام از توده‌های بومی با چهار رقم شاهد اختلاف معنی‌داری نداشتند. از نظر تعداد دانه در سنبله اصلی، توده‌های شماره ۱۶، ۱۰، ۷ و ۲۷ که همگی شش ردیفه بودند با میانگین‌های ۵۳/۴، ۵۱/۵، ۵۱/۵ و ۴۹/۵، بیشترین تعداد دانه در سنبله دارا بودند. توده‌های شماره ۱۵، ۱۱، ۱۳ و ۲۳ به ترتیب با میانگین طول سنبله ۹/۵، ۹/۳، ۹/۹، ۲/۳ و ۸/۱ سانتی‌متر، نسبت به میانگین کل دارای برتری بودند. از لحاظ وزن هزار دانه توده‌های ۱۵، ۱۳، ۲۴ و ۲۲ به ترتیب با میانگین‌های ۵۲/۳، ۵۲/۸، ۵۱/۹ و ۵۱/۱ گرم، دارای بیشترین مقدار وزن هزار دانه بودند. این توده‌ها از جوهرهای دو ردیفه بودند. در مورد تراکم دانه در سنبله اصلی ارقام شاهد و توده‌های شماره ۱۶، ۱۰، ۸، ۲۰، ۲۰ و ۲۷ نسبت به میانگین کل (۵/۴) اختلاف معنی‌داری داشتند (جدول ۳).

بازده ژنتیکی بین و درون توده‌ها، مطابق رابطه‌های زیر برآورده شد (Falconer and Mackay, 1996).

$$\Delta G_B = \frac{K \delta^2 g}{\sqrt{\delta^2 g + \delta^2 e} / r} \quad (1)$$

$$\Delta G_w = \frac{K \delta^2 gw}{\sqrt{\delta^2 gw + \delta^2 ew}} \quad (2)$$

ΔG_w و ΔG_B به ترتیب بازده ژنتیکی بین و درون توده‌ها، K دیفرانسیل گزینش استاندارد شده (با شدت گزینش ۱۰ درصد)، δ^2 و δ^2 به ترتیب واریانس ژنتیکی بین توده‌ها و واریانس خطای آزمایش، r تکرار، δ^2_{gw} واریانس ژنتیکی درون توده‌ها هستند. به منظور گروه‌بندی توده‌های بومی جو، تجزیه خوش‌های با استفاده از روش WARD انجام شد. برای تعیین ارزش هر خوش‌ه از نظر صفات مورد مطالعه، درصد انحراف میانگین هر خوش‌ه از میانگین کل خوش‌های نیز محاسبه شد.

نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجزیه داده‌های مربوط به ۳۲ توده بومی و ۴ رقم شاهد از نظر ۲۳ صفت، در جدول ۲ ارائه شده است. بین توده‌های جو از نظر کلیه صفات تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. این موضوع نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی قابل توجه در ژرم‌پلاسم مورد بررسی است. ضریب تغییرات خطای آزمایش از ۰/۰۳۵ برای تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، تا ۲۸/۹۴ درصد برای عملکرد دانه در بوته، متفاوت بود (جدول ۲). ضریب تغییرات بسیار کم برای تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و نیز تعداد روز تا ظهور سنبله اصلی (۰/۰۶۴ درصد)، بیانگر تأثیر اندک محیط بر این صفات در مقایسه با سایر صفات مورد آزمایش می‌باشد. بیشترین ضریب تغییرات خطای آزمایش به عملکرد دانه در بوته (۲۸/۹۴ درصد)، عملکرد ماده خشک در بوته (۲۵/۸۳ درصد) و عملکرد کاه در بوته (۲۲/۵۷ درصد) متعلق بود. در صورتی که ضریب تغییرات مربوط به اجزای اصلی عملکرد یعنی تعداد پنجه‌های بارور در

جدول ۲- میانگین مربعات و ضریب تغییرات خطاًی صفات گیاهی توده‌های بومی جو جمع‌آوری شده از غرب ایران

Table 2. Mean squares and error coefficient of variation of plant characteristics of barley landraces collected from west of Iran

Plant characteristics	صفات گیاهی	میانگین مربعات MS	ضریب تغییرات C.V (%)
Biomass (g.plant ⁻¹)	ماده خشک (گرم در بوته)	36.42**	25.83
Plant height (cm)	ارتفاع بوته (سانتی متر)	215.37**	4.56
No. of tillers.plant ⁻¹	تعداد پنجه‌ها در بوته	20.59**	14.39
Tillering productively (%)	میزان باروری پنجه‌ها (درصد)	0.03**	11.01
Main spike length (cm)	طول سنبله اصلی (سانتی متر)	3.88**	6.76
No. of effective tillers.plant ⁻¹	تعداد پنجه‌های بارور در بوته	20.27**	19.49
Awn length of main spike (cm)	طول ریشک سنبله اصلی (سانتی متر)	4.60**	5.78
No. of grains.main spike ⁻¹	تعداد دانه در سنبله اصلی	427.86**	7.80
Grain yield main.spike ⁻¹ (g)	عملکرد دانه در سنبله اصلی (گرم)	0.39**	16.35
Grain yield.plant ⁻¹ (g)	عملکرد دانه در بوته (گرم)	11.63**	28.94
Harvest index of main spike	شاخص برداشت سنبله اصلی	0.01**	18.81
Straw yield (g.plant ⁻¹)	عملکرد کاه در بوته (گرم)	7.91**	22.57
Biomass.plot ⁻¹ (g)	عملکرد ماده خشک (گرم در کرت)	5911.10**	10.72
Grain yield.plot ⁻¹ (g)	عملکرد دانه (گرم در کرت)	1856.87**	11.43
Straw yield.plot ⁻¹ (g)	عملکرد کاه (گرم در کرت)	1119.10**	10.97
Harvest index	شاخص برداشت	0.033*	8.10
Plant establishment (%)	میزان پوشش سبز (درصد)	0.024**	12.62
Days to main spike heading	روز تا ظهور سنبله اصلی	200.64**	0.064
1000 grain weight (g)	وزن هزار دانه (گرم)	220.6**	8.73
No. of plants.plot ⁻¹	تعداد بوته در هر کرت	607.15**	12.75
Days to physiological maturity	روز تا رسیدگی فیزیولوژیک	136.36**	0.035

* و **: به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

*,**: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

بومی جو گزارش نمودند. ضریب تغییرات ژنتیکی ماده خشک در کرت ۱۲/۶۲ به دست آمد. این ضریب برای عملکرد دانه در کرت ۱۳/۵۴ بود (جدول ۴). به طور کلی ضریب تغییرات ژنتیکی اکثر صفات مورد مطالعه در حد بالا و قابل قبولی بود. بنابراین به نظر می‌رسد که از تنوع موجود در بین توده‌های بومی جو منطقه غرب ایران می‌توان از طریق انجام دورگ‌گیری و گزینش برای تولید لاین‌های پرمحصول بهره برداری کرد.

وراثت پذیری عمومی

مقدار وراثت پذیری عمومی برای اجزای عملکرد دانه یعنی تعداد دانه در سنبله اصلی، تعداد پنجه‌های بارور، طول سنبله اصلی و وزن هزار دانه به ترتیب ۰/۹۳، ۰/۹۳، ۰/۹۸ و ۰/۸۲ درصد به دست آمد (جدول ۴). تعداد دانه در سنبله اصلی علاوه بر وراثت پذیری بالا دارای بالاترین ضریب

ضریب تغییرات ژنتیکی بین توده‌ها

با توجه به اینکه ضریب تغییرات ژنتیکی (CVg) فاقد مقیاس است، بنابراین معيار مناسب تری نسبت به واریانس ژنتیکی در سنجش میزان تنوع به شمار می‌رود. بیشترین ضریب تغییرات ژنتیکی مربوط به تراکم دانه در سنبله اصلی و تعداد دانه در سنبله اصلی با مقدادیر ۳۴/۳ و ۵۳/۸ بود و کمترین ضریب تغییرات ژنتیکی نیز به نسبت عملکرد دانه به ماده خشک با مقدار ۵/۶۵ تعلق داشت (جدول ۴). این موضوع نشان می‌دهد که در بین توده‌ها اختلافات گسترده‌ای از نظر تعداد دانه در سنبله اصلی وجود دارد و امکان گزینش برای این صفت وجود دارد. ضریب تغییرات ژنتیکی ارتفاع بوته ۷/۵۸ بود (جدول ۴).

بابایی و وجданی (1992) (Babaei and Vojdani, 1992) نیز وجود تنوع ژنتیکی در مورد ارتفاع بوته را در توده‌های

جدول ۳- میانگین تعدادی از صفات گیاهی توده‌های بومی جو جمع آوری شده از غرب ایران

Table 3. Mean of some plant characteristics of barley landraces collected from west of Iran

توده‌های جو Barley landraces	ارتفاع بوته Plant height (cm)	طول سنبله اصلی Main spike length (cm)	تعداد دانه‌ها در سنبله اصلی No. of grains.main spike ⁻¹	تراکم دانه در سنبله اصلی Grain density.main spike ⁻¹	عملکرد دانه در بونه Grain yield.plant ⁻¹ (g)	وزن هزار دانه 1000 grain weight (g)	عملکرد دانه Grain yield (kg.ha ⁻¹)
1	87.0 cd	6.4 ij	21.9 ef	3.4 f	6.7 bc	50.5 ab	4241.5 l
2	87.6 bc	9.3 ab	22.4 ef	3.5 f	6.1 cd	45.3 ab	3841.5 o
3	100.0 a	9.2 ab	28.2 ef	3.1 f	9.9 ab	49.4 ab	4496.3 i
4	96.5 ab	7.7 de	25.3 ef	3.3 f	8.5 ab	43.1 ab	4584.5 h
5	85.8 cd	8.2 bc	24.6 ef	3.0 f	8.1 ab	44.5 ab	3625.8 r
6	76.6 hi	5.8 lm	43.7 cd	8.8 cd	6.2 cd	29.6 fg	3672.3 q
7	92.7 ab	5.7 lm	49.6 bc	10.3 b	7.7 ab	30.6 fg	4503.8 i
8	84.4 cd	5.9 kl	42.0 d	8.3 de	4.6 d	30.2 fg	3079.0 v
9	84.6 cd	7.6 de	22.5 ef	3.0 f	7.1 bc	43.6 ab	4688.3 g
10	89.1 bc	7.0 fg	51.5 ab	8.7 cd	7.4 ab	33.5 ef	4241.3 l
11	86.0 cd	8.7 ab	23.5 ef	2.7 f	11.9 ab	42.2 bc	3762.5 p
12	85.8 cd	7.5 ef	24.6 ef	3.3 f	10.2 ab	48.6 ab	3408.8 t
13	93.3 ab	8.7 ab	26.0 ef	3.0 f	12.4 ab	52.1 a	3494.3 s
14	78.4 fg	6.4 ij	43.8 cd	8.1 de	8.8 ab	34.9 de	4430.0 jk
15	96.6 ab	9.5 a	26.5 ef	2.8 f	9.3 ab	52.3 a	4925.0 e
16	90.6 bc	6.4 ij	53.4 ab	9.9 bc	8.7 ab	32.0 ef	4409.5 jk
17	77.5 gh	6.5 hi	21.9 ef	3.4 f	5.8 d	48.1 ab	4185.8 m
18	91.0 ab	8.1 cd	24.1 ef	3.0 f	6.6 bc	47.0 ab	4448.0 j
19	78.3 fg	5.7 lm	40.2 d	8.2 de	6.6 bc	32.5 ef	4798.8 f
20	75.5 ij	5.4 mn	39.5 d	8.6 cd	4.8 d	27.9 fg	3757.0 p
21	75.8 ij	6.8 gh	21.1 f	3.1 f	7.2 bc	43.5 ab	3314.5 u
22	72.5 j	6.5 hi	20.8 f	3.2 f	6.4 cd	51.1 ab	4156.8 m
23	84.3 cd	8.0 de	23.2 ef	2.9 f	7.3 bc	40.7 cd	5477.5 c
24	83.7 cd	7.3 ef	23.1 ef	3.2 f	8.3 ab	51.9 a	4437.8 j
25	75.3 ij	6.1 jk	20.5 f	3.4 f	5.2 d	49.6 ab	3892.8 n
26	84.4 cd	5.9 kl	40.5 d	8.1de	6.5 bc	33.3 ef	3917.0 n
27	83.0 de	5.7 lm	44.9 cd	9.3 bc	9.4 ab	32.5 ef	4674.5 g
28	85.6 cd	7.4 ef	24.6 ef	3.3 f	6.8 bc	49.4 ab	4255.0 l
29	87.0 cd	7.1 ef	22.9 ef	3.2 f	6.9 bc	46.4 ab	5068.0 d
30	84.1 cd	7.8 de	20.1 f	3.4 f	13.1 a	49.9 ab	6054.0 a
31	79.6 ef	7.2 ef	22.5 ef	3.2 f	6.4 cd	46.2 ab	4922.5 e
32	86.8 cd	7.9 de	23.0 ef	2.9 f	8.6 ab	45.3 ab	5840.8 b
33	60.0 k	4.9 o	49.5 bc	11.8 a	5.8 d	25.0 g	4665.8 g
34	62.8 k	5.1 no	56.0 a	12.9 a	6.8 bc	27.3 fg	4402.5 jk
35	78.4 fg	7.0 fg	49.6 bc	8.4 de	9.1 ab	32.4 ef	4240.3 l
36	78.8 fg	7.6 de	49.2 bc	7.6 e	6.9 bc	32.9 ef	4386.3 k

در هر ستون میانگین‌هایی که دارای حروف مشترک هستند، بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی‌داری ندارند.

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using Duncan's Multiple Range Test

گزینش برای صفات مذکور در بین توده‌های مورد مطالعه میسر می‌باشد. مقدار بازده ژنتیکی برای بیوماس هوایی نیز $4/24$ در صد بود. باتانگار و همکاران (Batangar *et al.*, 1988) میزان بازده ژنتیکی برای این صفت را یک تا 12 درصد گزارش نمودند. میزان بازده ژنتیکی برای صفات تعداد پنجه‌های بارور در بوته، تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه در بوته و تراکم دانه در سنبله اصلی به ترتیب $3/65$ ، $18/03$ ، $2/17$ و $4/57$ درصد بودند (جدول ۴).

واریانس ژنتیکی و بازده ژنتیکی درون توده‌ای
بیشترین واریانس ژنتیکی درون توده‌ای از نظر ارتفاع بوته به توده‌های $2/28$ ، $11/24$ ، $2/22$ و $18/2$ به ترتیب با واریانس $55/15$ درصد و $47/15$ ، $52/75$ ، $47/85$ و $45/25$ اختصاص داشت. از نظر عملکرد دانه در سنبله اصلی توده‌های شماره $19/19$ ، $8/27$ و $26/26$ به ترتیب با مقادیر $0/35$ ، $0/2$ و $0/15$ دارای بیشترین مقدار واریانس ژنتیکی درون توده‌ای بودند. واریانس ژنتیکی درون توده‌ای قابل ملاحظه برای اغلب توده‌ها نشانگر وجود تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه در درون این توده‌ها می‌باشد. از واریانس ژنتیکی درون توده‌ای بالا می‌توان به عنوان یک معیار برای افزایش عملکرد توده‌هایی که دارای میانگین عملکرد بالایی نیز هستند، استفاده نمود. بیشترین بازده ژنتیکی درون توده‌ای از نظر ارتفاع بوته به توده‌های شماره $11/28$ ، $11/22$ و $11/2$ به ترتیب با مقادیر $11/40$ ، $11/26$ و $10/6$ اختصاص داشت. از لحاظ عملکرد دانه در بوته توده‌های شماره $30/18$ ، $32/30$ و $27/24$ به ترتیب با مقادیر $9/68$ ، $9/27$ و $7/65$ دارای بیشترین مقدار بازده را دارا بودند. بیشترین بازده ژنتیکی برای تعداد پنجه‌های بارور به توده شماره $13/11$ با مقدار $11/45$ و در مورد طول سنبله اصلی به توده شماره $25/25$ با مقدار $6/19$ و برای عملکرد دانه در سنبله اصلی به توده شماره $8/0$ با مقدار $6/64$ اختصاص یافت. وجود بازده ژنتیکی درون توده‌ای در توده‌های مورد مطالعه نشان دهنده وجود تنوع درون هر یک از توده‌ها می‌باشد که

تغییرات ژنتیکی بود که می‌توان از این صفت به عنوان یک معیار مناسب برای افزایش عملکرد دانه استفاده نمود. مقدار وراثت‌پذیری عمومی برای ماده خشک در کرت $0/79$ درصد بود (جدول ۴). میزان وراثت‌پذیری عمومی برای این صفت توسط باتانگار و همکاران (Batangar *et al.*, 1988) به ترتیب $0/33$ و $0/88$ (Welch *et al.*, 1983) گردیده است. وراثت‌پذیری شاخص برداشت و کاه نیز به ترتیب $0/75$ و $0/70$ بدست آمد. ویچ و همکاران (Welch *et al.*, 1983) به ترتیب وراثت‌پذیری این صفات را $0/43$ و $0/80$ درصد گزارش کردند. وراثت‌پذیری عملکرد دانه در کرت $0/79$ بود. هوکت و نیلان (Hockett and Nilan, 1985) وراثت‌پذیری عملکرد دانه را از $0/24$ تا $0/96$ درصد گزارش نمودند. میزان وراثت‌پذیری به مقدار تنوع ژنتیکی موجود، میزان اثرات محیطی و نوع صفت بستگی دارد وراثت‌پذیری عملکرد دانه در کرت $0/79$ بود. هوکت و نیلان (Hockett and Nilan, 1985) میزان وراثت‌پذیری به مقادیر مختلف می‌تواند ناشی از نوع ژنوتیپ‌های مورد مطالعه، محیط آزمایش و تعداد سال‌های آزمایش باشد. بالا بودن میزان وراثت‌پذیری معرف سهم بیشتر واریانس ژنتیکی نسبت به واریانس محیطی است. با توجه به بالا بودن وراثت‌پذیری اجزای عملکرد، از این صفات می‌توان در نسل‌های در حال تفکیک در گزینش غیرمستقیم برای عملکرد دانه استفاده کرد. در عین حال یکی از علل بالا بودن وراثت‌پذیری عملکرد دانه و سایر صفات وابسته به عملکرد را در این آزمایش می‌توان به انجام آزمایش در یک سال و اختلاط آن با اثر مقابل ژنوتیپ × محیط مناسب کرد.

بازده ژنتیکی بین توده‌ها

ماده خشک، عملکرد دانه و عملکرد کاه در کرت و تعداد دانه در سنبله اصلی به ترتیب با مقادیر $41/40$ ، $84/64$ ، $36/25$ و $03/18$ در صدد، دارای بیشترین بازده ژنتیکی بین توده‌ها بودند و بنابراین امکان

جدول ۴- برآوردهای پارامترهای ژنتیکی صفات گیاهی توده‌های بومی جو غرب ایران

Table 4. Estimation of genetic parameters for plant characteristics of barley landraces collected from west of Iran

Plant characteristics	صفات گیاهی	واریانس ژنتیکی بین توده‌ها (δ^2_g)	بازده ژنتیکی بین توده‌ها (ΔG)	ضریب تغیرات ژنتیکی (CV_g)	ضریب تغیرات محیطی (CV_e)	وراثت پذیری عمومی (h^2)
Biomass.plant ⁻¹ (g)	ماده خشک (گرم در بوته)	8.70	4.24	20.92	25.18	0.67
Plant height (cm)	ارتفاع بوته (سانتی متر)	41.28	10.62	7.58	4.59	0.89
No. of tillers.plant ⁻¹	تعداد کل پنجه‌ها در بوته	9.23	5.03	22.29	13.34	0.89
No. of effective tillers.plant ⁻¹	تعداد پنجه‌های بارور در بوته	5.27	3.65	23.9	19.10	0.82
Tillering productively (%)	میزان باروری پنجه‌ها (درصد)	0.055	0.10	9.96	11.97	0.68
Main spike length (cm)	طول سنبله اصلی (سانتی متر)	1.11	1.78	14.84	6.98	0.93
Awn length of main spike (cm)	طول ریشک سنبله اصلی (سانتی متر)	1.14	1.81	13.69	6.14	0.94
No. of grains.main spike ⁻¹	تعداد دانه در سنبله اصلی	108.17	18.03	34.38	8.23	0.98
Grain yield.main spike ⁻¹ (g)	عملکرد دانه در سنبله اصلی (گرم)	0.07	0.44	19.74	11.29	0.90
Grain yield.plant ⁻¹ (g)	عملکرد دانه در بوته (گرم)	2.52	2.17	20.22	28.12	0.61
Harvest index of main spike	شاخص برداشت سنبله اصلی	0.003	0.09	28.83	17.86	0.90
Straw yield.plant ⁻¹ (g)	عملکرد کاه در بوته (گرم)	2.16	2.26	23.44	22.05	0.77
Grain density.main spike ⁻¹	تراکم دانه در سنبله اصلی	6.98	4.57	53.81	13.96	0.98
Biomass.plot ⁻¹ (g)	ماده خشک در کرت(گرم)	1735.37	64.84	12.62	11.24	0.76
Grain yield.plot ⁻¹ (g)	عملکرد دانه در کرت(گرم)	533.09	40.41	13.54	12.10	0.79
Straw yield.plot ⁻¹ (g)	عملکرد کاه در کرت(گرم)	299.59	25.36	10.87	12.30	0.70
Days to main spike heading	روز تاظهور سنبله اصلی	63.20	13.91	5.16	0.01	0.99
1000 grain weight (g)	وزن هزار دانه (گرم)	57.57	12.83	17.84	8.24	0.93
Days to physiological maturity	روز ترسیدگی فیزیولوژیک	48.10	12.14	23.83	0.01	0.99


ردیفه قرار داشتند. هفت توده خوشه دوم همگی از جوهرای دو ردیفه بودند و به غیر از توده شماره ۱۵ به یک محدوده جغرافیایی تعلق داشتند. این موضوع تا حدودی همخوانی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی را نشان می‌دهد. یازده توده خوشه سوم نیز همانند خوشه اول از توده‌های بومی مناطق مختلف تشکیل شد.

به منظور مشخص کردن ارزش هر یک از خوشه‌ها از نظر صفات مورد مطالعه، درصد انحراف آن‌ها از میانگین کل محاسبه شد که نتایج آن در جدول ۵ ارائه شده است. چنانچه در یک خوشه میانگین یک صفت بیشتر از میانگین کل برای آن صفت باشد، خوشه مورد نظر از نظر انتخاب والدین ارزش بیشتری دارد، به شرطی که بزرگ‌گ بودن ارزش آن صفت مطلوب باشد. خوشه اول از نظر عملکرد دانه در سنبله اصلی و تراکم دانه در سنبله اصلی به ترتیب با مقادیر ۷/۵۵ و ۲۲/۹۲ درصد، ارزش بیشتری از میانگین کل داشت. خوشه

این موضوع می‌تواند در اصلاح توده‌های مذکور مد نظر قرار گیرد (داده‌ها ارائه نشده‌اند).

تجزیه خوشه‌ای

تجزیه خوشه‌ای توده‌های بومی جو براساس ۲۳ صفت مورد مطالعه و بعد از برش دندروگرام از فاصله ۱۰ واحد منجر به تشکیل سه خوشه شد (شکل ۱). خوشه اول شامل ۱۸ توده از مناطق ملایر، قزوین، بروجرد، ایلام، مریوان، الیگودرز، سقز، تویسرکان، همدان، کرمانشاه و چهار رقم شاهد بودند. در این گروه چهار رقم شاهد و هفت توده از جوهرای شش ردیفه و هفت توده جو دو ردیفه قرار گرفتند. خوشه دوم، هفت توده از مناطق گیلان غرب، کرمانشاه، اسلامآباد، قصرشیرین، دهلران و کرند را در بر گرفت. خوشه سوم متشکل از یازده توده از مناطق سنتوج، همدان، خرمآباد، اسلامآباد، بروجرد، نهاوند، ملایر و سقز بود. در این گروه چهار توده شش ردیفه و هفت توده دو



شکل ۱- دندروگرام حاصل از تجزیه کلاستر توده‌های بومی جو غرب کشور

Fig.1. Cluster analysis of barely landraces collected from west of Iran

**جدول ۵- میانگین (ردیف اول) و درصد انحراف میانگین (ردیف دوم) هر خوشه از میانگین کل برای صفات مورد
مطالعه در توده‌های بومی جو**

Table 5. Mean (first row) and deviation percent (second row) of each cluster from the total mean for plant
characteristics of barley landraces

خوشه Cluster	توده‌های جو Barley landraces	تعداد پنجه و Tillering productivity (%)	طول سنبه اصلی Main spike length (cm)	عملکرد در سنبه اصلی Grain yield.main spike ⁻¹ (g)	عملکرد در بوریه Grain yield.plant ⁻¹ (g)	ترکم دله در سنبه اصلی Grain density.main spike ⁻¹	شاخص برداشت Harvest index	میزان پوشش سبز (درصد) Plant establishment (%)	روز میانگین تغییرات فیزیولوژیکی day to physiological maturity
1	1-3-7-9-10-14-16-17-18-19-22-	0.68	6.7	6.7	7.60	6.71	0.53	0.69	28.22
	24-27-28-33-34-35-36	-2.62	-4.3	7.55	-2	22.92	0.11	0.40	-1.66
2	4-15-23-29-30-31-32	0.71	7.88	1.20	8.58	3.03	0.54	0.77	25.27
	1.02	12.61	-13.57	10.56	-44.45	3.85	11.18	-1.90	
3	2-5-6-8-11-12-26-13-20-21-25	0.72	7.11	1.27	7.57	5.08	0.51	0.62	31.45
	2.60	1.68	-7.98	-2.49	-7.04	-1.92	-10.28	9.60	

میانگین داشت، ولی این برتری چندان قابل توجه نبود (جدول ۵).

به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که تنوع ژنتیکی بالایی برای صفات زراعی در بین و درون توده‌های بومی مورد مطالعه از جمله عملکرد دانه و اجزای آن وجود دارد. بنابراین با توجه به وجود تنوع ژنتیکی و میزان وراثت پذیری بالا برای اکثر این صفات، می‌توان از طریق گزینش و دورگ‌گیری اقدام به تولید ارقام مطلوب از نظر عملکرد دانه و سایر صفات گیاهی نمود.

دوم از لحاظ طول سنبه اصلی، عملکرد دانه در بوته و شاخص برداشت به ترتیب با مقادیر ۱۲/۶۱ و ۳/۸۵ درصد، از ارزش بالاتری نسبت به میانگین کل برخوردار بود. خوش دوم برای تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک با مقدار ۱۰/۹ درصد، دارای ارزش کمتری از میانگین کل بود. این موضوع نشان می‌دهد که از توده‌های این خوش ده می‌توان برای گزینش ژنوتیپ‌های زودرس تر استفاده نمود. خوش سوم فقط از نظر صفات درصد باروری پنجه‌ها و طول سنبه اصلی به ترتیب با مقادیر ۲/۶ و ۱/۶۸ درصد، ارزش بیشتری از

References

- Abde Mishani, S. and A. A. Shahnejatboushehri. 1992.** Advanced Plant Breeding. Volume1, Tehran University Press (In Persian).
- Babaei, M. and P. Vojdani. 1992.** Evaluation of genetic diversity and geographical dispersal in barley collection. Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran (In Persian).
- Batangar, V. K., S. M. Batangar and C. Sharma. 1977.** Genetic variability and correlation coefficients in 6-rowed huskless barley. Indian Agric. Sci. 47: 355-363.
- Ceccarelli, S., S. Grando and J. A. G. Lleur. 1987.** Genetic diversity in barley landraces from Syria and Jordan. Euphytica, 36: 389-405

منابع مورد استفاده

- Ehdaei, B.** 1994. Plant Breeding. Barsava Publication (In Persian).
- Eshghi, R. and E. Akhundova.** 2010. Genetic diversity in hulless barley based on agromorphological traits and RAPD markers and comparison with storage protein analysis. African J. Agric. Res. 5: 97-107.
- Falconer, D. S. and T. F.C. Mackay.** 1996. Introduction to Quantitative Genetics. 4th Ed. Benjamin Cummings. 480 pp.
- Faris, M. A. and H. R. Klink.** 1982. Comparison between different methods of measuring synchrony of ear emergence in barley, oat and spring wheat cultivars. Z. Pflanzenzuecht, 50: 79-88.
- Gandomkar, S.** 1999. Genetic diversity among winter barley landraces collected from northwest of Iran. MSc Thesis. Islamic Azad University, Ardabil Branch (In Persian).
- Hadado, T.T., D. Rau, E. Bitocchi and R. Papa.** 2010. Adaptation and diversity along an altitudinal gradient in Ethiopian barley (*Hordeum vulgare L.*) landraces revealed by molecular analysis. BMC Plant Biology 10: 121-140.
- Hockett, E. A. and R. A. Nilan.** 1985. Genetics of Barley. ASA, CSSA, Madison, WI, USA.
- Ibrahim, O.M., M. H. Mohamed, M. M. Tawfik and E. A. Badr.** 2011. Genetic diversity assessment of barley (*Hordeum vulgare L.*) genotypes using cluster analysis. Int. J. Acad. Res. 3: 81-85.
- Karimi, H.** 1996. Field Crops. Tehran University Press (In Persian).
- Kato, K. and H. Yokoyama.** 1992. Geographical variation in heading characters among wheat landraces, *Triticum aestivum L.* and its implication for their adaptability. Theor. Appl. Genet. 84: 259-265.
- Nevo E., D. Zohary, A. Beiles, D. Kaplan and N. Storch.** 1986. Genetic diversity and environmental associations of wild barley (*Hordeum spontaneum*) in Turkey. Genetica, 68: 203-213.
- Ramanujam, S., A. S. Tiwari and R. B. Mehra.** 1974. Genetic divergence and hybrid performance in mung bean. Theor. Appl. Genet. 45: 211-214.
- Reddy, J. N., A. V. Suriava and K. K. Mohanty.** 1992. Genetic divergence in early rice under two situations. Indian J. Genet. 52: 225-229.
- Sakti, J. and B. Khadag.** 1995. Evidence of geomorphological divergence in Kabuli chickpea from germplasm evaluation data. Crop Sci. 33: 626-636.
- Valkoun, J.** 1992. Multiplication and characterization of new barley germplasm. Annual Report, Genetic Resources Unit, ICARDA, 26-28.
- Welch, R. W., K. N. Jorge and R. M. Habgood.** 1983. Heritability and selection for grain yield and its components in F2 composite population of spring barley. Z. Pflanzenzuecht, 90: 305-315.

Genetic diversity among winter barley landraces collected from west of Iran

Khazaei, A.¹, M. Moghaddam² and S. Noormohammadi³

ABSTRACT

Khazaei, A., M. Moghaddam and S. Noormohammadi. 2012. Genetic diversity among winter barley landraces collected from west of Iran. *Iranian Journal of Crop Sciences*. 13(4): 671-683. (In Persian).

To study the genetic variability of agronomic characteristics in winter barley landraces collected from western parts of Iran, 32 landraces and four improved cultivars/lines as checks; EBYTC74-2, EBYTC74-10, EBYTC74-12 and Makouee were examined using randomized complete block design with three replications in Agricultural Research Center of Lorestan in 2001 cropping cycle. Twenty three agronomic characters were measured according to instructions of IPGRI. Analysis of variance indicated significant differences among entries for all characters. This analysis also showed high genetic diversity within the germplasm. The two-row landrace barley from Gilan Gharb yielded 6054 kg.ha^{-1} which was significantly different from the yield of checks and other landraces. Grouping of landraces by cluster analysis resulted in three clusters. Most of the entries within clusters corresponded with their geographical origin. However, some discrepancies existed that could be due to exchange of germplasm between geographical regions, or because of unknown origin of some landraces. Broad sense heritability of grain yield and its components, such as umber of fertile tillers, main spike length, No. of grains per main spike and 1000-grain weight, were 0.79, 0.82, 0.98, 0.93 and 0.93, respectively. Because of high heritability, genetic coefficient of variation and genetic gain, it is possible to select superior genotypes for hybridization and developing superior lines.

Key words: Barley, Cluster analysis, Genetic diversity and Landraces.

Received: November, 2008 Accepted: November, 2011

1- Faculty member, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran. (Corresponding author)
(Email: az42095@yahoo.com)

2- Professor, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3- Faculty member, Agricultural and Natural Resources Research Center of Lorestan, Iran