

بررسی امکان افزایش عملکرد دانه از طریق افزایش وزن دانه در ژنوتیپ‌های گندم زمستانه و
بینابین با دستکاری در ظرفیت مخزن

Study of the possibility of increasing grain yield by increasing grain weight in winter
and facultative wheat genotypes with manipulating sink capacity

سیروس محفوظی^۱ و سید شهریار جاسمی^۲

چکیده

محفوظی، س و س ش. جاسمی ۱۳۸۹. بررسی امکان افزایش عملکرد دانه از طریق افزایش وزن دانه در ژنوتیپ‌های گندم زمستانه و بینابین با دستکاری در ظرفیت مخزن. مجله علوم زراعی ایران: ۱۲ (۱): ۸۴-۷۶.

دستکاری و تغییر در اندازه و ظرفیت مخزن (دانه) بمنظور آگاهی از پتانسیل وزن دانه ارقام گندم و درک این نکته که آیا امکان افزایش عملکرد دانه از طریق افزایش وزن دانه وجود دارد، یکی از شرط‌های مهم برای افزایش عملکرد دانه در واحد سطح است. این آزمایش با استفاده از روش حذف مصنوعی سنبلچه‌ها و با هدف بررسی امکان افزایش عملکرد دانه از طریق افزایش وزن دانه در سال‌های زراعی ۱۳۸۴-۱۳۸۲ با پنج ژنوتیپ گندم زمستانه و بینابین در ایستگاه‌های اردبیل و کرج در دو شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی انتهای فصل (قطع آبیاری بعد از مرحله سنبله رفتن) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. برای بررسی تغییر در اندازه مخزن و امکان افزایش میزان انتقال مواد پرورده به دانه‌ها، ۲۵ و ۵۰ درصد گلچه‌ها بعد از زمان گرده‌افشانی به طور مصنوعی حذف شدند. نتایج تجزیه واریانس مرکب در شرایط آبیاری معمول نشان دهنده تفاوت معنی‌دار بین ژنوتیپ‌ها بود. در این شرایط رقم گاسپارد با عملکرد دانه ۷۲۸۸ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد دانه را داشت، ولی در شرایط تنش، ژنوتیپ‌ها از نظر عملکرد دانه تفاوتی نداشتند. نتایج تجزیه مرکب (دو سال و دو مکان) اثر حذف سنبلچه و ژنوتیپ‌ها بر وزن دانه در شرایط آبیاری معمول حاکی از آن بود که اثرات سال در مکان و ژنوتیپ در سطح احتمال یک درصد و اثر حذف سنبلچه و سال در مکان در ژنوتیپ در سطح احتمال پنج درصد معنی‌دار بودند. همچنین نتایج تجزیه مرکب (دو مکان) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل نشان داد که اثرات مکان و حذف سنبلچه، در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. حذف سنبلچه‌ها در شرایط آبیاری معمول پس از اعمال تیمارهای ۲۵ و ۵۰ درصد حذف سنبلچه، به ترتیب باعث افزایش ۱۳ و ۱۸ درصد در میانگین وزن دانه‌های باقیمانده (در مقایسه با شاهد) شد، ولی در شرایط تنش خشکی انتهای فصل، هر دو تیمار حذف سنبلچه باعث افزایش وزن دانه به میزان ۲۴ درصد در مقایسه با شاهد شدند که حاکی از عدم وجود محدودیت در ظرفیت مخزن و امکان افزایش عملکرد دانه از طریق وزن دانه در هر دو شرایط محیطی (آبیاری معمول و تنش خشکی) و به ویژه در شرایط تنش خشکی انتهای فصل است.

واژه‌های کلیدی: آبیاری، انتقال مواد پرورده، تنش خشکی انتهای فصل، حذف سنبلچه، گندم بینابین و وزن دانه.

مقدمه

بالغ بر ۶/۵ میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور زیر کشت گندم است. از این مقدار حدود ۲/۵ میلیون هکتار به کشت گندم آبی و حدود چهار میلیون هکتار آن به کشت گندم دیم اختصاص دارد (Anonymous, 2005). در مناطق سرد کشور حدود ۹۰۰ هزار هکتار گندم آبی کشت می‌شود (Anonymous, 2005) که معمولاً در زمستان با تنش سرما و از اواسط بهار با تنش خشکی آخر فصل مواجه می‌شوند. نوسانات و توزیع نامناسب بارندگی و تنش خشکی انتهای فصل، پیشرفت برنامه‌های به نژادی و مدیریت زراعی در این مناطق را با مشکل مواجه می‌سازد. گیاه گندم در عکس العمل به تنش خشکی محدودیت‌هایی را از نظر اجزای عملکرد دانه از جمله اندازه دانه دارد. چنانچه بعد از گرده افشانی و در طول دوره پر شدن دانه، گیاه گندم با تنش خشکی مواجه شود، وزن دانه آن کاهش می‌یابد (Mahfoozi et al., 2004). در مقابل، به دلیل قابلیت گیاه گندم دارد، چنانچه شرایط آب و هوایی در طی مرحله طویل شدن ساقه مطلوب و مواد پرورده نیز فراهم باشد، گیاه از طریق افزایش وزن دانه در سنبله، کاهش عملکرد را جبران می‌کند (Entz and Fowler, 1989). در سطح بین‌المللی در طول چند دهه گذشته در زراعت آبی گندم در مناطقی که محدودیت آب وجود نداشته، افزایش عملکرد ارقام جدید عمدتاً از ارقامی بوده که دارای تعداد دانه بیشتری در واحد سطح بوده‌اند. به عبارتی وزن دانه در ارقام جدید گندم نه تنها تغییر نکرده، بلکه به طور عموم، وزن دانه برخی از ارقام جدید در مقایسه با ارقام قدیمی کاهش یافته است (Siddique et al., 1989; Slafer and Andrade, 1989; Duggan and Fowler, 2006). تنش خشکی بر روی فنولوژی گیاه و رشد و نمو دانه تاثیر زیادی می‌گذارد. به طور مثال، تنش خشکی هم بر روی تولید مواد پرورده و هم بر انتقال آنها به دانه اثر می‌گذارد. در شرایط تنش خشکی، میزان عملکرد

دانه برخی از ارقام گندم، هم از طریق عدم توانایی مخزن (دانه) برای افزایش وزن (محدودیت در ظرفیت مخزن) (Slafer and Savin 1994) و هم بر اثر محدودیت در منابع تامین مواد پرورده (Duggan et al., 2000) دچار نقصان می‌شود. با وجود این، یکی از راههای افزایش عملکرد دانه در ارقام گندم، دستکاری در ظرفیت مخزن است (Fischer et al., 1977; Blum et al., 1988). در گزارشات علمی متعددی بیان شده است که با افزایش توانایی انتقال مواد پرورده، رشد دانه افزایش می‌یابد (Blum et al., 1988; Ma et al., 1990; Blade and Baker, 1991). جدل و هانت (Jedel and Hunt, 1990) با اجرای آزمایشاتی نشان دادند که با کاهش قدرت فتوسنتزی گیاه در مرحله گرده افشانی، رشد دانه کاهش می‌یابد. نتایج بررسی آنها نشان داد که تامین مواد پرورده یکی از عوامل موثر در کنترل وزن دانه است. نتایج تحقیقات میرالس و اسلافر (Miralles and Slafer, 1995) نشان داد که با کاهش تعداد سنبلچه (حذف مصنوعی) در شرایط تنش خشکی در ارقام پاکوتاه گندم، وزن دانه‌های باقیمانده افزایش یافت ولی این افزایش در ارقام نیمه پاکوتاه و ارقام پابلندتر احتمالاً به دلیل تغییر در وضعیت انتقال مواد پرورده و فتوسنتز جاری، صورت نگرفت. افزایش وزن دانه‌های کناری سنبلچه در گندم‌های سنتتیک نیز پس از حذف تعدادی از گلچه‌ها گزارش شده است (Calderini and Reynolds, 2000). نتایج تحقیقات کربی و جونز (Kirby and Jones, 1977) در جو (*Hoedum vulgare* L.) نیز نشان داد که حذف پنجه‌ها قبل از مرحله طویل شدن سنبله، باعث تولید سنبله‌هایی با تعداد دانه بیشتر و وزن دانه بالاتر می‌شود. آنها از نتایج بررسی خود چنین استنباط کردند که افزایش تعداد سنبلچه در سنبله احتمالاً می‌تواند یکی از راههای جبران کاهش تعداد پنجه در ژنوتیپ‌های جو باشد. نتایج تحقیقات اخیر بر روی گندم نان پس از تیمار حذف سنبلچه‌ها به منظور بررسی امکان افزایش وزن دانه و

ب- آزمایش حذف سنبلچه‌ها

در هر دو سال (۸۳-۱۳۸۲ و ۸۴-۱۳۸۳) در هر کدام از آزمایش‌ها، بعد از سنبله رفتن، تعداد ۲۰۰ سنبله اصلی در وسط هر کرت مشخص و با نخ سفید علامت گذاری شدند. از بین سنبله‌های علامت گذاری شده، تعداد پنج سنبله اصلی از پنج لاین و رقم، ۱۰ روز بعد از گرده افشانی، ۲۵ و ۵۰ درصد از گلچه‌های سنبله اصلی (در هر دو طرف طول سنبله اصلی) هر ژنوتیپ در هر کرت آزمایشی با استفاده از پنس حذف شدند تا امکان انتقال مواد پرورده به دانه‌های باقیمانده و افزایش وزن دانه بررسی شود. در نهایت وزن دانه‌های باقی مانده (پس از حذف ۲۵ و ۵۰ درصد گلچه‌ها) روی پنج سنبله اصلی از هر ژنوتیپ در هر تکرار در زمان رسیدن شمارش و توزین شد. برای تجزیه داده‌ها، میانگین وزن یک دانه محاسبه و تجزیه واریانس با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و نرم افزار آماری SAS روی داده‌ها انجام و مقایسه میانگین وزن دانه‌های باقیمانده با آزمون چند دامنه‌ای دانکن صورت گرفت. تجزیه واریانس مرکب برای تیمار حذف گلچه (پس از انجام آزمون بارتلت) با در نظر گرفتن عوامل سال و مکان به صورت تصادفی و بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. با توجه به اینکه در سال اول، آزمایش تنش خشکی در اردیبهشت اجرا نشد، لذا تجزیه مرکب برای سال دوم در دو مکان کرج و اردیبهشت صورت گرفت.

نتایج و بحث

الف- عملکرد دانه

تجزیه مرکب (دو سال و دو مکان) میانگین عملکرد دانه در شرایط آبیاری معمول نشان داد که بین ارقام و لاین‌های گندم از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد وجود داشت (داده‌ها ارائه نشده‌اند). رقم گاسپارد با عملکرد دانه

افزایش عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی نیز نشان داد که وزن دانه در ژنوتیپ‌های گندم زمستانه هنوز به مقدار بالقوه خود نرسیده و امکان افزایش وزن دانه وجود دارد (Duggan and Fowler, 2006).

آزمایش حاضر با استفاده از روش حذف مصنوعی سنبلچه‌ها و با هدف بررسی امکان افزایش عملکرد دانه از طریق افزایش وزن دانه در دو شرایط آبیاری معمول و نیز تنش خشکی انتهای فصل اجرا شده است.

مواد و روش‌ها

الف- آزمایش عملکرد دانه

تعداد پنج رقم و لاین پیشرفته زمستانه و بینابین گندم با اسامی گاسپارد (با مبدا فرانسه) مورد استفاده توسط زارعین منطقه اردبیل، ارقام توس و شهریار از ارقام تجاری رایج در مناطق سرد کشور و لاین‌های جدید با کدهای (Kinachi97951327 و C-79-16 و C-80-10) (Omid//H7/4P839/Omid/Tdo/5/ ICWHA81-1473) در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند. ارقام و لاین‌ها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در ۲۰ مهر ماه سال‌های ۸۳-۱۳۸۲ و ۸۴-۱۳۸۳ در دو شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی انتهای فصل (قطع آبیاری در زمان شروع شیری شدن دانه) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی منطقه معتدل سرد در کرج با طول جغرافیایی ۵۱ درجه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه شمالی و با ارتفاع ۱۳۲۱ متر از سطح دریا و همچنین در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل با ارتفاع ۱۳۵۰ متر از سطح دریا و طول جغرافیایی ۴۸ درجه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۸ درجه شمالی (در سال اول در شرایط آبیاری معمول و در سال دوم در هر دو شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی انتهای فصل) از نظر عملکرد دانه ارزیابی شدند. آزمایشات با تراکم ۵۰۰ بذر در متر مربع پیاده شدند. هر کرت آزمایشی دارای ۶ ردیف به طول ۶ متر و به فاصله ردیف ۲۰ سانتی متر بود.

بین ژنوتیپ ها از نظر صفت وزن هزار دانه چه در شرایط آبیاری معمول و چه در شرایط تنش خشکی انتهای فصل، تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت، اما بالاترین وزن هزار دانه در شرایط آبیاری معمول به میزان ۴۴/۹ گرم مربوط به رقم گاسپارد و در شرایط تنش خشکی آخر فصل به میزان ۳۷ گرم مربوط به ژنوتیپ C-80-10 بود (جدول ۱).

۷۲۸۸ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد را در بین ژنوتیپ ها دارا بود (جدول ۱). در شرایط تنش خشکی انتهای فصل، تجزیه مرکب در دو مکان در سال دوم (به علت عدم اجرای آزمایش تنش در سال اول) نشان داد که اگر چه بین عملکرد دانه ژنوتیپ ها تفاوت معنی داری وجود نداشت (داده ها ارائه نشده اند)، ولی بالاترین عملکرد دانه مربوط به ژنوتیپ C-79-16 به میزان ۴۸۲۳ کیلوگرم در هکتار بود (جدول ۱).

جدول ۱- مقایسه میانگین عملکرد دانه و وزن هزار دانه پنج ژنوتیپ گندم زمستانه در شرایط آبیاری معمول در سال های زراعی ۸۴ - ۱۳۸۳ و ۸۳ - ۱۳۸۲ و تنش خشکی انتهای فصل در سال زراعی ۱۳۸۴ - ۱۳۸۳ در اردبیل و کرج
Table 1. Mean comparison for grain yield (GY) and 1000 grain weight (1000GW) of five winter wheat genotypes under normal irrigation in 2003 - 2004 and 2004 - 2005 cropping seasons and terminal drought stress in 2004 - 2005 cropping season in Ardabil and Karaj

ژنوتیپ Genotype	آبیاری معمول Normal irrigation		تنش خشکی انتهای فصل Terminal drought stress	
	عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) GY (kg.ha ⁻¹)	وزن هزار دانه (گرم) 1000GW(g)	عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) GY (kg.ha ⁻¹)	وزن هزار دانه (گرم) 1000GW(g)
Gaspard	7288 a	44.9 a	4445 a	35.2 a
Toos	6959 ab	40.9 a	4576 a	36.0 a
C-79-16	6598 ab	40.6 a	4823 a	33.6 a
C-80-10	6460 b	44.3 a	4404 a	37.0 a
Shahryar	7010 ab	42.5 a	4714 a	36.2 a

در هر ستون میانگین هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی داری ندارند
Means in each column followed by at least one similar letter are not significantly different at 5% probability level, using Duncan's Multiple Range Test

بین مکان ها نیز در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی دار وجود داشت. اثرات متقابل ژنوتیپ در حذف سنبلچه در این شرایط نیز معنی دار نبود (جدول ۳). مقایسات میانگین مربوط به وزن نهایی دانه های باقیمانده پس از اعمال تیمار حذف ۲۵ و ۵۰ درصد سنبلچه ها نشان داد که حذف مصنوعی سنبلچه ها در ژنوتیپ ها باعث افزایش وزن دانه های باقیمانده در سنبله شد. در شرایط آبیاری معمول، وزن دانه های باقیمانده پس از اعمال تیمارهای ۲۵ و ۵۰ درصد حذف سنبلچه به ترتیب ۱۳ و ۱۹ درصد و در شرایط تنش خشکی انتهای فصل ۲۳ و ۲۴ درصد افزایش نشان دادند (جدول ۴). این نتایج نشان می دهند که وزن دانه عامل محدود کننده عملکرد دانه

ب) اثر حذف سنبلچه ها
تجزیه واریانس مرکب برای تیمار حذف سنبلچه ها در شرایط آبیاری معمول در دو سال و در دو مکان نشان داد که اثر اصلی تیمار حذف سنبلچه ها در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. ژنوتیپ ها نیز در سطح احتمال یک درصد با یکدیگر تفاوت معنی دار داشتند. اثرات متقابل ژنوتیپ در حذف سنبلچه معنی دار نبود. عدم معنی دار بودن اثرات متقابل ژنوتیپ در حذف سنبلچه نشان دهنده عکس العمل یکسان ژنوتیپ ها به تیمار حذف بود (جدول ۲). در تجزیه واریانس مرکب برای تیمار حذف سنبلچه ها در شرایط تنش خشکی انتهای فصل در دو مکان، اثر تیمار حذف سنبلچه ها در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود.

جدول ۲- تجزیه واریانس مرکب اثر ژنوتیپ های گندم و حذف سنبلچه ها بر وزن یک دانه در شرایط آبیاری معمول در کرج و اردبیل در دو سال زراعی ۱۳۸۳-۱۳۸۲ و ۱۳۸۴-۱۳۸۳

Table2. Combined analysis of variance for effects of wheat genotypes and removed spikelets on single grain weight under normal irrigation in Karaj and Ardabil in 2003 - 2004 and 2004 - 2005 cropping seasons

S. O. V	منابع تغییر	درجه آزادی df	میانگین مربعات (MS)
Year (Y)	سال	1	708.1 ^{ns}
Location (L)	مکان	1	1927.3 ^{ns}
Y × L	سال × مکان	1	601.3**
Error a	خطای الف	8	11.8
Genotype (G)	ژنوتیپ	4	819.3**
Spikelet Removal (R)	حذف سنبلچه	2	207.6*
G × R	ژنوتیپ × حذف سنبلچه	8	20.6 ^{ns}
Y × G	سال × ژنوتیپ	4	64.1 ^{ns}
L × G	مکان × ژنوتیپ	4	107.1 ^{ns}
Y × L × G	سال × مکان × ژنوتیپ	4	46.8*
Y × R	سال × حذف سنبلچه	2	36.9 ^{ns}
L × R	مکان × حذف سنبلچه	2	21.5 ^{ns}
Y × L × R	سال × مکان × حذف سنبلچه	2	40.6 ^{ns}
Y × G × R	سال × ژنوتیپ × حذف سنبلچه	8	8.9 ^{ns}
L × G × R	مکان × ژنوتیپ × حذف سنبلچه	8	6.6 ^{ns}
Y × L × G × R	سال × مکان × ژنوتیپ × حذف سنبلچه	8	22.9 ^{ns}
Error b	خطای ب	112	17.9
CV(%)	ضریب تغییرات (درصد)	10.2	

ns: غیر معنی دار

* و **: معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

ns: Non-significant

* and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

جدول ۳- تجزیه واریانس مرکب اثر ژنوتیپ های گندم و حذف سنبلچه ها بر وزن یک دانه در شرایط تنش خشکی انتهای فصل در کرج و اردبیل در سال زراعی ۱۳۸۳-۸۴

Table3. Combined analysis of variance for effects of wheat genotypes and removed spikelets on single grain weight under terminal drought stress t in Karaj and Ardabil in 2004 - 2005 cropping season

S. O. V	منابع تغییر	درجه آزادی df	میانگین مربعات (MS)
Location (L)	مکان	1	3992.5**
Error a	خطای الف	4	5.2
Genotype (G)	ژنوتیپ	4	120.6 ^{ns}
L × G	مکان × ژنوتیپ	4	25.4 ^{ns}
Spikelet Removal (R)	حذف سنبلچه	2	647.5**
L × R	مکان × حذف سنبلچه	2	32.5 ^{ns}
G × R	ژنوتیپ × حذف سنبلچه	8	24.0 ^{ns}
L × G × R	مکان × ژنوتیپ × حذف سنبلچه	8	18.8 ^{ns}
Error b	خطای ب	56	12.39
CV (%)	ضریب تغییرات (درصد)	9.1	

ns: Non-significant

ns: غیر معنی دار

* و **: معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

* and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

نیست، بلکه محدودیت تامین و انتقال مواد پرورده در گندم زمستانه در مناطق سرد کشور و به ویژه در منطقه خشک را تعیین می کند. در همه ژنوتیپ ها با حذف طول دوره پر شدن دانه است که عملکرد دانه در ارقام

عمل حذف سنبلچه ها در هر دو شرایط تنش و آبیاری معمول داشتند (جدول ۴). با توجه به عدم محدودیت مخزن برای افزایش وزن، به نظر می‌رسد که در برنامه‌های اصلاح گندم به ویژه برای شرایط تنش خشکی، انتخاب والدین با وزن هزار دانه بالا احتمالا بتواند به افزایش عملکرد کمک نماید.

نتایج آزمایشات بررسی ظرفیت مخزن با روش

سنبلچه افزایش قابل ملاحظه ای در افزایش وزن دانه‌های باقیمانده مشاهده شد.

در بین لاین ها و ارقام نیز از نظر مقدار افزایش وزن دانه های باقیمانده تنوع وجود داشت. رقم توس کمترین افزایش وزن دانه را در دانه های باقیمانده پس از تیمار حذف سنبلچه ها در شرایط آبیاری معمول نشان داد، ولی بقیه ژنوتیپ ها افزایش بیشتری پس از

جدول ۴- میانگین وزن تک دانه از دانه‌های باقیمانده ژنوتیپ های گندم در تیمارهای ۲۵ و ۵۰ درصد حذف سنبلچه ها و شاهد (بدون حذف سنبلچه ها) در شرایط آبیاری معمول در دو سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ و ۸۴-۱۳۸۳ و در شرایط تنش خشکی انتهای فصل در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در اردبیل و کرج

Table 4. Mean comparison of single grain weight of remaning grains in wheat genotypes when 25% and 50% of spikelets removed and in the control plots (no spikelet removed) under normal irrigation in 2003 – 2004 and 2004 - 2005 cropping seasons and terminal drought stress conditions in 2004-2005 cropping season in

Ardabil and Karaj

Treatment	تیمار	Grain weight (mg)	
		آبیاری معمول	تنش خشکی
		Normal irrigation	Drought stress
Spikelets removed (R)	حذف سنبلچه ها		
50% R	۵۰٪ حذف سنبلچه ها	44.4 a	41.4 a
25% R	۲۵٪ حذف سنبلچه ها	42.0 a	41.2 a
Control (Non-Removal)	شاهد (بدون حذف سنبلچه ها)	37.2 b	33.3 b
Genotypes	ژنوتیپ ها		
Gaspard	گاسپارد	41.6 ab	38.8a
Toos	توس	38.8 b	35.7 a
C-79-16	C-79-16	39.9 b	36.7 a
C-80-10	C-80-10	45.1 a	42.3 a
Shahryar	شهریار	40.6 ab	39.6 a

در هر ستون میانگین هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال یک درصد دارای تفاوت معنی داری ندارند. Means in each column followed by at least one similar letter are not significantly different at 1% prbability level, using Duncan's Multiple Range Test

بر امکان افزایش عملکرد دانه از طریق افزایش وزن دانه بعد از اعمال تیمارهای حذف سنبلچه ها در بعد از گرده افشانی در شرایط تنش خشکی مطابقت دارد. ژنوتیپ‌های مختلف گندم عکس العمل های متفاوتی در رسیدن به پتانسیل واقعی عملکرد دانه از طریق افزایش وزن دانه دارند. بلام و همکاران (Blum et al., 1988) گزارش کردند که کاهش مصنوعی تعداد سنبلچه در سنبله باعث افزایش وزن دانه

حذف ۲۵ و ۵۰ درصد سنبلچه ها در شرایط آبیاری معمول و به ویژه در شرایط تنش خشکی انتهای فصل نشان داد که وزن دانه ها در ژنوتیپ های گندم زمستانه و بینابین در حال حاضر به پتانسیل واقعی خود نرسیده اند. با وجود اینکه داگان و فولر (Duggan and Fowler, 2006) در شرایط آبیاری معمول، افزایشی در وزن دانه های باقیمانده مشاهده نکردند، ولی نتایج تحقیق حاضر با یافته های آنان مبنی

پتانسیل عملکرد دانه، هم از طریق ایجاد محدودیت در ظرفیت مخزن (Fischer *et al.*, 1977) و هم بر اثر محدودیت در منابع تامین کننده مواد پرورده (Duggan *et al.*, 2000) دچار محدودیت می شود. با وجود این نتایج، این آزمایش ضمن مطابقت با نتایج بلوم و همکاران (Blum *et al.*, 1988) و فیشر و همکاران (Fischer *et al.*, 1977) بیانگر آن می باشد که یکی از راهبردهای افزایش عملکرد دانه در ارقام گندم، دستکاری در ظرفیت مخزن است. در گزارش های علمی متعددی اعلام شده است که هم از طریق کاهش در ظرفیت مخزن (مصنوعی) و نیز با افزایش توانایی انتقال مواد پرورده به دانه، رشد دانه افزایش می یابد (Blum *et al.*, 1988; Ma *et al.*, 1990; Blade and Baker, 1991). در مقابل با کاهش تولیدات فتوسنتزی در مرحله گرده افشانی، رشد دانه کاهش می یابد که دلیل بر نقش مهم تولیدات فتوسنتزی در طی مرحله پر شدن دانه در افزایش وزن دانه است. ارتباط وزن دانه با عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی در سایر گزارش ها نیز بیانگر آن است که در شرایط دیم ارقامی که از دانه درشت تری برخوردار هستند، عملکرد مطمئن تری تولید می کنند (Mahfoozi *et al.*, 2004). نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد که امکان افزایش عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم زمستانه و بینابین از طریق افزایش وزن دانه نه تنها در شرایط تنش خشکی انتهای فصل بلکه در شرایط آبیاری معمول برای مناطق سرد و معتدل سرد نیز وجود دارد.

های باقیمانده می شود و عکس العمل ژنوتیپ های گندم نیز به عمل حذف سنبله ها در جهت افزایش ظرفیت مخزن متفاوت است. فیشر (Fischer, 1985) نقش دوره ای از نمو گیاه را قبل از شروع گرده افشانی در تعیین تعداد دانه در سنبله بسیار مهم دانست. با وجود این طبق برخی گزارش ها یک دوره بسیار کوتاه نیز پس از گرده افشانی (زمانی که تعداد سلول های آندوسپرم تعیین می شود) در تعیین وزن دانه نقش مهمی دارد. کمبود انتقال مواد پرورده در این دوره زمانی که تعداد سلول های آندوسپرم تعیین می شود، ممکن است وزن دانه را محدود نماید (Cochrane and Duffus, 1983). تلاش برای افزایش وزن دانه به منظور افزایش عملکرد دانه ارقام گندم، بدون افزایش انتقال مواد پرورده ممکن است بی فایده به نظر برسد، ولی در برخی گزارش ها همبستگی بسیار قوی و نزدیک بین تعداد دانه در سنبله و عملکرد گزارش شده است (Entz and Fowler, 1990). نتایج برخی از یافته های تحقیقاتی بیانگر آن هستند که عملکرد دانه از طریق محدودیت مخزن تاثیر پذیرفته و افزایش تعداد دانه علیرغم تاثیر بر کاهش وزن دانه می تواند عملکرد را افزایش دهد (Borras *et al.*, 2004). با وجود این، نتایج برخی گزارش ها نیز بیانگر آنست که کاهش عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی ناشی از اثر تنش در کاهش تولیدات فتوسنتزی است تا تاثیر آن بر ظرفیت فتوسنتزی گیاه (Entz and Fowler, 1989). تنش خشکی هم بر روی تولیدات فتوسنتزی و هم بر روی انتقال مواد پرورده به دانه اثر می گذارد. میزان

References

- Anonymous, 2005.** Agricultural statistics, Ministry of Jihad-e-Agriculture (Vol. I). Agricultural and Horticultural Crop Plants (In Persian).
- Blade, S. F. and R. J. Baker 1991.** Kernel wheat response to source-sink response in spring wheat. Crop Sci. 31: 1117-1120.
- Blum, A., J. Mayer and G. Golan. 1988.** The effect of grain number per ear (sink size) on source activity and its water-relations in wheat. J. Exp. Bot. 39: 106-114.

منابع مورد استفاده

- Borras, L., G. A. Slafer, and M. G. Otegui. 2004.** Seed dry weight response to source-sink manipulation in wheat, maize and soyabean. A quantitative reappraisal. *Field Crops Res.* 86: 131-146.
- Calderini, D. F. and M. P. Reynolds. 2000.** Changes in grain weight as a consequence of de-graining treatments at pre- and postanthesis in synthetic hexaploid lines of wheat (*Triticum durum* and *T. tauschii*). *Aust. J. Plant Physiol.* 27: 183-191.
- Cochrane, M. P. and C. M. Duffus. 1983.** Endosperm cell number in cultivars of barley differing in grain weight. *Ann. App. Bio.* 102: 177-181.
- Duggan B. L., D. R. Domitruck and D. B. Fowler. 2000.** Yield component variation in winter wheat grown under drought stress. *Can. J. Plant Sci.* 80: 739-745.
- Duggan B. L. and D. B. Fowler. 2006.** Yield structure and kernel potential of wheat on the Canadian prairies. *Crop Sci.* 46: 1479-1487.
- Entz, M. H. and D. B. Fowler. 1989.** Influence of crop water environment and dry matter accumulation on grain yield of no-till winter wheat. *Can. J. Plant Sci.* 69: 367-375.
- Entz, M. H. and D. B. Fowler. 1990.** Differential agronomic response of winter wheat cultivars to preanthesis environmental stress. *Crop Sci.* 30: 1119-1123.
- Fischer, R. A., I. M., Aguilar, and D. R. Laing. 1977.** Postanthesis sink size in a high-yielding dwarf wheat. Yield response to grain number. *Aust. J. Agric. Res.* 28: 165-175.
- Fischer, R. A. 1985.** Number of kernels in wheat crops and the influence of solar radiation and temperature. *J. Agric. Sci. Camb.* 105: 447-461.
- Jedel, P. E. and L. A. Hunt. 1990.** Shading and thinning effects on multi and standard- floret winter wheat. *Crop Sci.* 30: 128-133.
- Kirby, E. J. M. and H. G. Jones. 1977.** The relations between main shoot and tillers in barley plants. *J. Agric. Sci. Camb.* 88: 381-389.
- MA, Y. Z., C. T. Mackown, and D. A. Van Sanford. 1990.** Sink manipulation in wheat. Compensatory changes in kernel size. *Crop Sci.* 30: 1099-1105.
- Mahfoozi S., M. Rousatii, S. Jasemi, H. Ketat, and D. B. Fowler. 2004.** Breeding for increasing wheat yield in the cold dryland regions of Iran. *Proceedings of 4th International Conference of Crop Science, Brisbane, Australia.*
- Miralles, D. J. and G. A. Slafer. 1995.** Yield, biomass and yield components in dwarf, semi-dwarf and tall isogenic lines of spring wheat under recommended and late sowing dates. *Plant Breed.* 114: 392-396.
- Siddique, K. H. M., E. J. M. Kirby and M. W. Perry. 1989.** Ear-to-stem ratio in old and modern wheats; relationship with improvement in number of grains per ear and yield. *Field Crops Res.* 21: 59-78.
- Slafer, G. A. and F. H. Andrade. 1989.** Genetic improvement in bread wheat (*Triticum aestivum* L.) yield in Argentina. *Field Crops Res.* 21: 289-296.
- Slafer, G. A. and R. Savin. 1994.** Source-sink relationships and grain mass at different positions within the spike in wheat. *Field Crops Res.* 37: 39- 49.

Study of the possibility of increasing grain yield by increasing grain weight in winter and facultative wheat genotypes with manipulating sink capacity

S. Mahfoozi¹ and S. Jasemi²

ABSTRACT

S. Mahfoozi and S. Jasemi. 2010. Study of the possibility of increasing grain yield by increasing grain weight in winter and facultative wheat genotypes with manipulating sink capacity. *Iranian Journal of Crop Sciences*. 12 (1): 76-84 (in Persian).

Understanding of grain weight potential and determining of how it is affected by manipulating the sink capacity and assimilate supply and possibilities for increasing grain yield is a prerequisite for increasing grain yield in new wheat cultivars. This study was conducted to determine the importance of grain weight as well as assimilates supply, using removal spikelets method, in increasing grain yield in both normal irrigation (NI) and terminal drought stress (TDS) conditions. The experimental design was randomized complete block design (RCBD) with five genotypes at two locations (Karaj and Ardabil) under both NI and TDS conditions in 2003-2004 and 2004-2005 cropping seasons. Grain yield of each bread wheat genotype was measured in both locations in each year. After anthesis stage, 25% and 50% of spikelets of main stem were artificially removed, in each genotype. Results of combined analysis of variance and mean comparisons for grain yield showed that the highest grain yield of 7288 kg ha⁻¹ was obtained from cv. Gaspard with in NI conditions. However, there was not significant differences among cultivars for grain yield in TDS conditions. Results of combined analysis of variance also showed that the effect of genotype and year × location interaction as well as the effect of artificial spikelet removal and year × location × genotype on grain weight were significant at $P < 0.01$ and $P < 0.05$, in NI conditions, respectively, Effect of location and artificial spikelet removal on grain weight were also significant at $P < 0.01$ in TDS conditions. Genotype × artificial spikelet removal interaction on grain weight was not significant at $P < 0.05$. Artificially reducing spikelet numbers by 25% and 50% to increase assimilate supply to the remaining grains increased grain weight by about 13% and 18% in NI conditions, respectively. While, removing spikelets in TDS conditions increased the weight of remaining grains by about 24% as compared to the control (no removal). It is concluded that considerable potential exists for increasing grain weight and as consequences grain yield in winter/facultative wheat genotypes, hence, increasing wheat production in winter/facultative wheat growing areas in Iran.

Key words: Assimilate transport, Grain weight, Irrigation, Spikelet removal and Terminal drought stress.

Received: January 2008

Accepted: November, 2009

1- Assistant Prof., Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran. (Corresponding author)

2- Faculty member, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran.