

اثر نوع و مقدار کود دامی بر میزان وقوع و شدت بیماری‌های مهم، عملکرد و اجزای عملکرد پنبه (*Gossypium hirsutum* L.)

Effect of source and rate of manures on incidence and severity of important diseases, yield and yield components in cotton (*Gossypium hirsutum* L.)

محمود هوشیار فرد^۱ و عبدالرضا قرنچیکی^۲

چکیده

هوشیار فرد، م. و ع. ر. قرنچیکی ۱۳۸۸. اثر نوع و مقدار کود دامی بر میزان وقوع و شدت بیماری‌های مهم، عملکرد و اجزای عملکرد پنبه (Gossypium hirsutum L.). مجله علوم زراعی ایران: ۱۱ (۳): ۲۴۷-۲۴۸.

به منظور بررسی اثر مصرف کودهای دامی بر بیماری‌های مرگ گیاهچه، پژمردگی ورتیسیلیومی، لکه برگی آلتناریایی و عملکرد و اجزای عملکرد پنبه آزمایشاتی طی سال‌های ۱۳۸۳-۸۵ به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهارتکرار در ایستگاه تحقیقات پنبه کردکوی (۳۵ کیلومتری غرب شهرستان گرگان) اجرا شد. سه نوع کود دامی شامل گاوی، گوسفنندی و مرغی و چهار مقدار آنها شامل صفر، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ تن در هکتار به عنوان فاکتورهای آزمایش مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر سال بر صفات تعداد و طول شاخه زایا ($P < 0.05$) درصد و شدت بیماری لکه برگی آلتناریایی ($P < 0.01$) معنی دار بوده است. اثرات اصلی نوع کود و مقدار کود بر طول شاخه زایای پنجم، وزن قوزه، درصد سبز، عملکرد و ش، پژمردگی ورتیسیلیومی، درصد آلودگی آلتناریایی بوته در سطح پنج درصد و بر تعداد قوزه در بوته، مرگ گیاهچه پس از خروج از حاک، شدت لکه برگی آلتناریایی در سطح یک درصد معنی دار بود. همچنین اثرات متقابل نوع کود × مقدار کود، بر وزن قوزه، تعداد قوزه، درصد سبز، عملکرد محصول و کلیه صفات بیماری اندازه گیری شده در سطح پنج و یک درصد معنی دار بود. کود مرغی به مقدار ۲۰ تن و کود گاوی به مقدار ۱۰ تن در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد و اجزای عملکرد پنبه را تشکیل دادند. در بین تیمارهای کودی بیشترین درصد سبز و کمترین مرگ گیاهچه در تیمار کود مرغی به مقدار ۲۰ تن، بیشترین و کمترین درصد آلودگی در تیمارهای کود گاوی به مقدار ۱۰ تن و کود گاوی به مقدار ۱۰ تن و کمترین شدت آلودگی در تیمار کود گاوی به مقدار ۳۰ تن در هکتار مشاهده شد. از نظر بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی، کمترین درصد بوته‌های بیمار و شاخص بیماری در تیمار کود مرغی به مقدار ۳۰ تن، بیشترین درصد آلودگی بوته در تیمار کود گوسفنندی به مقدار ۱۰ تن و بیشترین شاخص بیماری در تیمار کود گاوی به مقدار ۱۰ تن در هکتار مشاهده گردید. بطود کلی بیشترین عملکرد و کمترین مرگ گیاهچه و پژمردگی ورتیسیلیومی بوته در تیمارهای کود مرغی مشاهده شد. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان اظهار داشت که مصرف کود مرغی در اراضی با آلودگی ورتیسیلیومی علاوه بر بیبود برخی صفات زراعی گیاه پنبه می‌تواند با کاهش شدت بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی بوته از افت معنی دار عملکرد آن جلوگیری کند.

واژه‌های کلیدی: پژمردگی ورتیسیلیومی، پنبه، کود دامی، مرگ گیاهچه و لکه برگی آلتناریایی.

تاریخ دریافت: ۱۳۸۶/۰۵/۲۶

۱- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (مکاتبه کننده)

۲- عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور

مقدمه

از *Pythium irregular* و پوسیدگی ساقه فلفل در اثر *Phytophthora* می شود. کرافت و نلسون (Craft and Nelson, 1996) با بررسی اثر شش نوع کمپوست کود حیوانی بر نوعی بیماری لکه برگی ناشی از *Agrostis stolonifera* در *Pythium graminicola* در نتیجه گرفتند که اثر کود گاوی در مهار بیماری بیشتر بوده است. سالی و میلر (Sally and Miller, 1999) نیز تاثیر چند نوع کمپوست دامی را بر بیماری های گوجه فرنگی بررسی و اظهار داشتند که کود های گاوی و اردک باعث کاهش بیماری های بلایت زودرس، لکه برگی سپتoria بیانی و آنتراکنوز گوجه فرنگی می شوند. این آزمایش با هدف بررسی اثرات مصرف کودهای دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد، وقوع و شدت بیماری های مهم مرگ گیاهچه، لکه برگی آلتارناریا بیانی و پژمردگی ورتیسیلیومی پنه در مزرعه با ساقه آلدگی خاک به قارچ های مهم خاکزد اجرا گردید.

مواد و روش ها

این تحقیق طی دو سال زراعی ۱۳۸۳-۸۵ در ایستگاه تحقیقات بیماری های پنه (ایستگاه کردکوی) واقع در ۳۵ کیلومتری غرب شهرستان گرگان با استفاده از کوددامی تقریباً پوسیده روی پنه رقم سای اکرا اجرا گردید. بافت خاک محل اجرای آزمایش سیلتی-لوم، اسیدیت آن ۷/۹ و دارای مواد آلی متوسط، یک سفره آب زیرزمینی تقریباً "سطحی و سابقه آلدگی به قارچ های عامل مرگ گیاهچه و پژمردگی ورتیسیلیومی بود. آزمایش به صورت فاکتوریل 3×4 در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهارتکرار اجرا شد. سه نوع کوددامی شامل گاوی، گوسفندی و مرغی و چهارمقدار کود دامی شامل صفر، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ تن در هکتار دو فاکتور آزمایش را تشکیل می دادند. هر کرت شامل ۶ ردیف کاشت به طول ۱۱ متر و فواصل کاشت 80×20 سانتیمتر بود (بین تیمارها یک خط نکاشت به منظور پیشگیری از

اگرچه در زمان های گذشته تغذیه گیاهان بر مبنای کودهای دامی بوده است ولی سهولت کاربرد کودهای شیمیایی باعث گردیده تا مصرف کودهای آلی تا حد زیادی فراموش شود و در ضمن عوارض مصرف بی رویه کودهای شیمیایی موجب بر هم خوردن تعادل عناصر غذائی، آب شونی و آلدگی آب های زیرزمینی گردد (Lampkin and Measures, 1999). کود مرغی علاوه بر بهبود شرایط محیط برای زندگی میکروارگانیسم های مفید خاکی باعث اصلاح خاصیت فیزیکی خاک زراعی می گردد. عوامل بیماریزای گیاهی خاکزد به عنوان جزئی از اجتماع میکروبی خاک، اغلب اوقات را در حالت ساکن و خفته بسر می برند و از بقایای گیاهی در خاک بعنوان منابع اصلی مواد مغذی و انرژی استفاده می نمایند (Newman, 1985). در باره اثرات کمپوست های دامی در کنترل بیماری های گیاهی و جمعیت زنده خاک، آزمایش های مختلفی انجام شده است (Cook et al., 1983; Logsdon, 1993; Hoitink and Grebus, 1994 Chen et al., 1986 and 1987) برای تندش اسپور و فعالیت قارچ *Pythium ultimum* در خاک حاوی کمپوست را عامل مهار بیماری مرگ گیاهچه دانستند. لاک وود و فلینو (Lockwood and Flinow, 1981) Lockwood, 1988) مهم ترین مانع رشد و نمو میکروارگانیسم ها و از جمله عوامل بیماریزای گیاهی در خاک را محدودیت دسترسی به منابع قابل استفاده انرژی بیان داشتند. طبق مطالعات انجام شده توسط ماندلbaum و همکاران (Mandelbaum et al., 1988)، کیم و همکاران (Kim et al., 1996) مصرف کود های دامی منجر به کنترل برخی از بیماری های گیاهی نظری ریشه گرزی کلم، پوسیدگی ریشه پنه در اثر *Phymathotrichum omnivorum*، پوسیدگی ریشه ناشی

....

آب مقطر شسته شده و در دمای ۶۴ درجه سانتی گراد در آون خشک و جهت تجزیه شیمیایی به آزمایشگاه ارسال شدند (جدول ۳). در پایان فصل، ارتفاع بوته در زمان گلدهی، عملکرد و ش اجزای عملکرد شامل تعداد قوزه و وزن قوزه، تعداد و طول شاخه زایا و رویا اندازه گیری شدند. پس از ثبت داده ها، نتایج با استفاده از نرم افزار آماری MSTAT-C تجزیه و به کمک آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند (Little and Hills, 1978).

نتایج و بحث

نتایج تجزیه خاک نشان داد که خاک ایستگاه کرد کوی از نظر پتانسیم فقیر بوده و میزان آن در لایه سطحی، ۹۰ میلی گرم در کیلو گرم بود (جدول ۱). نتایج تجزیه واریانس مرکب دو ساله نشان داد که اثر سال بر صفات تعداد و طول شاخه زایا ($P<0.05$)، درصد و شدت آلودگی آلتئناریایی برگ معنی دار بوده است ($P<0.01$). نوع کود دامی بر صفات طول شاخه زایای پنجم، وزن قوزه، تعداد قوزه و عملکرد معنی دار و همچنین مقدار کود دامی بر تعداد و طول شاخه زایا ($P<0.05$)، تعداد و وزن قوزه در بوته ($P<0.01$) و عملکرد محصول ($P<0.01$) اثر معنی داری داشته است (جدول ۴ و ۵). صفات درصد سبز، طول شاخه زایا، وزن قوزه، تعداد قوزه در بوته، عملکرد، مرگ گیاهچه پس از خروج از خاک، درصد و شدت آلودگی لکه برگی آلتئناریایی و همچنین درصد آلودگی و شاخص بیماری ورتیسیلیومی بوته تحت اثر متقابل نوع کود و مقدار کود قرار گرفته و تفاوت معنی داری داشتند. با افزایش مقدار کود دامی عملکرد محصول افزایش و مقدار متوسط کود مرغی نسبت به تیمارهای کود گاوی و گوسفندی بیشترین عملکرد ۲۸۳ کیلو گرم در هکتار را داشت (جدول ۶ و ۷). این افزایش ناشی از افزایش طول و تعداد شاخه زایا، افزایش وزن و تعداد قوزه در بوته نسبت به شاهد (تیمار بدون مصرف کود دامی) بود

اختلاط کودهای دامی در نظر گرفته شد. قبل از اجرای آزمایش نمونه های خاک به روش مرکب از عمق صفر تا ۳۰ سانتیمتر تهیه و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن اندازه گیری شد (جدول ۱). زمین مورد نظر در سال قبل از آزمایش زیر کشت پنبه بود که در زمستان با گاآهن برگدان دار شخم و در بهار نیز یک شخم سبک و دو بار دیسک زده شد و کودهای شیمیائی به مقدار ۵۰ کیلو گرم نیتروژن (از منبع اوره)، ۱۰۰ کیلو گرم پتاسیم از منع سولفات پتاسیم و ۱۰۰ کیلو گرم فسفر از منبع دی آمونیوم فسفات در هکتار براساس نتایج آزمون خاک و توصیه بهزراعی به خاک افزوده شد. کود های دامی یک ماه قبل از کاشت در سطح خاک پخش و با استفاده از روتویاتور با خاک مخلوط شدند. قبل از مصرف کود دامی نمونه های مرکب به صورت تصادفی تهیه و میزان عناصر آلی و معدنی آنها (بر حسب وزن خشک) اندازه گیری شدند (جدول ۲). در طول دوره رشد درصد سبز و مرگ گیاهچه در ۳۰ روز پس از کاشت، آلودگی ورتیسیلیومی بوته و شدت آن در چهار ماه بعد از کاشت به صورت شاخص بیماری بر اساس مقیاس صفت تا چهار (صفر=بوته کاملا سالم، ۴=بوته کاملا لخت و بدون برگ و قوزه) از رابطه زیر بدست آمد:

(۱) شدت بیماری × درصد بیماری = شاخص بیماری
بدست آمد (Bejarno-Alcazar *et al.*, 1995). وضعیت آلودگی به لکه برگی آلتئناریایی ۴۵ روز بعد از کاشت در هر تیمار با انتخاب تصادفی تعداد ده گیاهچه از دو ردیف کاشت میانی تعیین شد. درصد آلودگی برگ با شمارش تعداد برگ های سالم و آلوده در هر کرت و تعیین شدت آلودگی برگ بر اساس سطح آلودگی برگ طبق مقیاس صفت تا پنج (صفر=بدون لکه برگی و ۵=نکروز کامل برگ) محاسبه شد. در مرحله گلدهی (حدود ۸۵ روز پس از کاشت) تعداد ۲۰ نمونه برگ کامل همراه دمبرگ از دو ردیف کاشت میانی در هر کرت تهیه شد. نمونه هایکبار با آب معمولی و دوبار با

مقادیر مختلف کود مرغی کمترین (۲/۵-۳/۸ درصد) و کودهای گاوی و گوسفندی بیشترین درصد مرگ گیاهچه پس رویشی پنه را در ۳۰ روز پس از کاشت داشتند. میلنر و همکاران (Millner *et al.*, 2004) طی آزمایشات گلدانی اظهار داشتند که مصرف کود مرغی به مقدار ۵ درصد حجمی نسبت به مقادیر ۱۰ و ۲۰ درصد حجمی کود گاوی، باعث کاهش بیشتر بیماری پوسیدگی پی تیومی ریشه توت فرنگی تا میزان ۳۶-۷۹ درصد شد.

(جدول ۷). هویتنک و فابی (Hoitink and Faby, 1986) با بررسی برخی اثرات مصرف کود مرغی در خاک اظهار داشتند که با مصرف این نوع کود علاوه بر مساعد شدن محیط خاک برای فعالیت میکروارگانیسم های مفید، خواص فیزیکی خاک زراعی نیز اصلاح می شود. از نظر درصد سبز، مقادیر بالا و متوسط کود گوسفندی کمترین و مقدار متوسط کود مرغی بیشترین (۵۳ درصد) مقدار را نسبت به تیمارهای کود گاوی و شاهد (بدون مصرف کوددامی) داشتند. همچنین مصرف

جدول ۱- مشخصات فیزیکو شیمیائی خاک محل آزمایش

Table 1. Physiochemical analysis of soil in the experimental field

ماده آلی OC (%)	فسفر قابل جذب P (mg.kg ⁻¹)	پتاسیم قابل جذب K (mg.kg ⁻¹)	نیتروزن کل Total N (%)	اسیدیته pH	هدایت الکتریکی EC (ds.m ⁻¹)	شن Sand (%)	رس Clay (%)	سلت Silt (%)	بافت خاک Soil texture
1.08	8.6	90	0.13	7.9	1.13	12	12	74	Silty-loam

کادیر (Kadir, 1985) با مصرف کمپوست کود دامی تازه و پوسیده در خاک اعلام کرد که خصوصیات بازدارنده‌گی متفاوتی نسبت به مرگ گیاهچه تربیجه در اثر *Rhizoctonia solani* وجود دارد. هیاکوماشی و یوئی آزمون زیست سنجی در شرایط آزمایشگاهی نشان دادند که کمپوست‌های گاوی و مخلوط کمپوست کود گاوی و مرغی اثر مهار کنندگی مطلوبی بر بیماری مرگ گیاهچه لوییا در اثر *Sclerotium rolfsii* داشته است. کمترین درصد آلدگی ورتیسیلیومی بوته (۴۹/۷-۵۵) در مقادیر شاخص بیماری ورتیسیلیومی (۰/۵-۰/۷) در مقادیر مختلف کود مرغی مشاهده شد (جدول ۸). نکته

کادیر (Kadir, 1985) با مصرف کمپوست کود دامی تازه و پوسیده در خاک اعلام کرد که خصوصیات بازدارنده‌گی متفاوتی نسبت به مرگ گیاهچه تربیجه در اثر *Rhizoctonia solani* وجود دارد. هیاکوماشی و یوئی آزمایشاتی به ارتباط بین ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی خاک از جمله مواد آلی، مقدار کربن و نیتروژن یا نسبت آنها با کاهش بیماری پوسیدگی ریشه چغندر ناشی از *R. solani* پی بردن. کود گاوی باعث کاهش مرگ گیاهچه پس ۳۰ روزه ناشی از *R. solani* و کود گاوی و خصوصاً گوسفندی باعث افزایش مرگ گیاهچه ناشی از *Pythium* گردید (جدول ۸). هاردی و گورودیکی

جدول ۲- تجزیه شیمیایی کودهای دامی مورد استفاده

Table 2. Chemical analysis of livestock manures

Manure source	نوع کوددامی	اسیدیته pH	نیتروزن کل Total N (%)	فسفر کل Total P (%)	پتاسیم کل Total K (%)	هدایت الکتریکی (mmhos.cm ⁻¹)	کلسیم کل Total Ca (%)
Cow	گاوی	8.1	2.95	1.22	2.30	24.10	2.10
Sheep	گوسفندی	7.5	3.46	2.11	2.43	23.60	2.40
Poultry	مرغی	8.6	3.67	1.32	5.40	31.40	1.30

....

جدول ۳- تجزیه شیمیائی مخلوط برگ و دمبرگ پنبه

Table 3. Chemical analysis of cotton leaf and petiole

نوع کوددادای Manure source	N (%)	P (%)	K (%)	پتاسیم Ca (%)	کلسیم Mg (%)	منزیم آهن Fe (mg.kg ⁻¹)	منگنز Mn (mg.kg ⁻¹)	روی Zn (mg.kg ⁻¹)	مس Cu (mg.kg ⁻¹)	ب B (mg.kg ⁻¹)
Cow manure	کود گاوی	4.37	0.25	2.20	4.07	0.71	134.7	195.7	42.2	11.5
	کود گوسفندی	4.45	0.26	2.27	4.20	0.73	125.7	200	41.2	11.5
	کود مرغی	4.47	0.25	2.30	3.95	0.77	144.5	225.5	43.7	11
Poultry manure										95.5

جدول ۴- تجزیه مرکب صفات زراعی گیاهی پنبه در سه نوع تیمار کود دامی (۱۳۸۳-۸۵)

Table 4. Combine analysis for plant characteristics of cotton in three livestock manure treatments (2004-2006)

S.O.V	مانع تغیر	درجه آزادی df	میانگین مرباعات (Ms)								عملکرد و ش Seedcotton yield
			تعداد شاخه رویا No. monopods	طول بلندترین شاخه رویا Length of longest monopods	تعداد شاخه زایا No. sympods	طول شاخه زایای پنجم Length of 5 th sympod	ارتفاع بوته Plant height	وزن قوزه Boll weight	تعداد قوزه در بوته Boll.plant ⁻¹		
Year (Y)	سال	1	156.02	166.69 n.s	6.36 *	1314.82 *	527.64 n.s	4685.2 n.s	6.00 n.s	6512314.8 n.s	
Rep/Y	تکار درون سال	6	46.762	48.563	1.87	307.427	188.65	1340.656	2.18	1195610.672	
Manure source (MS)	نوع کود دامی	2	1.104 n.s	605.304 n.s	8.232 n.s	549.10 **	189.38 n.s	4103.25**	21.942 **	2454228.7 **	
MS×Y	نوع کود × سال	2	29.4 n.s	75.389 n.s	1.740 n.s	262.98 n.s	167.857 n.s	2170.519*	1.948 n.s	2039063.2*	
Manure rate (MR)	مقدار کود دامی	3	66.761 n.s	23.26 n.s	12.989 **	552.74**	128.35 n.s	1059.56**	2.776**	3476314.1**	
Y×MR	سال × مقدار کود	3	407.212 n.s	31.697 n.s	7.128 n.s	276.22 n.s	187.61 n.s	502.32*	5.296**	5648356.9**	
MS×MR	نوع کود × مقدار کود	6	207.506 n.s	22.235 n.s	5.714 n.s	401.21 *	68.93 n.s	891.332**	2.815*	2001641.9*	
Y×MS×MR	سال × نوع کود × مقدار کود	6	23.379 n.s	14.295 n.s	0.459 n.s	148.713 n.s	44.339 n.s	573.32*	0.514 n.s	1044288.85 n.s	
Error	خطا	66	5.914	9.52	3.306	99.085	39.542	182.145	0.242	429275.13	
C.V (%)	ضریب تغییرات (درصد)		13.74	11.73	13.46	4.78	11.73	8.93	6.90	19.86	

ns : Non-significant

ns : غیر معنی دار

*, **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

* و **: به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

جدول ۵ - تجزیه مرکب صفات درصد سبز، بیماری های مرگ گیاهچه، لکه برگی آلتناریایی و پژمردگی ورتیسیلیومی پنهان در سه نوع تیمار کودی (۱۳۸۳-۸۵)

Table 5. Combine analysis for field emergence, damping-off, Alternaria leaf spot and Verticillium wilt diseases of cotton in three livestock manure treatments (2004-2006)

S.O.V	متابع تغییر	درجه آزادی df	میانگین مربوطات (MS)							
			درصد سبز روزه ۳۰	درصد مرگ گیاهچه روزه ۳۰	درصد آلدگی آلتناریایی Alternaria leaf spot	شدت لکه برگی آلتناریایی Alternaria leaf spot severity	درصد پژمردگی ورتیسیلیومی ۲ماهه Verticillium wilt (2-month)	درصد پژمردگی ورتیسیلیومی ۴ماهه Verticillium wilt (4-month)	شاخص پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium wilt index	
			Emergence 30-day	Post-emergence damping-off30-day						
Year (Y)	سال	1	322.85 n.s	10.368 n.s	128.4 **	63.109**	102.148 n.s	104.315 n.s	6.032 n.s	
Rep/Y	تکرار درون سال	6	143.573	3.118	14.719	9.341	36.577	39.114	4.025	
Manure source			257.845 *	109.276 **	59.8 **	20.093 *	109.342 *	14.003 *	6.180 *	
(MS)	نوع کود دامی	2								
MS×Y	نوع کود × سال	2	199.014 n.s	73.437 *	80.97 **	21.243 *	96.473 *	9.173 n.s	5.590 *	
Manure rate			143.573 **	311.118 **	31.711 *	16.341 *	306.577 **	114.114 **	4.502 *	
(MR)	مقدار کود دامی	3								
Y×MR	سال × مقدار کود	3	67.845 n.s	49.276 n.s	59.8 **	2.093 n.s	315.342 **	54.003 n.s	3.328 N.S	
MS×MR	نوع کود × مقدار کود	6	109.014 *	130.437 **	80.97 *	21.243 **	109.473 *	81.173 *	6.150 *	
	نوع کود × سال		113.481 *	42.08 n.s	28.25 *	8.128 n.s	92.681 **	41.352 n.s	1.926 N.S	
Y× MS×MR	مقدار کود × مقدار کود	6								
Error	خطا	66	19.06	11.24	6.90	3.52	18.31	17.66	0.83	
C.V (%)	ضریب تغییرات (درصد)		11.25	8.48	14.37	10.12	13.46	14.07	9.16	

ns : Non-significant

غير معنی دار ns

*,**: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

*: به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

جدول ۶- مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در منابع و مقادیر مختلف کود دامی

Table 6. Mean comparison of yield and yield components of cotton in different source and application rates of livestock manures

تیمارهای آزمایشی Treatments	تعداد شاخه رویا No. monopods	طول بلندترین شاخه رویا Length of the longest monopods(cm)	تعداد شاخه زایا No. sympods	طول شاخه زایای پنجم Length of 5 th sympod (cm)	تعداد قوزه در بوته Boll.plant ⁻¹	ارتفاع بوته Plant height (cm)	عملکرد وشن Seedcotton yield (kg.ha ⁻¹)
منبع کود دامی							
Source of manure							
Cow manure	1.5 a	125.5 a	15 ab	35.8 a	41 b	125.5 a	2038.7 b
Sheep manure	1.8 a	129 a	14.6 b	31.4 b	44.9 b	125.7 a	2285 b
Poultry manure	1.9 a	132.7 a	15.1 a	33.1 ab	51.3 a	129.3 a	2767 a
مقدار کود دامی (تن در هکتار)							
Rate of manure (ton.ha ⁻¹)							
0	1.5 a	131.7 a	14.3 b	29.3 b	32.2 b	131.7 a	1824 b
10	1.7 a	135.1 a	15 b	32.3 ab	44 a	131.8 a	2289 ab
20	1.7 a	129 a	15.1 b	35.4 a	46.5 a	125.7 a	2390.3 a
30	1.8 a	123 a	17.7 a	31.7 b	46.6 a	123 a	2411.3 a

در هر ستون میانگین هایی که دارای حروف مشترک هستند بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن تفاوت معنی دار آماری ندارند

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different using Duncan's Multiple Range Test

جدول ۷- اثرات متقابل نوع و مقدار کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه

Table 7. Interaction effects of source × rate of livestock manure on yield and yield components of cotton

نوع کود دامی Source of manure	مقدار کود دامی (ton.ha ⁻¹)	تعداد شاخه رویا No. monopods	طول بلندترین شاخه رویا Length of the longest monopods (cm)	تعداد شاخه زایا No. sympods	طول شاخه زایای پنجم Length of 5 th sympods (cm)	ارتفاع بوته Plant height (cm)	تعداد قوزه در بوته Boll.plant ⁻¹	عملکرد وش Seedcotton yield (kg.ha ⁻¹)	
Cow manure	کود گاوی	0	1.5 a	131.9 a	17.4 a	29.3 d	131.8 a	32.1 ef	1827 e
		10	1.6 a	129.7 a	14 ab	34.3 abc	129.7 a	41.3 cd	2010 e
		20	1.4 a	118.7 a	16.3 ab	34.4 abc	118.7 a	42.7 cd	2082 de
		30	1.6 a	128 a	14.7 ab	35.7 ab	128 a	39 de	2024 e
Sheep manure	کود گوسفندی	0	1.5 a	131.9 a	17 a	29.5 d	131.6 a	32.1 ef	1822 e
		10	1.7 a	135.7 a	15 ab	29.3 d	135.7 a	45.7 bc	2235 cde
		20	1.8 a	136 a	14.7 ab	34 abc	126 a	41.3 cd	2206 cde
		30	1.9 a	115.3 a	14 ab	31 cd	115.3 a	47.8 b	2414 abcd
Poultry manure	کود مرغی	0	1.2 a	131.3 a	17.5 a	29.1 d	131.7 a	32.4 ef	1823 e
		10	1.8 a	140 a	16 ab	33.3 bc	130 a	45.1 bc	2622 abc
		20	1.9 a	132.3 a	14 ab	37.8 a	132.3 a	55.8 a	2883 a
		30	1.9 a	125.7 a	15.3 ab	28.3 d	125.7 a	53 a	2796 ab

در هر ستون میانگین هایی که دارای حروف مشترک هستند بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن تفاوت معنی دار آماری ندارند

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different using Duncan's Multiple Range Test

....

جدول ۸- اثرات متقابل نوع و مقدار کود دامی بر درصد سبز و بیماری های مرگی گیاهچه، لکه برگی آلتناریایی و پژمردگی و رتیسیلیومی پنبه

Table 8- Interaction effects of source \times rate of livestock manures on emergence, damping-off, Alternaria leaf spot and Verticillium wilt diseases of cotton

نوع کود دامی Source of manure	مقدار کود دامی (ton.ha ⁻¹)	درصد سبز ۳۰ روزه Emergence 30-day (%)	مرگ گیاهچه Post-emergence damp-off 30-day (%)	آلودگی آلتناریایی (درصد) Alternaria leaf spot (%)	شدت لکه برگی آلتناریایی Alternaria leaf spot severity	پژمردگی و رتیسیلیومی ۴ ماهه Verticillium wilt 4-month (%)	شاخص پژمردگی و رتیسیلیومی Verticillium wilt index
Cow manure	کود گاوی	0	44.8 bc	ab 7	29.9 b	a 39.3	a 74.1
		10	40.2 de	7.5 ab	16 e	18.7 d	63.7 b
		20	41.3 cd	6.8 abc	18 e	18.7 d	57.3 bc
		30	42.7 cd	6.1 cd	10.3 f	13 e	56.4 bc
Sheep manure	کود گوسفندی	0	45.2 bc	abc 6.9	29.5 b	a 39.1	a 74.2
		10	42 cd	4.8 e	25.7 c	23 cd	71.7 a
		20	34.5 f	7.5 ab	22.7 d	25.3 c	62.7 ab
		30	39.3 de	8 a	21 d	21.7 cd	59.7 bc
Poultry manure	کود مرغی	0	45.3 bc	7.4 ab	29.7 b	a 39.5	a 74.6
		10	47.8 b	2.8 fg	38.7 a	32 b	55 cd
		20	53 a	3.8 ef	26.3 c	33.7 b	52.5 bc
		30	45.7 bc	2.5 gh	29.7 b	33.8 b	49.7 d

در هر ستون میانگین هایی که دارای حروف مشترک هستند بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن تفاوت معنی دار آماری ندارند

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different using Duncans Multiple Range Test

کودهای دامی با تجمع کربن آلی و افزایش بیوماس میکروبی خاک فعالیت آنتاگونیستی خاک را علیه عوامل بیماریزای خاکزاد تحریک می نماید. در آزمایش حاضر نیز به نظر می رسد که افزایش مصرف کودهای دامی، خصوصاً کود گاوی، باعث افزایش فعالیت آنتاگونیستی بیوماس میکروبی خاک شده و شرایط برای افزایش جمعیت عامل بیماری آلتنتاریا در خاک محدود شده و اسپورزایی آن کاهش یافته باشد.

دیگر این که مصرف کود دامی باعث کاهش شدت لکه برگی آلتنتاریا می نسبت به تیمار شاهد شد و کمترین درصد آلوودگی و شدت لکه برگی آلتنتاریا در مقادیر بالای کودهای گاوی و گوسفندی نسبت به مرغی مشاهده گردید. در این رابطه، گانپالا و اسکو (Gunapala and Scow, 1998) و پی کاک و همکاران (Peacock et al., 2001) نیز طی آزمایشاتی بیان کرده بودند که عملیات مدیریتی خاک مانند استفاده از

References

منابع مورد استفاده

- Bejarno-Alcazar, J., J. M. Melero-Vara, M. A. Blanco-Lopez and R. M. Jimenz-Djez.** 1995. Influence of inoculum density of defoliating and non-defoliating pathotypes of *Verticillium dahliae* on epidemiology of verticillium wilt of cotton in southern Spain. *Phytopath.* 85: 1472-1481.
- Chen, W., H. A. J. Hoitink and A. F. Schmitthenner.** 1986. Factors affecting suppression of *Pythium* damping-off in container media amended with composts. *Phytopath.* 77: 755-760.
- Chen, W., H. A. J. Hoitink and O. H. Tuovinen.** 1987. The role of microbial activity in suppression of damping-off caused by *Pythium ultimum*. *Phytopath.* 78: 314-322.
- Cook, R. J. and K. F. Baker.** 1983. The nature and practice of biological control of plant pathogens. Am. Phytopath. Soc., St. Paul, MN, USA.
- Craft, C. M., and E. B. Nelson.** 1996. Microbial properties of composts that suppress damping-off and root rot of creeping bentgrass caused by *Pythium graminicola*. *Appl. Environ. Microbiol.* 62: 1550-1557.
- Gunapala, N. and K. M. Scow.** 1998. Dynamics of soil microbial biomass and activity in conventional and organic farming systems. *Soil Biol. Biochem.* 30: 805-816.
- Hardey, Y. and B. Gorodecki.** 1991. Suppression of germination of sclerotia of *Sclerotium rolfsii*. *Soil Biol. Biochem.* 23: 93-114.
- Hoitink, H. A. J. and P. C. Faby.** 1986. Basis for control of soil-borne plant pathogens with composts. *Annu. Rev. Phytopath.* 24: 93-114.
- Hoitink, H. A. J. and M. E. Grebus.** 1994. In composting source separated organics; Plant Disease Control; J.G Press: Emmaus, PA, pp. 204-209
- Hyakumachi, M. and T. Ui.** 1982. Decline of Rhizoctonia root rot of sugar beet during application of some soil amendments. *Memoirs of Faculty of Agriculture Hokkaido University* 13: 445-457.
- Kadir, J. B.** 1985. Biological control of *Rhizoctonia solani* through the development of suppressive soils. M.Sc. Thesis. Iowa State Univ., Ames, USA.
- Kim, K. D., S. Nemec, and G. Mussen.** 1996. "Effects of composts and soil amendments on soil microflora and

- phytophthora stem rot of paper"; Indian River Research and Education Center. Fort Pierce, FL. USA.
- Lampkin, N. H. and M. Measures. 1999.** Organic farm management Handbook, 3rd Ed., Welsh Institute of Rural Studies, University Wales: Hamstead Marshel, Berkshire, pp.1-163.
- Little, T. M. and F. J. Hills. 1978.** Agricultural experimentation and analysis, John willey and Sons, Inc. New York. 245p.
- Lockwood, J. L. 1988.** Evaluations of concepts associated with soilborne plant pathogens. Annu. Rev. Phytopath. 26: 93-121.
- Lockwood, J. L. and A. B. Flinow. 1981.** Responses of fungi to nutrient-limiting conditions and to inhibitory substances in natural habitates. Adv. in Microb. Ecol. 5: 1-61.
- Logsdon, G. 1993.** Using compost for plant disease control. Biocycle 32: 31-36.
- Mandelbaum, R., Y. Harder and Y. Chen. 1988.** Composting of agricultural wastes for their use as container media: Effect of heat treatments on suppression of *Pythium aphanidermatum* and microbial activities in substrates containing compost. Biol.Wastes 26: 261-274.
- Millner, P. D., C. E. Ringer and J. L. Maas. 2004.** Suppression of strawberry root disease with animal manure composts. Compost Sci. Util. 12: 298-307.
- Newman, E. I. 1985.** The rhizosphere: Carbon sources and microbial population In: Fitter, A. H., Attkinson, D., Read, D. J. and M. B. Usher, (eds). Ecological Interaction in Soil: Plant, Microbs and Animals. Blackwell, Oxford. pp. 107-121.
- Peacock, A. D., M. D. Mullen, D. B. Ringelberg, D. D. Tyler, D. B. Hedrick, D. M. Gale and D. C. White. 2001.** Soil microbial community responses to dairy manure or ammonium nitrate application. Soil Biol. Biochem. 33: 1011-1019.
- Sally, A. and C. Miller. 1999.** Composts for diseases suppression. Proceedings of New England Vegetable and Berry Growers and Conference and Trade show P. 316-317.

Effect of source and rate of manures on incidence and severity of important diseases, yield and yield components in cotton (*Gossypium hirsutum* L.)

Hoshiarfard¹, M. and A. R. Gharanjiki²

ABSTRACT

Hoshiarfard, M. and A. R. Gharanjiki 2009. Effects of source and rate of manures on incidence and severity of important diseases, yield and yield components in cotton (*Gossypium hirsutum* L.). **Iranian Journal of Crop Sciences.** **11 (3): 236-248 (In Persian).**

To evaluate the effect of manures on the damping-off, Alternaria leaf spot (ALS), Verticillium wilt (VD), yield and yield components of cotton, a field experiment was carried out at Cotton Research Station of Kordkoy (35 km west of Gorgan,), Iran, with silty-loam soil and histories of soil-borne diseases including; seedling diseases (*Rhizoctonia solani*, *Pythium ultimum*, *Fusarium* spp.) and *Verticillium dahliae*, in 2004-06 growing seasons. Three sources of manure (cow, sheep and poultry) and four manure levels (0, 10, 20 and 30 tons.ha⁻¹) were arranged in a 3×4 factorial experiment using randomized complete block design with four replications. The results showed that the effect of source (S) and rate (R) of manures were significant on seedling emergence, length of 5th sympod, boll weight (BW), yield, VD and ALS, No. boll.plant⁻¹, post-emergence damping-off, and ALS severity. The S×R interaction was significant on BW, No. boll.plant⁻¹, seedling emergence, yield and i diseases incidence. Application of poultry manure (PM) increased cotton yield and decreased damping-off and verticillium wilt diseases. Among animal manures sources and levels 20 tons.ha⁻¹ of PM had the most seedling emergence and the least seedling diseases. However, the highest and lowest Alternaria leaf infection were scored in 10 tons.ha⁻¹ of PM and 30 tons.ha⁻¹ of cow manure (CM), respectively. The 30 tons.ha⁻¹ of CM had also the lowest disease severity. The greatest verticillium wilt incidence and severity was scored in 30 tons.ha⁻¹ of PM and the highest wilt infection and disease severity index were scored in 10 tons.ha⁻¹ sheep manure (SM) and 10 tons.ha⁻¹ of CM, respectively. In conclusion, application of poultry manure in the infected cotton field to the verticillium wilt improved agronomic performance and yield of cotton as well as reduced verticillium wilt incidence and severity.

Key words: Alternaria leaf spot, Cotton, Manure, Seedling diseases, Verticillium wilt and Yield.

Received: August, 2007

1- Faculty member, Agriculture and Natural Resource research Center of Guilan Province, Rasht, Iran
(Corresponding author)

2- Faculty member, Cotton research Institute of Iran, Gorgan, Iran