

## High frequency plantlet regeneration in the dioecious plant sorrel

علی ایزدی دربندی<sup>۱</sup> و علی محمد شکیب<sup>۲</sup>

Polygonaceae

(*Rumex acetosa* L.)

MS

(IAA)

(Kin)

(TDZ)

(BAP)

(Zeatin)

(NAA)

IAA BAP

(GA<sub>3</sub>)

BAP

/ IAA

(MS)

(Proliferation)

(*Rumex acetosa* L.)

به عنوان یک گیاه مدل در مطالعات ژنتیکی و مولکولی تعیین جنسیت مورد استفاده قرار گیرد (Ainsworth et al., 1998; Parker et al., 1991). تاکنون تعدادی ژن که در تشکیل اعضای گل دخالت دارند از این گیاه جداسازی شده که نیازمند تعیین نقش دقیق آنها از طریق انتقال به گیاه است (Ainsworth et al., 1995). انجام انتقال ژن در این گیاه

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۳/۳/۱۰

ترشک با نام علمی (*Rumex acetosa* L.) گیاهی علفی و دوپایه از خانواده پلی گوناسه است که از طریق رویشی (ریزوم) و زایشی (بذر) می تواند ازدیاد گردد. ویژگی های این گیاه از جمله تعداد کم کروموزم، دوپایه بودن، وجود کروموزم های جنسی و کوتاه بودن دوره رشد و نمو موجب شده است تا

تاریخ دریافت: ۱۳۸۲/۳/۲۱

۱ و ۲- به ترتیب کارشناس ارشد سابق و عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی کرج.

نیازمند روش مناسب کشت بافت و باززایی گیاه می‌باشد. در زمینه کشت بافت ترشک اطلاعات زیادی وجود ندارد. اولین گزارش در این زمینه توسط کالافیک و همکاران (Culafic et al., 1987 b) منتشر شد که در آن با استفاده از کشت جوانه، کوتیلدون و هیپوکوتیل روی محیط کشت حاوی هورمون‌های ۲،۴-دی کلروفونکسی استیک اسید (2,4-D) و کیتینین (Kin) و ایندول ۳- استیک اسید (IAA) کالوس تولید شده است که این کالوس‌ها عموماً ریشه‌زا بوده و گیاه باززایی نشد اما ریزازدیادی با کشت جوانه انتهایی انجام شد. اندام‌زایی از کالوس‌های حاصل از جوانه‌های جانبی از گونه دیگری به نام *R. acetosella* توسط همین نویسنده گزارش گردید. جنین‌های رویشی از این کالوس‌ها در محیط کشت دارای IAA، BAP و ۶ درصد ساکارز به دست آمد (Culafic et al., 1987 a). باززایی و تولید گیاه از طریق کشت قطعات ساقه‌های گلدهنده توسط شکیب (Shakib, 1999) گزارش گردیده است ولی استفاده از این بافت‌ها مستلزم شرایط مناسب از نظر درجه حرارت پایین (سرما) و دوره نوری (روز بلند) برای تحریک و رشد ساقه‌های گلدهنده می‌باشد. لذا استفاده از بافت‌های رویشی (نظیر برگ) که به راحتی در دسترس می‌باشند، بسیار مطلوب است. در این مطالعه نتایج پیشرفت در روش باززایی گیاه با استفاده از بافت‌های رویشی گزارش می‌گردد.

بذور حاصل از تلاقی یک رقم اصلاح شده ترشک (که تنها تولید پایه‌های ماده می‌نماید) و تیپ وحشی آن (به عنوان پایه نر) ضد عفونی سطحی گردید. برای این منظور ابتدا بذور را با آب مقطر استریل ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد شستشو داده و سپس ۲۰ ثانیه در الکل ۷۰ درصد و ۲۰ دقیقه در محلول ۲/۵ درصد هیپوکلریت سدیم تجاری (۵ درصد) قرار گرفتند که پس از هر

مرحله سه بار با آب مقطر استریل شستشو داده شدند. بذور سپس روی محیط MS حاوی ۲ درصد ساکارز و ۰/۸ درصد آگار کشت گردید تا جوانه زده و تولید گیاهچه نمایند. ریزنمونه‌ها شامل برگ، دم‌برگ، لپه، محور زیرلپه و ریشه از گیاهچه‌های حاصل انتخاب شدند. آزمایش‌ها تعیین مناسب‌ترین نوع ریزنمونه و محیط کشت باززایی گیاه به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار (سه پتری‌دیش شیشه‌ای ۹ × ۱/۵ سانتیمتر) و پنج ریزنمونه در هر پتری‌دیش انجام گردید. به این ترتیب واکنش کالوس‌دهی و باززایی بافت‌های گیاهی در طی چهار آزمایش روی محیط کشت یادشده با ترکیبات هورمونی متفاوت به شرح زیر بررسی گردید. تجزیه واریانس داده‌ها نیز پس از تبدیل آن‌ها ( $x^{0.5} + 0.5$ ) انجام گرفت.

کشت ریزنمونه‌ها در محیط کشت حاوی ایندول ۳- استیک اسید (IAA) با سه غلظت ۰/۰۱، ۰/۰۱ و ۱ میلی‌گرم در لیتر و کیتینین (Kin) با دو غلظت ۱/۵ و ۲/۵ میلیگرم در لیتر.

کشت ریزنمونه‌ها در محیط کشت حاوی IAA با دو غلظت صفر و ۰/۵ میلیگرم در لیتر و زآتین (Zeatin) با دو غلظت صفر و یک میلیگرم در لیتر. کشت ریزنمونه‌ها در چهار محیط

کشت زیر حاوی اکسین‌های IAA یا آلفا- نفتالین استیک اسید (NAA) با غلظت ۰/۷۵ میلیگرم در لیتر و سیتوکنین تیدیاژارون (TDZ) با غلظت‌های ۱ و ۱/۵ میلیگرم در لیتر. در این آزمایش ریزنمونه نوک ساقه (Shoot - apex) نیز به همراه بخشی از بافت‌های اطراف آن کشت گردید.

محیط T11: حاوی ۰/۷۵ میلیگرم در لیتر IAA و ۱ میلیگرم در لیتر TDZ.

محیط T12: حاوی ۰/۷۵ میلیگرم در لیتر IAA و ۱/۵ میلیگرم در لیتر TDZ.

محیط TN1: حاوی ۰/۷۵ میلیگرم در لیتر NAA و ۱ میلیگرم در لیتر TDZ.

رعایت حالت افقی و عمودی به ترتیب برای برش‌های طولی و عرضی درون پارافین در داخل مکعب‌های کاغذی انجام شد. از نمونه‌های قالب‌گیری شده با دستگاه میکروتوم و زاویه برش ۱۰ درجه، برش‌های ۱۰ میکرومتری تهیه شد. نمونه‌های حاضر پس از شستشو با گزیلول، نسبت متعادل گزیلول اتانل و آبدهی با سری اتانل ۱۰۰ تا ۲۵ درجه با هماتوکسیلین دلافلد جهت رنگ‌آمیزی هسته‌ها به مدت ۱۵ دقیقه تیمار شدند. این نمونه‌ها پس از آبگیری مجدد با سری اتانل ۲۵ تا ۹۶ درجه با فاست‌گرین به مدت ۲۰ تا ۶۰ ثانیه رنگ‌آمیزی شدند. مشاهده نهایی پس از شستشو متوالی با الکل مطلق، نسبت متعادل الکل: گزیلول و گزیلول خالص انجام شد. با این روش رنگ‌آمیزی، هسته، هستک قرمز رنگ می‌شود و دیگر قسمت‌های سلول سبز رنگ می‌گردند. نگهداری درازمدت از طریق ریختن یک قطره کانادابالزام و خشک کردن آن ممکن می‌گردد. مشاهدات میکروسکوپی بر روی نمونه‌های تهیه شده از مراحل مختلف القای کالوس، توسعه آن، تشکیل هسته‌های اولیه سلول‌های فعال، شکل‌گیری آغازی‌های اولیه و تبدیل به جوانه نوساقه صورت گرفت.

در این آزمایش ریزنمونه‌های مختلف تمایل ضعیفی به کالوس‌دهی نشان دادند ولی ریشه‌زایی در همه آن‌ها مشاهده گردید و باززایی از این نمونه‌ها به‌دست نیامد.

در این آزمایش ریزنمونه‌های ریشه تولید تعداد زیادی ریشه جانبی کردند. ریزنمونه‌های لپه و محور زیرلپه تمایل ضعیفی به کالوس‌دهی داشتند ولی بعد از چهار هفته رشد آن‌ها متوقف گردید و تیره و نارنجی رنگ شدند. ریزنمونه‌های برگ و دم‌برگ همگی کالوس تشکیل دادند. از این ریزنمونه‌ها پس از نه هفته کالوس‌های بزرگی تشکیل شد که درصد باززایی از کالوس‌های تولید شده در محیط کشت حاوی IAA و

محیط TN2: حاوی ۰/۷۵ میلی‌گرم در لیتر NAA و ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر TDZ.

کشت ریزنمونه‌ها در چهار محیط کشت زیر حاوی IAA با سه غلظت ۰/۰، ۷۵/۵ و ۱ میلی‌گرم در لیتر و ۶- بنزیل آمینو پورین (BAP) با دو غلظت ۱/۵ و ۲/۵ میلی‌گرم در لیتر.

محیط MS1: حاوی ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر IAA و ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر BAP.

محیط MS2: حاوی ۰/۷۵ میلی‌گرم در لیتر IAA و ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر BAP.

محیط MS3: حاوی ۱ میلی‌گرم در لیتر IAA و ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر BAP.

محیط MS4: حاوی ۱ میلی‌گرم در لیتر IAA و ۲/۵ میلی‌گرم در لیتر BAP.

کشت‌ها در شرایط ۲۵ درجه سانتیگراد و روشنایی ۱۶ ساعت با شدت نور سه هزار تا چهار هزار لوکس قرار گرفتند و هر پنج هفته یکبار روی محیط اولیه خود واکشت شدند. سرعت و کیفیت کالوس‌دهی و باززایی و درصد باززایی ریزنمونه‌ها از هفته پنجم به بعد ارزیابی شدند. درصد نهایی باززایی از ریزنمونه‌ها در هفته نهم ثبت گردید. گیاهان باززایی شده برای تولید ریشه به محیط MS فاقد هورمون منتقل شدند.

به منظور مشاهده میکروسکوپی روند تغییرات ایجاد شده در جداکشت برگ روی محیط کشت MS2 از زمان کشت، تولید کالوس تا باززایی گیاهچه آن، نمونه‌گیری از بافت‌های کشت شده آن در زمان‌های متفاوت (هفته اول تا نهم) انجام گرفت. نمونه‌ها در محلول تثبیت کننده FAA (شامل ۹۰ درصد الکل ۵۰ درجه، ۵ درصد اسید استیک گلاسیال و ۵ درصد فرمالین) به مدت ۲۴ ساعت و در دمای اتاق قرار داده شدند. پس از آبگیری با سری اتانل ۲۵ تا ۱۰۰ درجه، نمونه‌ها در گزیلول قرار گرفتند و سپس درون پارافین ذوب شده و در آن ۵۸ درجه تیمار شدند. قالب‌گیری با

سیتوکنین TDZ کالوس‌ها رشد بیشتری داشتند. ریزنمونه ریشه مثل آزمایشات قبل هیچ پاسخی به کالوس‌دهی نشان نداد و تنها چندین ریشه جانبی از آن‌ها به وجود آمد. ریزنمونه‌های لپه، محور زیرلپه و ریشه در هیچ یک از محیط‌های کشت باززایی نداشتند. نتایج باززایی از ریزنمونه‌های برگ و دم‌برگ در جدول ۱ ارائه گردیده است. با توجه به جدول بالاترین درصد باززایی به ترتیب از دم‌برگ (۴۰٪) روی محیط کشت TN1 و برگ (۳۵٪) روی محیط کشت T11 حاصل گردید.

Zeatin به ترتیب ۴۰٪ و ۲۰٪ گردید. گیاهچه‌های حاصل دارای رشد کندی بودند.  
در این آزمایش ریزنمونه‌های گیاهی در محیط‌های کشت واکنش‌های متفاوت کالوس‌دهی و باززایی نشان دادند.  
ریزنمونه‌های لپه، محور زیرلپه، دم‌برگ و برگ در همه چهار محیط کشت بطور ۱۰۰ درصد کالوس تشکیل دادند. البته میزان رشد کالوس‌ها در محیط‌های حاوی IAA نسبت به محیط‌های حاوی NAA بیشتر بود و کالوس‌های بزرگتری تشکیل شدند. با افزایش میزان

جدول ۱- درصد باززایی نوساقه از کالوس‌های برگ و دم‌برگ در محیط‌های کشت دارای TDZ، IAA و NAA

Table 1. Shoot regeneration percentage from calli of leaf and petiol on media containing TDZ, IAA and NAA

Medium	محیط کشت ریزنمونه	T11	T12	TN1	TN2
Leaf	برگ	35	10	6	6
Petiol	دم‌برگ	13	0	40	10

رشدی مناسبی را برای گیاهچه‌ها تأمین نکرد. در محیط کشت T11 فراوانی باززایی نسبتاً بالا بود و گیاهچه‌های حاصل نسبت به سایر محیط‌ها رشد سریع‌تری داشتند که

گیاهچه‌های باززا شده از ریزنمونه دم‌برگ در محیط کشت TN1 دارای رشد بطئی و خفیف بودند، و با وجود درصد نسبتاً مطلوب باززایی، این محیط شرایط

جدول ۲- اثر ریزنمونه و هورمون‌های IAA، NAA و TDZ روی باززایی

Table 2. Effect of explants and hormones NAA, IAA and TDZ on regeneration

S.O.V.	منابع تغییرات	درجه آزادی df	میانگین مربعات MS	مقدار احتمال Prob. value
Explant	ریزنمونه	1	0.0022 <sup>ns</sup>	0.4991
TDZ		1	0.0737**	0.0012
EXP x TDZ		1	0.011 <sup>ns</sup>	0.1484
Auxin	اکسین	1	0.0025 <sup>ns</sup>	0.4798
EXP x Auxin		1	0.0737**	0.0012
TDZ x Auxin		1	0.00 <sup>ns</sup>	0.9691
EXP x TDZ x Auxin		1	0.100**	0.0012
Error	خطا	16	0.0048	

R<sup>2</sup> = 0.71

C.V. = 8.59%

ns، \* و \*\*: به ترتیب غیر معنی‌دار، معنی‌دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد.

ns، \* and \*\*: Non significant, significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively.

متقابل آن‌ها معنی دار شدند اما سطح یک میلی‌گرم در لیتر TDZ موجب اصلی در معنی دار شدن این عامل و اثر متقابل آن با سایر عامل‌ها بود. با توجه به معنی دار شدن اثرات متقابل سه گانه و دو گانه اکسین در ریزنمونه، به منظور تعیین بهترین اثر متقابل سه گانه، آزمون مقایسات مستقل عامل اکسین در سطوح متفاوت ریزنمونه و TDZ انجام شد که تنها اثر آن برای ریزنمونه برگ با یک میلی‌گرم در لیتر TDZ در سطح ۵٪ معنی دار گردید. بدین ترتیب بر اساس آزمون دانکن، مناسب‌ترین اثر متقابل سه گانه شامل جداکشت برگ با یک میلی‌گرم در لیتر IAA و یک میلی‌گرم در لیتر TDZ تعیین گردید.

: در این آزمایش ریزنمونه‌های

گیاهی در محیط‌های کشت واکنش‌های متفاوت کالوس‌دهی و باززایی نشان دادند که درصد باززایی هر یک در جدول ۳ آمده است.

چندین نوساقه نیز به وجود آوردند. ریزنمونه نوک ساقه که به همراه بخشی از بافت‌های اطراف آن در محیط‌های فوق کشت گردید پس از دو هفته ۱۰۰ درصد باززا شدند که از هفته سوم به بعد هریک از ریزنمونه‌ها دارای چندین نوساقه شدند. لذا از آن برای زیرازدیادی سریع پایه‌های مورد نظر می‌توان استفاده کرد. تعداد نوساقه‌های حاصل و سرعت باززایی از این ریزنمونه در محیط کشت‌های حاوی NAA نسبت به IAA بیشتر بود. نتایج تجزیه واریانس داده‌های باززایی شده برای دو ریزنمونه برگ و دم‌برگ (جدول ۲) نشان داد که اثر سیتوکینین TDZ، اثر متقابل سه گانه آن با تیمارهای اکسین و ریزنمونه و هم‌چنین اثر متقابل ریزنمونه در اکسین معنی دار بود و سایر اثرات اختلاف معنی داری نشان ندادند. در این آزمایش اثر ساده نوع اکسین مصرفی (IAA یا NAA) تفاوتی نشان نداد در حالی که اثرات

جدول ۳- درصد باززایی ریزنمونه‌های مختلف در محیط‌های کشت دارای IAA و BAP

Table 3. Regeneration percentage of different explants on media containing IAA and BAP

Medium	محیط کشت	MS1	MS2	MS3	MS4
Explant	ریزنمونه				
Leaf	برگ	35	81	63	40
Petiol	دم‌برگ	0	5	7	0
Cotyledon	لپه	0	22	0	19
Hypocotyl	محور زیرلپه	25	10	16	20
Root	ریشه	0	0	0	0

قسمت بالای آن (نزدیک لپه) تشکیل گردید و بیشترین درصد باززایی (۲۵٪) در محیط کشت MS1 بود. نمونه‌های باززا شده در محیط MS4 با ۲۰٪ باززایی دارای چندین نوساقه از هر ریزنمونه بودند. ریزنمونه‌های برگ در همه محیط‌های کشت واکنش بالای (۱۰۰٪) به کالوس‌دهی نشان دادند. باززایی اغلب از کالوس‌های ایجاد شده در محل اتصال پهنک به دم‌برگ (تجمع رگبرگ‌ها) صورت گرفت (شکل‌های ۱ تا ۶). بیشترین درصد باززایی (۸۱٪) در محیط MS2 دیده شد که از هر ریزنمونه چندین شاخه باززا به وجود

قطعات ریشه در هیچ یک از محیط‌ها کالوس تشکیل نداد و تنها ریشه‌های جانبی در آن‌ها به وجود آمد. از بافت‌های دم‌برگ در عرض دو تا سه هفته در همه محیط‌ها کالوس‌های شادابی به وجود آمد ولی پس از هفته پنجم اکثر کالوس‌ها کدر شدند و بیشترین درصد باززایی (۷٪) در محیط MS3 بود. همه ریزنمونه‌های لپه در محیط‌های کشت کالوس تشکیل دادند. میزان تشکیل کالوس بستگی به سطح هورمون IAA داشت. بیشترین درصد باززایی (۲۲٪) از این ریزنمونه در محیط MS2 صورت گرفت. در کشت محور زیر لپه، کالوس‌ها از

آمد. محیط MS3 نیز با درصد باززایی ۶۳٪ در مرحله بعدی قرار گرفت که تعدادی از نمونه‌های باززایی شده آن نیز دارای چندین شاخه باززا بودند. آزمایش نشان داد که افزودن ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر GA<sub>3</sub> به محیط MS2 تأثیری در کالوس‌دهی ریزنمونه‌های برگ ندارد ولی افزایش میزان ساکارز از ۲ به ۳ درصد موجب کاهش تشکیل و رشد کالوس‌ها شد.

جدول ۴- اثر ریزنمونه، IAA و BAP در باززایی

Table 4. Effect of explant, IAA and BAP on regeneration


S. O. V.	منابع تغییرات	درجه آزادی df	میانگین مربعات MS	مقدار احتمال prob.value
Explant	ریزنمونه	3	0.56**	0.0001
IAA		2	0.0461*	0.0267
EXP x IAA		6	0.0369*	0.013
BAP		1	0.0004 <sup>ns</sup>	0.8531
EXP x BAP		3	0.0524**	0.0085
Error	خطا	32	0.0113	
$R^2 = 0.71$		C.V. = 8.59%		

ns, \* و \*\*: به ترتیب غیر معنی‌دار، معنی‌دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد.

ns, \* and \*\*: Non significant, significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively.

MS2 تعیین گردید. میزان باززایی ریزنمونه لپه در محیط کشت‌های MS2 و MS4 اختلاف معنی‌داری نداشتند، ولی باززایی بین این‌ها با دو محیط کشت دیگر اختلاف معنی‌دار نشان داد. در نهایت بر اساس گروه‌بندی دانکن و حداکثر باززایی ثبت شده مناسب‌ترین اثر متقابل این ریزنمونه مانند ریزنمونه برگ در محیط کشت MS2 بود. با توجه به معنی‌دار شدن اثرات اصلی عامل‌های ریزنمونه و IAA آزمون مقایسه میانگین دانکن (نمودار ۱) برای سطوح (غیر تصادفی) عامل‌های ریزنمونه و IAA انجام شد. نتایج نشان داد که بین میانگین باززایی ریزنمونه‌ها در کلیه تیمارها اختلاف معنی‌داری وجود دارد و ریزنمونه برگ بالاترین باززایی را در همه ترکیبات هورمونی داشت. بین دو سطح ۰/۵ و ۰/۷۵ میلی‌گرم در لیتر عامل IAA اختلاف معنی‌داری بود در حالی که بین این سطوح و سطح یک میلی‌گرم در لیتر اختلاف معنی‌داری دیده نشد.

نتایج تجزیه واریانس میزان باززایی از ریزنمونه‌های مختلف روی ترکیبات مختلف هورمونی (جدول ۴) نشان داد که بین ریزنمونه‌ها اختلاف بسیار معنی‌داری وجود دارد و اثرات متقابل این عامل با هورمون‌های IAA و BAP نیز معنی‌دار گردید. سطوح عامل BAP اختلافی نشان ندادند در حالی که سطوح عامل IAA در سطح ۵ درصد معنی‌دار گردید. با توجه به معنی‌دار شدن اثرات متقابل دوگانه، مقایسات مستقل، برای هر یک از ریزنمونه‌ها در چهار محیط کشت انجام گرفت و گروه‌بندی بر اساس آزمون دانکن در سطح ۵ درصد برای هر آزمایش به دست آمد. نتایج نشان داد که میزان باززایی ریزنمونه‌های دم‌برگ و محور زیرلپه در همه محیط‌های کشت اختلاف معنی‌داری نداشتند، هم‌چنین میزان باززایی ریزنمونه برگ در محیط‌های کشت MS2 و MS3 اختلاف معنی‌داری نداشتند، اما باززایی در MS2 با MS1 و MS4 اختلاف معنی‌دار داشت. در نتیجه مناسب‌ترین اثر متقابل ریزنمونه برگ در محیط کشت



نمودار ۱- مقایسه میانگین باززایی در سطوح ریزنمونه (الف) و IAA (ب) از طریق آزمون دانکن در سطح ۵ درصد

Fig. 1. Comparison of regeneration means for explant (a) and IAA levels (b) Duncan test (a = 5%)

درشت، نامتمایز با فاصله بین سلولی بالا بودند. در هفته سوم تا چهارم حجم کالوس ها گسترش یافته و هسته های اولیه سلول های فعال با اندازه های کوچک و فواصل بین سلولی کمتر مشاهده گردید (شکل ۷، الف) و در برخی از نواحی کالوس دستجات آوندی کاملاً تمایز یافته دیده شد. پایان هفته پنجم تا انتهای هفته ششم سلول های فعال در بخش های میانی کالوس به صورت دوایر متحدالمرکز گسترش یافته ولی سلول های حاشیه ای حالت نامتمایز را حفظ کرده بودند. نمونه های تهیه شده در هفته هفتم گسترش هسته های فعال سلولی را به سمت حاشیه کالوس و شکل گیری مراحل اولیه آغازی های شاخه را از آنها نشان داد (شکل ۷، ب) و در هفته هشتم تا نهم آغازی های کامل به صورت منفرد یا تجمعی شکل گرفتند که از آنها یک یا چندین نوساقه به وجود آمد (شکل ۷، پ). نتایج کارآمد این تحقیق امکان انجام انتقال ژن به گیاه فوق را میسر می سازد.

با توجه به اختلاف بسیار بالادر میزان باززایی ریزنمونه برگ از سایر ریزنمونه ها و تعیین سطح بهینه ۰/۷۵ میلیگرم در لیتر جهت هورمون IAA و غیرمعنی دار شدن سطوح BAP و ثبت بیشترین درصد باززایی در محیط MS2 نسبت به کلیه محیط کشت های مورد مطالعه در این تحقیق ریزنمونه برگ (که به راحتی و همیشه در دسترس می باشد) و محیط MS2 به ترتیب به عنوان مناسب ترین ریزنمونه و محیط کشت جهت باززایی گیاه با درصد بالا معرفی می گردد.

مشاهدات میکروسکوپی روند کالوس دهی و باززایی از ریزنمونه برگ بر روی محیط کشت مناسب آن یعنی MS2 را مشخص نمود. مقطع بافت برگ ( محل اتصال پهنک به دم برگ ) در زمان برش دارای سلول های پارانشیمی و دستجات آوندی در مرکز آن مشخص بود. کالوس های اولیه که در محل برش بافت برگ تشکیل گردیده بود (نمونه های هفته دوم) دارای سلول های



۲



۱



۴



۳



۶



۵

شکل ۱ تا ۶: القای کالوس از ریزنمونه برگ (۱)، باززایی از کالوس (۲)، رشد بیشتر نوساقه‌ها (۳)، ایجاد چندین نوساقه (۴)، تکثیر گیاهچه باززایی شده (۵) و انتقال آن به محیط ریشه‌زایی (۶).

Fig. 1-6: Callus induction from leaf explant (1), Regeneration from callus (2), More growth of the regenerated shoots (3), Proliferation (4), Propagation of a regenerated plant (5) and it's transferring to the root induction medium (6).



- Culafic, L., Samofalova, A., Nesieovic, M. 1987 b. In Vitro Organogenesis in two dioecious species, *Rumex acetosella* L. and *R. acetosa* L. (Polygonaceae). *Plant Cell, Tissue and Organ Culture* **11**: 125-131.
- Parker, J. S. and Clark, M. S. 1991. Dosage sex chromosom system in plants. *Plant Science*, **80**: 79-92.
- Shakib, A. M. 1999. MADS-box genes in sorrel (*Rumex acetosa* L.). Ph.D Thesis, University of London.

## High frequency plantlet regeneration in a dioecious plant as Sorrel

A. Izadi Darbandie<sup>1</sup> and A. M. Shakib<sup>2</sup>

### ABSTRACT

Sorrel [*Rumex acetosa* L. (Polygonacea)] is a dioecious perennial species which is being used as a model plant in sex determination molecular genetic studies. In this study for determination of the most suitable explant and medium for regeneration in this species, explants from different organs such as leaf, petiole, cotyledon, hypocotyle and root were cultured on Murashig and Skoog (MS) medium supplemented with vitamins, 2% sucrose, 0.8% agar and different compositions of hormones. Auxins; IAA, NAA and cytokenins; Zeatin, BAP, TDZ and Kinetin as well as IAA and BAP with Gibberlic Acid were added to culture media. Experiments were carried out as factorial in completely randomized design. Callus induction and regeneration from explants were evaluated. The most suitable explants and medium for regeneration were leaf and MS medium supplemented with 0.75 mg l<sup>-1</sup> IAA and 1.5 mg l<sup>-1</sup> BAP, respectively. The highest callus induction and regeneration was obtained from the leaf explants at the rate of 100% and 81%, respectively. Regenerates from the leaf explants on this medium had proliferated status. Histological studies confirmed that the origin of regeneration was from active and condensed cells that had developed from central parts of callus followed by marginal cells to form single or proliferated primordia. These results suggest new, simple, short and efficient regeneration method in this model species which can be used in genetic studies and gene transformation.

**Key words:** Sorrel (*Rumex acetosa* L), Explant, Callus induction, Regeneration, Media, Plantlet.

