


## Study of dry and wet planting effects on grain yield of genotypes spotted bean (*Phaseolus vulgaris*)

علی اکبر قنبری<sup>۱</sup>، افشین حسنی مهربان<sup>۲</sup>، منوچهر طاهری مازندرانی<sup>۳</sup> و حمید رضا درّی<sup>۴</sup>



Spotted bean در کشورمان جایگاه ویژه‌ای در بین جویبات دارد (مجتبون حسینی، ۱۳۷۳). سطح زیر کشت انواع لوبیا در استان مرکزی ۱۷۲۵۵ هکتار با متوسط عملکرد ۱۸۳۱ کیلو گرم در هکتار می‌باشد (بی‌نام، ۱۳۷۸). با توجه به کمیت و کیفیت این محصول، استان مرکزی یکی از مراکز عمده و مهم تولید جویبات به ویژه انواع لوبیا است. پژوهش‌های زیادی

از دیاد روزافزون جمعیت دنیا، کمبود مواد غذایی، محدودیت زمین‌های آبی، تولید مشکل و گران پروتئین حیوانی، بالابودن درصد پروتئین گیاهی و تولید آسان تر آن نسبت به پروتئین حیوانی، بالارفتن فرهنگ صحیح مصرف و تغذیه، استفاده بهینه از پروتئین گیاهی به همراه *Phaseolus vulgaris* L. و مخصوصاً لوبیا چیتی

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۱/۷/۲۷

تاریخ دریافت: ۱۳۸۰/۹/۲۱

<sup>۱</sup>- کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و رامین

<sup>۲</sup>- اعضاء هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی

<sup>۳</sup>- کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی

به صورت درازبندی انجام می‌گیرد. یعنی ابتدا کرت‌هایی به طول ۵۰-۱۰۰ متر (بسته به نوع خاک و شب زمین) ایجاد نموده و کشت توسط بذر کار لویا انجام می‌شود. البته در بیشتر مناطق زیر کشت لویا، به خاطر محدودیت اراضی و عدم وجود ماشین آلات مناسب، کشت توسط دست انجام می‌گیرد. در این مناطق، کشت به دو صورت هیرم کاری و خشکه کاری می‌باشد. از آن جا که گیاه لویا یکی از گیاهان حساس به شرایط نامساعد خاک (از جمله سله بندی) می‌باشد، انتخاب روش صحیح کاشت باعث کاهش تلفات و افزایش راندمان تولید خواهد گردید. هدف از انجام این تحقیق، بررسی و تعیین روش مناسب کشت جهت افزایش عملکرد در ارقام مختلف لویا چیتی بوده است.

مطالعات مزرعه‌ای در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ در ایستگاه ملی تحقیقات لوییای خمین انجام شد. شهرستان خمین با طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۵۷ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۳ درجه و ۳۹ دقیقه و ارتفاع ۱۸۱۵ متر از سطح دریا دارای آب و هوای معتدل کوهستانی و نزدیک به آب و هوای نیمه صحرایی است. میزان بارندگی سالیانه این شهرستان حدود ۳۰۰ میلیمتر است. آب و هوای معتدل این دشت وسیع و حاصلخیز باعث شده است که منطقه خمین به یکی از مناطق با استعداد کشت انواع لویا چیتی تبدیل گردد که همین امر در اقتصاد منطقه نقش بسزایی دارد.

بافت خاک محل آزمایش، رسی-لومی با pH برابر ۷/۵ الی ۸ بود. عملیات زراعی به طور یکنواخت برای کل آزمایش انجام شد و قبل از کاشت به میزان ۴۰ کیلوگرم در هکتار فسفر خالص و ۳۶ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع فسفات آمونیوم، در کرت‌ها پخش و مزرعه قبل از کاشت شخم زده شد. بذرهای آزمایشی قبل از کاشت با سم قارچکش بنومیل به میزان دو در هزار ضد عفونی گردید، و با توجه به نیاز مقدار ۴۶ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره، به صورت سرک در

روی لویا در کشورهای مختلف انجام شده و در حال انجام است. در CIAT (مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق گرمسیری) طرح‌های تحقیقاتی مختلفی بر روی لویا انجام می‌گیرد. این مرکز با داشتن ژرم پلاسم قوی تمام مراکز تحقیقاتی دنیا از جمله ایران را از نظر تأمین مواد ژنتیکی زیر پوشش دارد.

ارقام مختلف لویا دارای ویژگی‌های رشدی متفاوتی هستند و هر یک برای یک سیستم زراعی خاص مناسب می‌باشند (Van Schoonhoven and Voystest, 1991). بررسی‌ها نشان می‌دهند که ارقام رشد نا محدود پتانسیل عملکرد بیشتری نسبت به ارقام رشد محدود دارند. در مقابل، در بررسی که روی ارقام مختلف لویا چیتی انجام شد (بیضائی، ۱۳۷۸)، رقم C.O.S-16 (رشد محدود) نسبت به رقم شاهد تلاش (رشد ۵/۲ درصد افزایش عملکرد داشت. در تحقیق دیگری که روی ارقام مختلف لویا چیتی در پاکستان انجام شد، تیپ‌های مختلف لویا (تیپ I, II, III) از نظر عملکرد دارای اختلاف معنی دار بودند (Mehraj et al., 1996). طبق تعریف، تیپ I شامل ارقامی است که دارای رشد محدود بوده و فرم بوته در آن‌ها به صورت ایستاده است. ارقام متعلق به تیپ II دارای رشد نامحدود و فرم بوته ایستاده می‌باشند. تیپ‌های III و IV دارای رشد نامحدود هستند ولی فرم بوته در آن‌ها به ترتیب حالت رونده (prostrate) و بالارونده (climbing) (Van Schoonhoven and Voystest, 1986-1991). هم‌چنین، تحقیقات نشان داده اند ارقامی که دارای دوره رشد طولانی تری هستند، از عملکرد بیشتری نیز برخوردارند (Sreelatha et al., 1997). به عنوان نمونه، ظرفیت عملکرد گیاه لویا تا ۷۲ کیلوگرم در هکتار به ازای هر روز کاهش مدت رسیدگی تقلیل می‌یابد و افزایش تعداد روز تا رسیدگی باعث افزایش عملکرد می‌گردد (Singh, 1999).

روش‌های کشت گیاهان، از مهم ترین مباحث مدیریت مزرعه است. در گیاه لویا، عمدهاً کشت

مساحت برداشت ۱۲ متر مربع گردید. آبیاری بدین صورت انجام گرفت که کرتچه های مربوط به هیرم کاری آبیاری شد و وقتی زمین گاورو گردید مجموع کرتچه ها چه هیرم کاری و چه خشکه کاری هم زمان کشت گردیدند و کرتچه های مربوط به خشکه کاری بعد از کاشت هر پنج روز یکبار آبیاری گردید. کرتچه های مربوط به هیرم کاری ۱۵ روز بعد از کاشت و زمانی که لوبيا سبز شده و به مرحله دو برگی رسید آبیاری گردید و سپس به ترتیب دور آبیاری همانند خشکه کاری هر پنج روز یکبار انجام شد.

در طول رشد و نمو، علاوه بر مراقبت های زراعی مانند وجین علف های هرز، مبارزه شیمیایی با آفات و بیماری ها، از صفاتی نظیر تاریخ جوانه زدن، درصد سبز کردن، فرم بوته، ارتفاع بوته، تاریخ گلدهی، مقاومت به آفات و بیماری ها، زودرسی و دیررسی، مقاومت به ریزش، تاریخ رسیدن و سایر صفات مورد نظر

یادداشت برداری به عمل آمد.

پس از رسیدن کامل محصول، دانه هر کرت آزمایشی به طور جداگانه برداشت و توزین شد و در آزمایشگاه وزن صد دانه، شکل دانه و بازار پسندی آن ها مشخص گردید. نرم افزار MSTATC برای آزمون اثر رقم، روش کاشت و اثرات متقابل احتمالی آن ها به کار رفت. مقایسه میانگین ها از طریق آزمون چند دامنه دانکن (در سطح احتمال ۵٪ و ۱٪) انجام شد.

:

بین ارقام مختلف از نظر ارتفاع بوته اختلاف معنی دار وجود داشت (جدول ۱). بیشترین ارتفاع مربوط به رقم محلی خمین بود، و رقم C.O.S-16 کمترین ارتفاع را داشت (جدول ۲). این موضوع بدین خاطر است که رقم C.O.S-16 از نوع تیپ I یا ایستاده می باشد و لذا ارتفاع آن نیز کمتر است. بین روش های مختلف کشت اختلاف معنی دار مشاهده نشد. با این وجود، در

دو مرحله از رشد رویشی لوبيا داده شد.

در مورد مقدار مصرف کود شیمیایی، لازم به ذکر است که میزان متوسط کود توصیه شده (بر اساس آزمون خاک) برای مزارع لوبيا کاری اکثر مناطق، ۳۰ کیلو گرم در هکتار فسفر خالص و ۲۷ کیلو گرم در هکتار نیتروژن خالص از منيع فسفات آمونیوم، و ۲۳-۳۵ کیلو گرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره به صورت سرک می باشد. با این وجود، در مناطقی که خاک مزرعه از نظر مواد آلی و معدنی خیلی فقیر است، می توان با توجه به آزمون خاک مقدار بیشتری کود مصرف نمود. از طرفی، از آن جا که گیاه لوبيا از تثبیت کننده های نیتروژن می باشد، شاید افزودن این مقدار کود به خاک تعجب آور باشد. در حبوبات و از جمله لوبيا عوامل متعددی در تثبیت نیتروژن نقش دارند که مهم ترین آن ها رقم گیاه، سویه باکتری و برقراری همزیستی بین باکتری و گیاه می باشد. در گیاه لوبيا مشکل اساسی در تثبیت نیتروژن، عدم برقراری همزیستی یا ایجاد همزیستی بسیار ضعیف بین گیاه و باکتری های موجود در مزارع زیر کشت لوبيا می باشد (فاجریا و همکاران، ۱۳۷۸). بنابراین مقدار تثبیت نیتروژن در این گیاه بسیار ناقیز بوده و در نتیجه جهت رشد بهینه، باید کود کافی مصرف شود.

طرح آزمایشی مورد استفاده، طرح کرت های خرد شده نواری (Split block) در طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود. عامل A در چهار سطح و در کرت های عمودی شامل ارقام لوبيا چیتی تلاش، محلی خمین، G-14088 و C.O.S-16 و عامل B در دو سطح شامل روش های کاشت هیرم کاری و خشکه کاری و در کرت های افقی بررسی گردید. روش کاشت به صورت کرتی بود و هر کرت به گونه ای مشابه با نحوه کاشت دستگاه ردیفکار لوبيای مرسوم منطقه کشت گردید. فاصله ردیف های کشت ۲۰ سانتیمتر و فاصله روی ردیف ها ۱۴ سانتیمتر در نظر گرفته شد. اندازه هر کرتچه ۴×۵ متر (۲۰ متر مربع) شامل ۲۰ ردیف کاشت بود که پس از حذف اثر حاشیه،

گردید که رقم تلاش نسبت به ارقام محلی خمین و G-14088، دارای تعداد غلاف و تعداد دانه در بوته بیشتری بود. هر دو متغیر در روش کشت هیرم کاری برتری نشان دادند. در مورد این دو متغیر، اثرات ژنتیکی عامل عمدۀ اختلاف موجود بین ارقام است. از نظر وزن صد دانه، بین ارقام اختلاف معنی دار مشاهده شد. بیشترین وزن صد دانه از ارقام G-14088 و محلی خمین به دست آمد. در بررسی طاهری مازندرانی (۱۳۷۷) نیز ارقام G-14088 و محلی خمین از نظر وزن صد دانه در یک سطح قرار داشتند و رقم تلاش دارای کمترین وزن صد دانه بود. روش‌های کاشت از نظر وزن صد دانه، تفاوت معنی دار نداشتند. با این وجود در روش هیرم کاری وزن صد دانه بیشتر بود. به نظر می‌رسد که در روش خشکه‌کاری، برای مقابله با شرایط نامساعد خاک، گیاه اسیمیلات بیشتری را برای بافت‌های رویشی اختصاص می‌دهد (Van Schoonhoven and Voystest, 1991) و در نتیجه فتوستتری کمتری در اختیار غلاف قرار گرفته و در نتیجه از عملکرد، تعداد دانه و وزن صد دانه آن کاسته می‌شود.

:

بین ارقام مختلف از نظر عملکرد تفاوت معنی دار وجود داشت (جدول ۱). در مقایسه میانگین‌ها مشاهده شد که بیشترین عملکرد مربوط به رقم C.O.S-16 بود. به نظر می‌رسد که چون این رقم تعداد دانه بیشتری در هر بوته تولید نموده است، بنابراین از عملکرد بالاتری برخوردار می‌باشد. بیضائی (۱۳۷۸) نیز در آزمایش خود بر روی ارقام لوییا چیتی، نتیجه گرفت که عملکرد در رقم C.O.S-16 بیشتر بود. روش‌های مختلف کشت نیز دارای اختلاف معنی دار بودند، به طوری که بیشترین عملکرد از روش هیرم کاری به دست آمد. از آن جا که روش هیرم کاری سبب بهبود سایر صفات گیاه

روش هیرم کاری ارتفاع بوته بیشتر بود. گیاهانی که رشد اولیه خوبی دارند، از پوشش گیاهی بهتری برخوردار خواهند بود. یکی از عواملی که باعث گندی رشد در لوییا

می‌گردد، سله بندی خاک می‌باشد. مقاومت خاک در برابر رشد گیاه (به دلیل سله بستن) موجب کاهش رشد اولیه، و در نتیجه تضعیف پوشش گیاهی و کاهش ارتفاع می‌گردد. بین ارقام از نظر درصد سبز کردن اختلاف معنی داری وجود نداشت، ولی بین روش‌های کشت اختلاف معنی دار مشاهده شد (جدول ۱) و روش کاشت هیرم کاری از نظر این متغیر برتری داشت (جدول ۲). سبز شدن سریع و یکنواخت بذرها سبب می‌شود که در اول فصل، گیاه پوشش فضایی لازم برای جذب حداقل نور را ایجاد نماید و لذا باعث افزایش LAI و در نتیجه CGR و عملکرد می‌گردد. ارقام به طور غیر معنی داری دارای دوره رشد متفاوتی بودند، به گونه‌ای که رقم C.O.S-16 دارای رشد طولانی تری نسبت به ارقام دیگر بود. بررسی‌ها نشان می‌دهند که با طولانی تر شدن دوره رشد گیاه، عملکرد افزایش می‌یابد (Singh, 1999). تعداد روز تا رسیدن کامل در دو روش کاشت تفاوت معنی دار داشت و روش هیرم کاری سبب زودرسی گردید. در تعیین عملکرد گیاه، دو جزء سرعت پر شدن و مدت زمان پر شدن دانه نقش دارند (Egli, 1998).

به نظر می‌رسد که در روش هیرم کاری، به دلیل ایجاد شرایط مناسب برای رشد، سرعت پر شدن دانه افزایش می‌یابد و بنابراین موجب زودرسی گیاه می‌گردد.

:

در بررسی تعداد غلاف و تعداد دانه در بوته، مشاهده شد که بین ارقام، روش‌های کاشت و اثر متقابل آن‌ها اختلاف معنی دار وجود دارد (جدول ۱). از نظر تعداد غلاف در بوته، بیشترین مقدار مربوط به رقم تلاش و بیشترین تعداد دانه در بوته مربوط به رقم C.O.S-16 بود (جدول ۲). در بررسی که توسط طاهری مازندرانی (۱۳۷۷) بر روی ارقام لوییا چیتی انجام شد، مشاهده

### جدول ۱- تجزیه واریانس مرکب دو ساله آزمایش (۱۳۷۴-۷۵)

Table 1. Combined analysis of variance of the experiment (1995-96)

S.O.V.	df	MS							
		درصد سبز کردن Emergence%	ارتفاع بوته Plant height	تعداد غلاف در بوته Pods/plant	تعداد دانه در غلاف Seeds/pod	وزن صد دانه 100-seed weight	تعداد روز تا رسیدگی کامل Days to maturity	عملکرد دانه Grain yield	
Total	63	-	-	-	-	-	-	-	-
Year	1	300.500 *	343.347 ns	20.694 ns	2.009 ns	0.173 ns	288.000 **	486642.014 ns	
Rep.	6	138.166 *	6.417 ns	0.031 ns	0.195 ns	0.559 ns	0.375 ns	324276.083 *	
A <sup>a</sup>	3	88.500 ns	3813.833 **	66.431 **	1574.685 **	265.832 **	79.708 **	380044.583 *	
A×Y	3	76.792 *	6.097 ns	2.874 ns	0.817 ns	2.007 ns	7.042 *	28206.514 ns	
E (a)	18	25.389	1.139	0.020	0.257	0.364	0.292	61712.625	
B <sup>b</sup>	1	1540.125 *	8.000 ns	4.351 **	4.205 *	1.635 ns	220.500 **	1891484.500 *	
B×Y	1	12.463 ns	2.384 ns	1.140 ns	0.053 ns	1.967 ns	3.111 ns	576860.495 ns	
E (b)	6	62.125	0.917	0.031	0.195	0.445	0.083	1441602.000	
A×B	3	40.458 ns	1.500 ns	1.665 **	2.952 **	0.954 ns	8.583 **	110912.083 ns	
A×B×Y	3	3.421 ns	5.190 ns	2.946 ns	0.051 ns	1.546 ns	1.319 ns	146528.273 ns	
E (ab)	18	40.458	1.306	0.020	0.257	0.473	0.389	182753.444	

ns, \* and \*\*: Non significant and significant at the 5 and 1% levels of probability, respectively.

ns و \*\* به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال ۵٪ و ۱٪

a: Cultivar and b: Sowing method

ا: رقم و b: روش کاشت

## جدول ۲- متوسط اثرات ساده و متقابل رقم و روش کاشت بر روی صفات لوبیا چیتی طی سال های زراعی ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵

Table 2. Mean effects of cultivar, sowing method and interaction on spotted bean traits in 1995 and 1996

Treatment	تیمار	درصد سبز کردن Emergence%	ارتفاع بوته Plant height (cm)	تعداد غلاف در بوته Pods/plant	تعداد دانه در غلاف Seeds/pod	وزن صد دانه 100-SW (g)	تعداد روز تا رسیدگی کامل Days to maturity	عملکرد دانه Grain yield (kg/ha)
Cultivar (A): رقم (A)								
Talash (a1)	تلash (a1)	66.88 a	85.63 b	13.65 a	55.05 b	38.40 b	105.38 c	2396.25 b
Local Khomein (a2)	محلى خمين (a2)	60.38 b	95.13 a	7.80 d	31.20 d	47.00 a	105.25 c	2670.25 a
G-14088 (a3)	(a3)G-14088	62.38 ab	83.63 c	9.08 c	36.30 c	47.82 a	108.75 b	2664.62 a
COS-16 (a4)	(a4)COS-16	59.38 b	45.63 d	13.00 b	60.00 a	36.70 c	111.88 a	2809.00 a
Sowing method (B): روش کاشت (B)								
Wet planting (b1)	نم کاري (b1)	69.19	78.00	11.25	46.00	42.62	105.19	2827.84
Dry planting (b2)	خشکه کاري (b2)	55.31	77.00	10.51	45.28	42.30	110.44	2342.22
Interaction (A×B): اثر متقابل (A×B)								
a1×b1	تلash × نم کاري	77.00 a	85.75 b	14.00 a	56.00 b	38.25 b	101.25 f	2613.3 c
a2×b1	محلى خمين × نم کاري	66.50 ab	95.50 a	8.00 e	32.00 e	47.62 a	103.00 e	2862.9 ab
a3×b1	نem کاري × G-14088	67.25 ab	84.75 b	9.00 d	36.00 d	47.87 a	107.00 d	2746.2 bc
a4×b1	نم کاري × COS-16	66.00 ab	46.00 d	14.00 a	60.00 a	36.75 c	109.50 c	2952.2 a
a1×b2	تلash × خشکه کاري	56.75 ab	85.50 b	13.30 b	54.10 c	38.56 b	109.50 c	2572.9 d
a2×b2	محلى خمين × خشکه کاري	54.25 b	94.75 a	7.60 f	30.40 f	46.37 a	107.50 d	2855.1 ab
a3×b2	خشکه کاري × G-14088	57.50 b	82.50 c	9.15 d	36.60 d	47.75 a	110.50 b	2694.2 bc
a4×b2	COS-16 × خشکه کاري	52.75 b	45.25 d	12.00 c	60.00 a	36.62 c	114.25 a	2840.1 ab

در هر ستون میانگین هایی که دارای حرف مشترک می باشند، در سطح احتمال ۱٪ اختلاف معنی دار ندارند.

می شود، شرایط رشد مناسب تر بوده و در نتیجه عملکرد افزایش می یابد. به علاوه، در این روش می توان قبل از کاشت گیاه زراعی با علف های هرزی که در اثر آبیاری سبز شده اند مبارزه نمود. بنابراین در روش کرتی و آبیاری غرقابی لوبيا، بهتر است که از روش هیرم کاری استفاده شود.

همان طور که در بخش مقدمه ذکر شد، گیاه لوبيا در اکثر مناطق به صورت دراز بندی کشت می شود. بدین صورت که بسته به شرایط خاک (بافت خاک، شب زمین و ...)، ابتدا کرت هایی به طول ۵۰-۱۰۰ متر و عرض تقریبی ۲ متر ایجاد کرده و سپس با دستگاه لوبيا کار کشت انجام می شود. این روش (یعنی روش کرتی) دارای معایب متعددی است که عبارتند از: افزایش مصرف آب، آب ایستادگی پای طوقه گیاه، سله بستن سطح خاک، افزایش آفات و بیماری های گیاهی (به دلیل خواهدن بوته ها روی سطح خاک) و غیره. بنابراین برای رفع این مشکلات، باید روش های مناسب تری در کشت گیاهان اتخاذ گردد. به عنوان مثال، روش کشت پشته ای یکی از روش های بسیار مفید در کشت گیاه لوبيا می باشد. از فواید این روش می توان به گرم شدن سریع خاک، کاهش هزینه ها، کنترل فرسایش، کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد اشاره نمود (Griffit et al., 1990).

بنابراین، با توجه به موارد یاد شده پیشنهاد می شود که هر چه سریع تر روش کشت گیاه لوبيا در تمام مناطق لوبيا کاری کشور تغییر یافته و روش های نوین و مکانیزه جایگزین روش های سنتی، کم درآمد و پر هزینه گرددند.

بدیهی است که عمل به توصیه های ارائه شده در مقاله های تحقیقاتی مدت ها به طول می انجامد و تغییر روش سنتی کاشت لوبيا با توجه به محدودیت هایی که به ویژه از نظر تأمین ماشین های کشت و غیره وجود دارد راهی بس دشوار در پیش خواهد داشت ولی تا رسیدن به وضعیت آرمانی استفاده از روش هایی نظیر هیرم کاری و مزایایی که برای آن بر شمرده شد، می

می گردد، بنابراین با افزایش مقادیر صفات مؤثر در عملکرد (مخصوصاً اجزاء عملکرد)، موجب افزایش عملکرد می گردد.

در بررسی اثر متقابل رقم و روش کاشت، اختلاف معنی داری از نظر صفات ارتفاع گیاه، درصد سبز کردن، وزن صد دانه و عملکرد دانه وجود نداشت (جدول ۱). اما صفات تعداد غلاف و تعداد دانه در بوته به طور بسیار معنی داری تحت تأثیر اثر متقابل دو عامل قرار گرفتند. بیشترین تعداد غلاف و تعداد دانه در بوته از رقم C.O.S-16 در روش هیرم کاری به دست آمد. با وجود این که اثر متقابل بر روی عملکرد معنی دار نبود، اما در مقایسه میانگین ها رقم C.O.S-16 در روش هیرم کاری بیشترین عملکرد را نشان داد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که بین رقم و روش کاشت رابطه مثبت وجود داشته و روش هیرم کاری در کلیه ارقام مورد مطالعه از مزیت نسبی بالایی برخوردار است. در روش نم کاری سله بستن خاک کاهش می یابد، میزان مصرف آب کمتر می شود، شرایط رشد مناسب تر بوده و در نتیجه عملکرد افزایش می یابد. به علاوه، در این روش می توان قبل از کاشت گیاه زراعی با علف های هرزی که در اثر آبیاری سبز شده اند مبارزه نمود. بنابراین در روش کرتی و آبیاری غرقابی لوبيا، بهتر است که روش نم کاری استفاده شود.

در مجموع، هر چند رقم C.O.S-16 از نظر اندازه دانه نسبت به رقم محلی خمین ریزتر و از بازار پستدی متوسطی برخوردار است، اما این رقم به خاطر این که به صورت ایستاده بوده و مناسب برداشت با کمباین است، لذا امکان کاشت، داشت و برداشت این رقم به صورت مکانیزه وجود دارد و می توان هزینه های تولید به ویژه هزینه های برداشت را تا حد زیادی کاهش داد. به علاوه از خصوصیات بارز این رقم می توان به یکنواخت رسیدن غلاف ها، بالا بودن درصد پروتئین موجود و متحمل بودن این رقم نسبت به بیماری های ویروسی اشاره نمود. هم چنین، در روش هیرم کاری سله بستن خاک کاهش می یابد، میزان مصرف آب کمتر

تواند به عنوان پل گذراز روش های سنتی به روش های

صنعتی در نظر گرفته شود.

## References

- بیضائی، ا. ۱۳۷۸. گزارش نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد ارقام لوبيا سفید، قرمز و چیتی. مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی.
- بی نام. ۱۳۷۸. آمارنامه سازمان کشاورزی استان مرکزی.
- طاهری مازندرانی، م. ۱۳۷۷. گزارش نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد ارقام لوبيا چیتی در دو روش کشت رایج و استفاده از قیم. مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی.
- فاجریا، ان. کا.، وی. سی. بالیگار، و چارلز. جوتز. ۱۳۷۸. رشد و تغذیه گیاهان زراعی: ترجمه: قدرت الله فتحی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
- مجنون حسینی، ن. ۱۳۷۳. جبویات در ایران. انتشارات دانشگاه تهران.
- یزدی صمدی، ب.، ع. ا. رضایی، و م. ولی زاده. ۱۳۷۶. طرح های آزمایشی در پژوهش های کشاورزی. انتشارات دانشگاه تهران.

Egli, D.B. 1998. Seed biology and the yield of grain crops. CAB International, USA. 178 PP.

Griffith, D.R., S.D. Parsons, and J.V. Mannering. 1990. Mechanics and adaptability of ridge-planting for corn and soyabean. Soil and Tillage Res. **18**:113-126.

Hidalgo, R., L. Song, and P. Gepts. 1986. The cultivated species of phaseolus. CIAT, Cali, Colombia. 52 pp.

Mehraj, K.N., M.A. Brick, C.H. Pearson, and J.B. Ogg. 1996. Effects of bed width, planting arrangement, and plant population on seed yield of pinto bean cultivars with different growth habits. J. Prod. Agric. **9**:79-82.

Singh, S.P. 1999. Common bean improvement in the twenty-first century. Kluwer Academic Publishers. 430 pp.

Sreelatha, D., K.L. Rao, R. Veeraraghavaiah, and M. Padmaja. 1997. Physiological variations in French bean (*Phaseolus vulgaris* L.) cultivars as affected by sowing dates. Annals Agric. Res. **18**:111-114.

Van Schoonhoven, A., and O. Voystest. 1991. Common beans research for crop improvement. CIAT, Cali, Colombia.

## Study of dry and wet planting effects on grain yield of genotypes spotted bean (*Phaseolus vulgaris*) genotypes

A. A. Ghanbari<sup>1</sup>, A. Hassani Mehrban<sup>2</sup>, M. Taheri-Mazandarani<sup>3</sup> and H. R. Dorri<sup>4</sup>

### ABSTRACT

In order to study wet and dry planting effects on grain yield of spotted bean cultivars, an experiment was conducted on four bean cultivars in Khomein for two years (1995 and 1996). The experimental design was split block in randomized complete block design with four replications. Four spotted bean cultivars (Talash, Local Khomein, G-14088, COS-16) were assigned as factor A to vertical plots, and two sowing methods (wet planting, and dry planting) as factor B in horizontal plots. In this study planting arrangement was 20 cm × 14 cm. The results revealed that there were significant differences among bean cultivars in plant height, number of pods/plant and seeds/plant, 100-seed weight and grain yield. Local Khomein cultivar had the highest plant height. Number of pods/plant and yield in COS-16 were higher than the other cultivars. Study of sowing methods, indicated that plant height increased by wet planting, number of pods/plant and seeds/plant and yield was also higher in this method. Study of interaction between cultivar and sowing method showed that the highest pods/plant, seeds/plant and grain yield were associated to COS-16 in wet planting method.

**Keywords:** Spotted bean, Cultivar, Wet planting, Dry planting, Grain yield.

1, 2 and 4- Scientific members, Agric. Research Center, Arak, Iran.  
3- Expert of Agric. Research of Varamin.

[DOR: 20.1001.1.15625540.1381.4.1.6.7] [Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2025-08-25]