

اثر محیط و ژنتیک بر عملکرد و اندازه بذر سینگل کراس‌های چندرقند (*Beta vulgaris L.*)

Effect of environment and genetic on yield and seed size of single crosses of sugar beet (*Beta vulgaris L.*)

محمد رضا میرزایی^۱، جعفر اصغری^۲، داریوش فتح‌الله طالقانی^۳ و سعید صادق‌زاده حمایتی^۴

چکیده

میرزایی، م.ر., ج. اصغری، د. فتح‌الله طالقانی و س. صادق‌زاده حمایتی. ۱۳۹۵. اثر محیط و ژنتیک بر عملکرد و اندازه بذر سینگل کراس‌های چندرقند بررسی قرار گرفتند. سینگل کراس‌ها از تلاقی ۵ پایه مادری نرعمیم و یک پایه پدری تهیه شده بودند. به منظور بررسی ارتباط بین خصوصیات بذر با عوامل اقلیمی، از روش همبستگی کانونی استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب در مکان نشان داد که برخی از عوامل اقلیمی بر عملکرد و اندازه بذر چندرقند اثر معنی‌داری داشتند. در مناطق سرد اردبیل و فیروزکوه تویید بذر با درصد وزنی بالاتر و اندازه استاندارد (به ترتیب ۹۲۶ و ۷۰۵ کیلوگرم در هکتار؛ معادل ۴۵/۳ و ۴۸/۴ درصد از کل عملکرد) نسبت به اقلیم معتدل کرج (با ۷۲۶ کیلوگرم در هکتار؛ معادل ۳۸/۹ درصد از کل عملکرد)، برتری معنی‌داری داشت. تفاوت بین پتانسیل پایه‌های مادری از نظر تویید بذر با اندازه استاندارد نیز معنی‌دار بود. نتایج همبستگی کانونی نشان داد که ارتباط معنی‌دار و بالایی بین خصوصیات بذر و عوامل اقلیمی وجود داشت. از مجموع واریانس خصوصیات بیوفیزیکی بذر، ۴۸ درصد توسط متغیرهای کانونی اول و دوم عوامل اقلیمی، قابل پیش‌بینی بود. نتایج متغیر کانونی اول نشان دهنده کاهش عملکرد بذر با اندازه استاندارد و بالاتر از استاندارد، در مقایسه با افزایش عملکرد بذرهای ریز بود. با توجه به وجود ضرایب ساختمنانی بزرگ مثبت برای تعداد ساعت‌آفتابی و دمای کمینه و بیشینه هوا به‌نظر رسید که عملکرد بذر با اندازه استاندارد و بالاتر از استاندارد در شرایط اقلیمی کرج که در مقایسه با مناطق اردبیل و فیروزکوه، تعداد ساعت‌آفتابی بیشتر و کمینه و بیشینه دمای بالاتر و ارتفاع کمتری از سطح دریا دارد، کمتر است.

واژه‌های کلیدی: اندازه بذر، چندرقند، خصوصیات بیوفیزیکی بذر، عوامل اقلیمی و همبستگی کانونی.

این مقاله مستخرج از رساله دکتری نگارنده اول می‌باشد

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۳/۸

۱- دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران (مکاتبه کننده)

(پست الکترونیک: Mirzaie_1346@yahoo.com)

۲- استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

۳- دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

۴- استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

مقدمه

عادت رشد نامحدود در ساقه گل دهنده چغnderقند، بذرهای تشکیل شده معمولاً ترکیبی از درجات مختلف اندازه، میزان رسیدگی و سایر ویژگی‌های بذری می‌باشند. بنابراین برای بدست آوردن بذر با طرفیت جوانه‌زنی و بنیه بالا، طی فرآیند بوخاری حدود ۷۵-۹۰ درصد بذرهای غیر استاندارد حذف می‌شوند (Longden, 1986; Durrant and Load, 1990) دمای هوا ممکن است جرم بذر را کاهش دهد، زیرا گرما باعث افزایش سرعت پر شدن و کاهش طول دوره پر شدن بذر می‌شود، اما کاهش جرم بذر لزوماً با کاهش جوانه‌زنی یا بنیه بذر همراه نیست (Hampton *et al.*, 2013). نتایج یک آزمایش نشان داد که طول مدت شروع فعالیت اندام‌های زیشی تا گل دهی (رسیدگی غنچه‌های گل) در چغnderقند در حدود ۴۰ روز است، اما این زمان با کاهش دما در ماه‌های مرداد و شهریور (در انگلستان) به ۶۵ روز نیز افزایش می‌یابد. با طولانی شدن زمان رسیدگی، وزن هزار دانه بذر افزایش می‌یابد (Chegini, 1999). مناسب‌ترین دمای هوا برای تولید بذر چغnderقند در طول دوره گل دهی بین ۱۵-۲۰ درجه سلسیوس است و حداقل دمای هوا نباید از ۳۵ درجه سلسیوس بیشتر شود. افزایش دما طی دوره رشد بذر نیز می‌تواند باعث بادزدگی و کاهش رشد دانه منجر شود (Scott, 1970). اسکات و همکاران (Scott *et al.*, 1978) نشان دادند که رسیدگی بذر چغnderقند در طول روز ۱۶ ساعت با تغییر دمای شب و روز به ترتیب از ۱۲ و ۲۰ به ۵ و ۲۰ درجه سلسیوس، به صورت معنی‌داری به تعویق افتاده و در عین حال، عملکرد بذر به علت تولید بذرها درشت، افزایش یافت. در طول دوره رشد زیشی چغnderقند در شرایط محیطی سرد، بذرهای بزرگ‌تر و سنگین‌تری نسبت به شرایط گرم تولید می‌شود و اختلاف در وزن میوه، عمدتاً ناشی از افزایش مقدار پوسته بذر (Pericarp) می‌باشد. شرایط سرد به رشد پریکارپ کمک می‌کند، زیرا سلول‌های پریکارپ مقاوم سرمای

بذر مرغوب، بیشترین ارزش افزوده را در بین نهاده‌های کشاورزی دارا می‌باشد و بازدهی سایر نهاده‌های کشاورزی را نیز افزایش می‌دهد. عملکرد و اندازه بذر چغnderقند تحت تاثیر عوامل محیطی و ژنتیک قرار می‌گیرد.

عوامل مهم و موثر محیطی در تولید بذر چغnderقند، بخصوص در زمان گل دهی، رسیدگی و برداشت بذر شامل دما، رطوبت نسبی هوا و بارندگی هستند (Wood *et al.*, 1980; Longden, 1986) شرایط اقلیمی از جمله دما، میزان بارندگی و توزیع آن، رطوبت نسبی هوا و نظایر آن، اغلب به مقدار قابل ملاحظه‌ای بین سال‌ها و مناطق مختلف متغیر است. این تغییرات از عوامل اصلی تفاوت در عملکرد و کیفیت محصولات زراعی در سال‌ها و مناطق مختلف Platenkamp and Shaw, 1993; (Donohue and Schmitt, 1998; Galloway, 2001) محسوب می‌شوند (Bisayarی از گونه‌های گیاهی، عوامل محیطی موثر بر بوته‌های مادری (محیط رشد بذر روی گیاه مادر) ممکن است تنوع فنتوتی بذر را افزایش دهد (Cook and Scott, 1993). شرایط محیطی گیاه پایه پدری و مادری بطور مستقل بر خصوصیات بذر موثر هستند و محیط والدین بر درصد جوانه‌زنی نسبت به تعداد روزهای جوانه‌زنی (میانگین مدت زمان جوانه-زنی) اثر بیشتری دارد (Galloway, 2001).

اگر عوامل محیطی موثر در رشد و نیاز غذایی گیاه فراهم شود، در شرایط دمای شب و روز به ترتیب ۵ و ۱۲ درجه سلسیوس، گل دهی چغnderقند بطور پیوسته ادامه خواهد یافت. در حقیقت نیاز حرارتی لازم از زمان گردهافشانی تا رسیدگی بذر چغnderقند فقط حدود ۳۰۰ روز درجه است، اما به خاطر نامحدود بودن رشد رویشی چغnderقند و خاصیت تولید ساقه جانبی و گل دهی آن‌ها، این دوره معمولاً ۳۵ الی ۵۰ روز طول می‌کشد (Scott, 1970; Wood *et al.*, 1980).

در آناتومی بذر ممکن است شامل تغییر در پوسته، بافت بذر (آندوسپرم و جنین) و یا هر دو باشد، بنابراین تغییر در جرم بذر ممکن است بر اثر تغییر در اندازه بافت بذر یا ضخامت پوسته بذر باشد (Sultan, 1996; Lacey, 1996) گزارش شده است که در مرحله زایشی گیاهان والدینی، تغذیه بر اندازه پوسته و جرم بذر آنها موثر بوده و اندازه پوسته بذر اغلب با مدت زمان جوانه‌زنی و جرم بذر با خصوصیات جوانه‌زنی ارتباط داشت (Sultan, 1996; Baskin and Baskin, 1998). میزان تسهیم مواد پرورده به پوسته بذر ممکن است تحت تأثیر تغییرات مقدار و نوع تغذیه گیاهان والدینی قرار گیرد، اما تغییرات عملکرد بذر در پایه‌ها به تغییرات نور محیط واکنش نشان داد. اثر محیط بر والدین و واکنش بین ژنتیپ‌ها به عوامل محیطی متفاوت بود (Galloway, 2001).

تحلیل همبستگی کانونی یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیل چند متغیره بوده و هدف آن تعیین ارتباط خطی بین متغیرهای چند بعدی است. این روش با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از متغیرها به عنوان متغیرهای مستقل و مجموعه دیگر به عنوان متغیر وابسته می‌تواند بسیار مفید باشد (Borga, 1998; Nash and Chaloud, 2002) ساختمانی در تحلیل همبستگی کانونی، همبستگی بین متغیرهای اصلی و متغیر کانونی هستند، به عبارت دیگر یک ضریب ساختمانی همبستگی بین یک متغیر اصلی و نمره متغیر کانونی در یک تابع معین است (Farshadfar, 2010).

ارزیابی پایه‌های مادری از لحاظ خصوصیات یوفیزیکی بذر و اثر آن بر عملکرد استاندارد بذر سینگل کراس چندرقند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین هدف از این تحقیق بررسی اثر عوامل محیطی و ژنتیکی بر عملکرد و اندازه بذر چندرقند منوزرم و شناسایی ارتباط و تحلیل بین پارامترهای

محیط هستند، اما به جین و رشد بذر حقیقی آسیب می‌رساند و در نتیجه درصد بذرهای پوک Chegini, 1999; wood *et al.*, 1982; Bosemark, 1970; Heide *et al.*, 1976). رطوبت نسبی هوا در دوره گل‌دهی حدود ۶۰ درصد مناسب است (Wood *et al.*, 1980) و بالا بودن رطوبت نسبی، پراکنش دانه‌های گرده را کاهش می‌دهد (Scott, 1970). کمبود رطوبت نسبی همراه با دمای بالای هوا از طریق تأثیر منفی بر کمیت و کیفیت دانه گرده، بر عملکرد بذر اثر منفی خواهد داشت (Scott, 1970; Marlander *et al.*, 2011). بذرهایی که در شرایط طول روز کوتاه رشد و نمو یابند، سنگین تر بوده، بالاترین درصد جوانه‌زنی را داشته و نازک‌ترین پوسته بذر را دارند، در مقابل بذرهایی که در شرایط طول روز بلند رشد یابند کمترین درصد جوانه‌زنی، کمترین وزن بذر و بیشترین ضخامت پوسته بذر را داشته و با افزایش ارتفاع از سطح دریا، مقدار جوانه‌زنی بذر کاهش یافته، پوسته بذر ضخیم‌تر شده و به محتوای پلی‌فلهای آن افزوده می‌شود (Asghari *et al.*, 2009). خصوصیات بذر علاوه بر شرایط محیطی، توسط عوامل ژنتیکی والدین نیز تعیین می‌شود (Platenkamp and Shaw, 1993; Donohue and Schmitt, 1998; Galloway, 2001). گزارش شده است که ضخامت پوسته بذر در ژنتیپ‌های مختلف کامپانولا (گل استکانی) نسبت به تغییرات نور محیط، متفاوت بود. این تبعیض یک ویژگی برای اصلاح پایه‌های والدینی جهت سازگاری تدریجی به اثرات ناشی از محیط را فراهم می‌کند (Galloway, 2001). شناسایی عوامل بیوفیزیکی، بیوشیمیایی و ژنتیکی موثر بر قدرت بذر، جهت تحمل تنش‌های محیطی و همچنین شناخت کیفیت بذر، راهنمای مناسبی جهت استفاده از روش‌ها اصلاحی به منظور تولید بذرهای با کیفیت بالا محسوب می‌شوند (Rasmussen and Lin, 2008). تغییر

گذاری شدند) با یک پایه گرده افshan (O-Type 231) با کیفیت بذر مطلوب به دست آمده بودند، از لحاظ عملکرد و اندازه بذر چغnderقند در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار با یکدیگر مقایسه شدند. همه این لاین‌ها دیپلوبید بودند. قبل از کاشت از هر تکرار یک نمونه خاک مرکب تهیه و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تعیین (جدول ۱) و نیاز غذایی گیاهان تأمین گردید.

بیوفیزیکی بذر و پارامترهای اقلیمی با استفاده از روش همبستگی کانونی بوده است.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در سال ۱۳۹۳ در سه محیط کرج، فیروزکوه، اردبیل اجرا شد. ۱۰ سینگل کراس چغnderقند که از تلاقی ده لاین مادری نرعلیم سیتوپلاسمی (شامل ۷۱۱۲، ۲۶۱، ۴۵۲، ۴۷۴، ۴۳۶، ۴۱۹، ۴۲۸) و KWS و FC708، FC607 که به ترتیب از یک تا ۱۰ کد

جدول ۱- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش در عمق صفر تا ۳۰ سانتی‌متری خاک

Table1. Physical and chemical properties of the soil at experimental site 0-30 cm soil depth

Location	Mحل	Soil texture	بافت خاک	سدیم Na ⁺ (mg.kg ⁻¹)	پتاسیم K ⁺ (mg.kg ⁻¹)	فسفر P(mg.kg ⁻¹)	کربن آئی O.C (%)	اسیدیت pH	هدایت الکتریکی EC (dS.m ⁻¹)
Karaj	کرج	L	371.2	101	9.6	0.59	7.3	1.61	
Ardabil	اردبیل	LS	-	410	14.0	0.85	7.7	0.43	
Firouzkooh	فیروزکوه	CS	24.8	544	31.2	6.09	7.4	1.28	

منظور شد. فاصله خطوط کشت ۵۰ و فاصله ریشه‌چهه‌ها روی خطوط کشت حدود ۵۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شد. در سال دوم بوته‌ها به ساقه رفته، گل داده و بذر تولید شد. روش آبیاری به صورت شیاری نشتی و بر اساس نیاز آبی بر اساس تبخیر و تحرق در سه محل اجراشد. برداشت بذر از اواخر تیر تا اوایل مرداد در کرج و هفته اول شهریور در فیروزکوه و اردبیل در ساعت‌های اولیه طلوع خورشید انجام شد. پس از خشکاندن یکنواخت بوته‌ها و خرمنکوبی و استحصال بذر ناخالص، با استفاده از دستگاه درجه‌بندی (Towel or Bound grader) که یک دستگاه بوجاری کوچک است، خاک، گلچه، بذرهای ریز، بقایای برگ، ساقه و شاخه از توده ناخالص بذر جدا شد. پس از بوجاری، بذرهای حاصل با استفاده از غربال‌های گرد و دراز به طبقات بذری شامل بیشتر از ۳/۲ میلی‌متر دراز (‡)، کمتر از دو میلی‌متر دراز، کمتر از ۳/۵ میلی‌متر گرد (Ø)، بیشتر از ۵ میلی‌متر گرد و اندازه استاندارد، تقسیم، توزیں و سهم بندی (پنج طبقه اندازه بذری) شدند

جهت تولید بذر چغnderقند، ریشه‌های کوچک با حداقل قطر ۵ سانتی‌متر با وزن تقریبی ۱۰۰-۱۲۰ گرم که اشتکلینگ نامیده می‌شود، تولید شد. به منظور تولید اشتکلینگ مورد نیاز، در اواخر مرداد سال ۱۳۹۲ بذر لاین پایه پدری و ده لاین پایه مادری پس از بوجاری در سطح ۳۰۰۰ مترمربع کشت شدند. اشتکلینگ‌ها در اواخر آبان و اوایل آذر ماه برداشت و در سیلوی خاکی در ایستگاه فیروزکوه در دمای ۴-۷ درجه سلسیوس (CIFA, 2002) به منظور بهاره‌سازی (Marlander *et al.*, 2011) نگهداری شدند. از دهه سوم اسفند سال ۱۳۹۲ ریشه‌چهه‌ها از سیلو خارج و ریشه‌چهه‌ای سالم و هم اندازه با وزن تقریبی ۱۰۰-۱۲۰ گرم تا اواخر فروردین ۱۳۹۳ در چهار تکرار در مزرعه در هر محل کشت شدند. هر کرت آزمایشی شامل چهار خط نرعلیم در وسط کرت و دو خط گرده‌افshan در دو طرف به طول ۱۲ متر بود. جهت همسان بودن شرایط، در دو طرف هریک از بلوک‌ها یک خط گرده‌افshan کشت شد. بین بلوک‌ها ۱/۵ متر فاصله

دارد (Durrant and Load, 1990). در این تحقیق ترکیبی از درجات مختلف اندازه بذر تولید شد که با نتایج سایر پژوهشگران مطابقت دارد (Cook and Scott, 1993; Longden, 1986) . اثر متقابل محیط و ژنتیک برای درصد وزنی عملکرد بذر اندازه کمتر از دو میلی متر غربال دراز و کمتر از ۳/۵ میلی متر غربال گرد، نسبت به عملکرد کل بذر معنی دار بود. اثر محیط و ژنتیک به طور مستقل از لحاظ درصد وزنی عملکرد بذر استاندارد و عملکرد بذر اندازه غربال بیشتر از ۳/۲ میلی متر دراز یا اندازه درشت، نسبت به عملکرد کل بذر معنی دار بود.

بیشترین درصد وزنی عملکرد بذر زیر استاندارد (زیر اندازه غربال دو میلی متر دراز و ۳/۵ میلی متر گرد) مربوط به کرج بوده که تفاوت آن با دو محل دیگر معنی دار بود. دو محل اردبیل و فیروزکوه در تولید بذر با اندازه درشت (بالای اندازه غربال ۳/۲ میلی متر دراز و ۵ میلی متر گرد)، نسبت به کرج افزایش معنی داری داشتند (جدول ۲)، بنابراین به نظر می رسد که شرایط محیطی اثر معنی داری بر اندازه بذر چغدرقه و درصد وزنی عملکرد استاندارد دارد. این موضوع با نتایج سایر پژوهشگران نیز مطابقت دارد (Platenkamp and Shaw, 1993; Donohue and Platenkamp and Shaw, 1993; Schmitt, 1998; Galloway, 2001).

رسیدگی بذر در اردبیل و به دنبال آن فیروزکوه به علت پایین بودن دما نسبت به کرج به شکل معنی داری (شکل ۱) تأخیر داشت و در عین حال عملکرد بذر به علت تولید بذرها درشت، افزایش یافت.

این موضوع با نتایج سایر محققان نیز مطابقت دارد (Scott et al., 1978; Chegini, 1999). دمای بالا هوا در کرج نسبت به اردبیل و فیروزکوه، باعث افزایش سرعت پر شدن و کاهش طول دوره پر شدن و کاهش اندازه بذر شد. این یافته با نتایج پژوهشگران مبنی بر اثر دمای بالا بر زمان رسیدگی و اندازه بذر، مطابقت داشت (Hampton et al., 2011; Marlander et al., 2011;

(Chegini, 2011). بذرها بیشتر از ۵ میلی متر گرد و بیشتر از ۳/۲ میلی متر دراز، به عنوان بذرها درشت بالای استاندارد (over size) و بذرها کمتر از ۳/۵ میلی متر گرد و زیر غربال دو میلی متر دراز، به عنوان بذرها زیر استاندارد در نظر گرفته شدند.

به منظور تعیین ارتباط بین خصوصیات بیوفیزیکی بذر (متغیر وابسته) و اثر اقلیم تولید بذر (متغیر مستقل) روی پایه های مادری از روش تحلیل همبستگی کانونی استفاده شد. خصوصیات مورد مطالعه شامل پنج خصوصیات بیوفیزیکی بذر (پنج طبقه اندازه بذری) و شش عامل اقلیمی بودند که از ایستگاه های سینوپتیک کرج، فیروزکوه و اردبیل برداشت شدند. در این تحقیق خصوصیات بیوفیزیکی بذر به عنوان متغیر وابسته و عوامل اقلیمی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند. روش همبستگی کانونی سیستم مختصاتی را می یابد که در آن میزان همبستگی دارای مقدار بهینه است (Borga, 1998). روش تحلیل همبستگی کانونی یا متعارف، ارتباط میان دو مجموعه از عوامل را با یافتن تعداد محدودی ترکیب خطی از متغیرهای مجموعه اول که دارای بیشترین همبستگی با ترکیب خطی از متغیرهای مجموعه دوم هستند، بیان می کند. تجزیه واریانس مرکب داده ها براساس مدل تصادفی بودن سینگل کراس ها و با فرض ثابت بودن محیط با استفاده از نرم افزار SAS و مقایسه میانگین ها به روش توکیه انجام شد. جهت بررسی همبستگی کانونی از نرم افزار SPSS استفاده شد.

نتایج و بحث

نتایج نشان داد که اثر متقابل محیط و ژنتیک بر عملکرد کل بذر، عملکرد بذر استاندارد و عملکرد اندازه های بیشتر و کمتر از استاندارد به جز اندازه غربال بالای ۳/۲ میلی متر دراز معنی دار بود. نتایج تحقیقات مشابه نیز نشان داده است که میزان عملکرد بذر چغدرقه تحت تاثیر اقلیم و ژنتیک قرار

افزایش می‌یابد. چنانکه در این تحقیق میانگین قوه نامیه مکانیکی بذرها تولید شده در کرج، فیروزکوه واردیل به ترتیب ۴۰، ۹۰ و ۷۰ درصد بود که ممکن است یکی از علل اصلی افزایش درصد پوکی، سردی هوای فیروزکوه واردیل باشد. این موضوع را پژوهشگران دیگر نیز گزارش کرده‌اند (Chegini, 1999; wood *et al.*, 1982; Bosemark, 1970; Heide *et al.*, 1976).

(Scott, 1970; Wood *et al.*, 1980)

سرماهی هوا در طول دوره زایشی در اردیل و فیروزکوه باعث بزرگ‌تر شدن اندازه بذر نسبت به شرایط معتدل کرج شد (جدول ۲ و شکل ۱). شرایط سردتر به رشد پریکارپ کمک می‌کند، زیرا سلول‌های پریکارپ مقاوم به دمای سرد محیط می‌باشد، اما به جنین و رشد بذر حقیقی آسیب می‌رساند و در نتیجه درصد بذرها پوک بطور چشمگیری


جدول ۲- مقایسه میانگین درصد نسبی اندازه‌های بذر سینگل کراس‌های چندرقد در کرج، اردیل و فیروزکوه

Table 2. Mean comparison of weight percent of seed sizes of sugar beet single crosses in Karaj, Ardabil and Firouzkoooh

Mحل	درصد وزنی عملکرد بذر زیر ۲ میلی متر	درصد وزنی عملکرد بذر بالای ۲/۲ میلی متر	درصد وزنی عملکرد بذر استاندارد	درصد وزنی بذر ۲ میلی متر دراز
Place	Seed yield 3.5mmØ	Seed yield 3.2mmØ	Standard seed Yield	Seed yield 2mmØ
Ardabil	اردیل	0.09b	0.28a	0.45a
Firouzkoooh	فیروزکوه	0.07c	0.23b	0.48a
Karaj	کرج	0.21a	0.06c	0.39b

میانگین‌های دارای حروف مشترک در هرستون بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال ۵ درصد اختلاف معنی داری ندارند.

Mean each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Tukey Test



شکل ۱- مقایسه میانگین، حداقل، حداقل و میانگین دمای هوا (A) و رطوبت نسبی هوا (B) از شروع گلدهی و پر شدن بذر در کرج، اردیل و فیروزکوه

Fig. 1. Mean comparison of minimum, maximum and average of air temperature (A) and relative humidity (B)

from the beginning of flowering and grain filling stages in Karaj, Ardabil and Firouzkoooh

گرده‌افشانی بوته‌ها نداشت، بلکه برتری قابل ملاحظه‌ای از نظر میانگین قوه نامیه مکانیکی نسبت به دو منطقه دیگر نشان داد. این یافته با گزارش فرزانه

بالا بودن دمای میانگین، کمینه، بیشنه و رطوبت نسبی پایین در کرج نسبت به دو محل دیگر در طول زمان گلدهی و پر شدن بذر (شکل ۱)، اثر منفی بر

به عملکرد کل بذر نشان داد که بیشترین درصد وزنی عملکرد استاندارد به سینگل کراس * MS 261 و کمترین مقدار آن به سینگل کراس های MS 231 و OT 231 و MS FC 607 * OT 231 FC 708 * OT 231 با ترتیب ۴۹ و ۳۹ درصد تعلق داشت. سینگل کراس های MS FC 607* OT 231, MS FC 708* OT 231 به ترتیب بیشتر و کمتر از استاندارد به عملکرد کل را تولید کردند (جدول ۳)، بر این اساس می توان پایه های مادری که واکنش مناسبی از نظر سازگاری به سه محل را داشتند، برای تولید بذر هیرید انتخاب نمود (Galloway, 2001; Rasmussen and Lin, 2008).

مجموعه خصوصیات اندازه بذر (پنج طبقه اندازه بذر)، به دلیل تعداد متغیرهای کمتر، تعیین کننده تعداد دسته های کانونی ایجاد شده می باشد. ضریب همبستگی کانونی برای دسته متغیرهای کانونی ۱ و ۲ به ترتیب ۰/۹۵۲۳ و ۰/۵۷۱۸ بود که مقادیر نسبتاً بالایی را به خود اختصاص داده و با توجه به کم بودن مقدار ضریب همبستگی کانونی دسته های بعدی (ضرایب همبستگی تا دسته پنجم تقریباً صفر بود)، برای نتیجه گیری نهایی از آنها استفاده نشد (جدول ۴). آماره آزمون تجزیه واریانس چند متغیره ویلکس لامبدا تنها دسته متغیرهای کانونی ۱ و ۲ معتبر هستند (فرض بی ارتباط بودن متغیرهای خصوصیات اندازه بذر و عوامل اقلیمی در این دسته متغیر کانونی پذیرفته نمی شود) و نشان دهنده همبستگی بالا میان عوامل برای متغیرهای اول و دوم است (جدول ۴). بنابراین نتیجه گرفته می شود که اندازه بذر چند قند تحت تاثیر عوامل اقلیمی قرار دارد.

ضرایب ساختمانی، همبستگی بین درصد وزنی عملکرد بذر ریز (زیر اندازه غربال دو میلی متر دراز و ۳/۵ میلی متر گرد) با ضریب متغیر کانونی اول (ضریب ساختمانی)، ۰/۸۲ و ۰/۸۴ بود. همبستگی بین درصد وزنی عملکرد بذر بالای استاندارد و استاندارد با اولین متغیر کانونی (ضریب ساختمانی) به ترتیب

(Farzaneh, 2015) که علت پایین بودن قوه نامیه مکانیکی (۳۰ درصد) در کرج را مصادف شدن زمان گرده افشاری و رسیدگی دانه با شرایط نامساعد محیطی به ویژه دمای بالا مرتبط دانست، مغایرت دارد. یکی دیگر از عوامل اقلیمی، بالا بودن ارتفاع از سطح دریا و شرایط روز کوتاهی در مناطق اردبیل و فیروزکوه نسبت به منطقه کرج بود که باعث تغییر در آناتومی بذر و رشد بیشتر پوسته آن شد. این موضوع با یافته های پژوهشگران دیگر مطابقت دارد (Sultan, 1996; Lacey, 1996)، البته اثر تغذیه گیاه مادری در مرحله زایشی بر اندازه پوسته و جرم بذر نیز توسط محققان گزارش شده است (Galloway, 2001; Sultan, 1996; Baskin and Baskin, 1998).

نسبت وزنی عملکرد استاندارد بذر به عملکرد کل بذر در فیروزکوه و اردبیل نسبت به کرج افزایش معنی داری داشت (جدول ۲). با توجه به اینکه می توان درصدی از بذرهای بیشتر از اندازه استاندارد را با فرآیند پولیش، به اندازه استاندارد درآورد، بنابراین درصد وزنی عملکرد بذر استاندارد در اردبیل و فیروزکوه نسبت به کرج برتری قابل ملاحظه ای داشت، لیکن به علت قوه نامیه مکانیکی پایین در فرآیند پوک گیری، درصد زیادی از بذرهای تولید شده اندازه استاندارد فیروزکوه و اردبیل نسبت به کرج، حذف می شوند. این موضوع توسط سایر محققان نیز گزارش شده است (Longden, 1986; Durrant and Load, 1990).

نایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت بین سینگل کراس ها برای درصد وزنی عملکرد اندازه استاندارد و بیشتر از استاندارد معنی دار بود، به عبارت دیگر علاوه بر محیط، ژنتیک نیز بر اندازه بذر چند رقد تاثیر دارد که این موضوع با نایج سایر پژوهشگران مبنی بر اثر توأم محیط و ژنتیک، همخوانی دارد (Platenkamp and Shaw, 1993; Donohue and Schmitt, 1998; Galloway, 2001). مقایسه میانگین های نسبت وزنی عملکرد بذر استاندارد

جدول ۳- مقایسه میانگین درصد وزنی اندازه‌های بذر سینگل کراس‌های چغدرقند در کرج، اردبیل و فیروزکوه

Table 3. Mean comparison of weight percent of seed sizes of sugar beet singles crosses in Karaj, Ardabil and Firouzkooh

شماره سینگل کراس Single cross number	سینگل کراس Single cross	درصد وزنی عملکرد بذر بالای ۳/۲ میلی مترگرد Seed yield 3.5mmØ	درصد وزنی عملکرد بذر ایستادنار Seed yield 3.2mmØ	درصد وزنی عملکرد بذر ایستادنار Standard seed Yield	درصد وزنی عملکرد بذر زیر ۲ میلی متر دراز Seed yield 2mmØ
1	SC(231*261)	0.11bcd	0.15bc	0.49a	0.23bc
2	SC(231*7112)	0.14abc	0.20ab	0.43bcd	0.21cd
3	SC(231*419)	0.11bcd	0.16bc	0.48ab	0.23bc
4	SC(231*436)	0.10d	0.20ab	0.46ab	0.23bc
5	SC(231*474)	0.10cd	0.14c	0.45abc	0.29a
6	SC(231*452)	0.09d	0.17bc	0.46abc	0.26ab
7	SC(231*428)	0.10d	0.15bc	0.47ab	0.28ab
8	SC(231*FC607)	0.14ab	0.25a	0.39d	0.20cd
9	SC(231*FC708)	0.16a	0.23a	0.39d	0.21cd
10	SC(231*KWS)	0.17a	0.25a	0.40cd	0.18d

در هر ستون میانگین‌هایی که دارای حروف مشترک هستند، بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی داری ندارند

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Tukey Test

جدول ۴- آزمون همبستگی کانونی بین عوامل اقلیمی و میانگین درصد وزنی اندازه‌های بذر سینگل کراس‌های چغدرقند در کرج، اردبیل و فیروزکوه

Table 4. Canonical correlation analysis between environmental parameters and mean weight percent of seed sizes of sugar beet singles crosses in Karaj, Ardabil and Firouzkooh

تابع کانونی Canonical function	شاخص پیش‌بینی واریانس استاندارد خصوصیات پذیری با متغیر کانونی عوامل اقلیمی کانونی خصوصیات بذری	شاخص پیش‌بینی واریانس استاندارد خصوصیات پذیری با متغیر کانونی عوامل اقلیمی	ضریب تبیین کانونی Squared canonical correlation	همبستگی کانونی canonical correlation	مقدار ویژه Eigenvalue
	Canonical redundancy standardized variance Of environmental parameters with canonical variable of seed parameters	Canonical redundancy standardized variance of seed parameters with canonical variable of environmental parameters	آزمون ولکس لامدا Wilks Lambda		
1	0.4858	0.4334	67.63**	0.91	0.9523
2	0.1518	0.0475	13.84**	0.33	0.5718

جدول ۵- ضرایب ساختمانی همبستگی بین عوامل اقلیمی و میانگین درصد وزنی اندازه‌های بذر چغدرقند با متغیرهای کانونی

Table 5. Construction coefficients of correlation between environmental parameters and mean weight percent of seed sizes with canonical variables

Environmental parameters	عوامل اقلیمی	W2	W1	Biophysical seed parameters	خصوصیات بیوفیزیکی بذر	V2	V1
Height above sea level	ارتفاع از سطح دریا	0.7934	-0.6087	Total seed Yield	عملکرد کل بذر	-0.5813	0.1030
Minimum temperture	کمینه دما	0.3069	0.9517	Seed yield 2mmØ	درصد وزنی عملکرد بذر زیر ۲ میلی متر دراز	0.3494	0.8220
Maximum temperture	بیشینه دما	0.6725	0.7401	Standard seed Yield	درصد وزنی عملکرد بذر ایستادنار	0.2418	-0.5522
Average temperture	میانگین دما	0.8695	0.4939	Seed yield 3.2mmØ	درصد وزنی عملکرد بذر بالای ۳/۲ میلی متر دراز	-0.4422	-0.8337
Sunny hours	ساعات آفتابی	-0.0026	1.0000	Seed yield 3.5mmØ	درصد وزنی عملکرد بذر زیر ۳/۵ میلی مترگرد	-0.1112	0.8387
Humidity	میانگین رطوبت	-0.9238	-0.3828				

بنابراین بارهای این متغیر کانونی دو قطبی بودند (جدول ۶). شاخص پیش‌بینی واریانس استاندارد برای خصوصیات بیوفیزیکی بذر با استفاده از متغیر کانونی اول و دوم بر اساس ترکیب خطی عوامل اقلیمی (W1 و W2 متغیر کانونی اول و دوم عوامل اقلیمی)، به ترتیب $0/4334$ و $0/0475$ بدست آمد (جدول‌های ۴ و ۶). این موضوع بدین معنا است که ۴۳ درصد و حدود ۵ درصد از واریانس کل خصوصیات بیوفیزیکی بذر توسط اولین و دومین متغیر کانونی (ترکیب خطی) عوامل اقلیمی قابل پیش‌بینی است و مجموع شاخص پیش‌بینی واریانس استاندارد خصوصیات اندازه بذر چندرقند با متغیر اول و دوم کانونی عوامل اقلیمی ۴۸ درصد می‌باشد.

مقدار مربع همبستگی چندگانه بین متغیرهای اندازه بذر که در واقع همان ضرایب تبیین (^۲) است، به ترتیب $0/01$ ، $0/61$ ، $0/28$ ، $0/63$ ، $0/064$ و $0/64$ بود که توسط متغیرهای کانونی اول پارامترهای اقلیمی توجیه می‌شود (جدول ۷). کمترین مقدار ضریب تبیین بین متغیرهای اندازه بذر با متغیرهای کانونی پارامترهای اقلیمی (^۲) عملکرد کل و درصد وزنی عملکرد بذر استاندارد به ترتیب $0/01$ و $0/28$ بود (جدول ۷). پیش‌تر سایر پژوهشگران تنها عوامل مهم و تعیین کننده محیطی موردنیاز در تولید بذر چندرقند را دما و رطوبت نسبی هوا در طول دوره گل‌دهی و رسیدگی (Wood *et al.*, 1980; Longden, 1986) گزارش کردند. لیکن نتایج این تحقیق، وزن یا بار عاملی دمای میانگین، کمینه، بیشینه، ساعات آفتابی و رطوبت نسبی هوا بر عملکرد و اندازه بذر چندرقند را تعیین نمودند. عوامل اقلیمی موثر در تولید بذر چندرقند به ترتیب اهمیت شامل، تغیرات ساعت آفتابی، کمینه دما، بیشینه دما ارتفاع از سطح دریا و میانگین دما بود. رطوبت نسبی هوا در مقایسه با تغیرات دمایی بر عملکرد و اندازه بذر چندرقند، نقش و اهمیت کمتری داشت.

۰/۰۵۵ و ۰/۰۵۵ بود. تابع متغیر کانونی اول نشان دهنده کاهش درصد وزنی عملکرد بذر با اندازه استاندارد و بالای استاندارد در مقایسه با افزایش درصد وزنی عملکرد بذر با اندازه ریز می‌باشد. وجود ضرایب بزرگ مثبت برای ساعات آفتابی، کمینه و بیشینه دما نشان می‌دهد که عملکرد بذر استاندارد و بالای استاندارد در شرایط اقلیمی کرج با ساعات آفتابی زیاد، افزایش کمینه و بیشینه دما و کاهش ارتفاع از سطح دریا نسبت دو محل دیگر، کاهش می‌باید (جدول ۵). به عنوان یک قاعده کلی آن دسته از ضرایب ساختمانی که بزرگتر یا مساوی $0/30$ هستند معنی دار در نظر گرفته می‌شوند (Farshadfar, 2010). با استفاده از این معیار نتیجه گرفته می‌شود که عملکرد بذر ریز (زیر اندازه غربال دو میلی‌متر دراز و $3/5$ میلی‌متر گرد)، دارای بارهای معنی دار و مثبت بوده و درصد وزنی عملکرد بذر بیشتر از استاندارد و استاندارد دارای بارهای معنی دار و منفی روی متغیر کانونی اول بودند (جدول ۵).

همبستگی بین ساعات آفتابی، کمینه و بیشینه دما و ارتفاع از سطح دریا با اولین متغیر کانونی به ترتیب $0/95$ ، $0/74$ و $0/61$ بود. همبستگی بین میانگین رطوبت، میانگین دما، ارتفاع از سطح دریا و دمای بیشینه با دومین متغیر کانونی به ترتیب $0/92$ ، $0/87$ ، $0/79$ و $0/67$ بود (جدول ۵). درصد وزنی عملکرد بذر ریز (اندازه زیر دو میلی‌متر غربال دراز و زیر $3/5$ میلی‌متر غربال گرد)، درصد وزنی عملکرد بذر استاندارد و بیشتر از استاندارد (اندازه بالای $3/2$ میلی‌متر غربال دراز) دارای بارهای معنی داری روی متغیر کانونی اول عوامل اقلیمی به ترتیب $0/7828$ ، $0/7939$ و $0/5258$ بودند. درصد وزنی عملکرد بذر ریز دارای بارهای مثبت، یکسان و معنی داری روی متغیر کانونی اول عوامل اقلیمی بودند، لیکن درصد وزنی عملکرد بذر استاندارد و بیشتر از استاندارد دارای بار منفی روی متغیر کانونی اول بودند.

جدول ۶- ضرایب ساختمنی همبستگی بین عوامل اقلیمی و میانگین درصد وزنی اندازه‌های بذر چغندر قند با متغیرهای کانونی مجموعه مقابل

Table 6. Construction correlation coefficients between environmental parameters and mean weight percent of seed sizes with their canonical variables set against

Environmental parameters	عوامل اقلیمی	V2	V1	Biophysical seed parameters	خصوصیات بیوفیزیکی بذر	W2	W1
Height above sea level	ارتفاع از سطح دریا	0.4536	-0.5796	Total seed Yield	عملکرد کل بذر	-0.3224	0.0981
Minimum temperture	کمینه دما	0.1755	0.9063	Seed yield 2mm ≠	درصد وزنی عملکرد بذر زیر ۲ میلی مترداراز	0.1998	0.7828
Maximum temperture	بیشینه دما	0.3845	0.7048	Standard seed Yield	درصد وزنی عملکرد بذر استاندارد	0.1382	-0.5258
Average temperture	میانگین دما	0.4972	0.4704	Seed yield 3.2mm ≠	درصد وزنی عملکرد بذر بالای ۳/۲ میلی مترداراز	-0.2528	-0.7939
Sunny hours	ساعات آفتابی	-0.0015	0.9523	Seed yield 3.5mm Ø	درصد وزنی عملکرد بذر زیر ۳/۵ میلی مترگرد	-0.0636	0.7986
Humidity	میانگین رطوبت	-0.5282	-0.3645				

جدول ۷- مریع همبستگی چندگانه بین عوامل اقلیمی و میانگین درصد وزنی اندازه‌های بذر چغندر قند با متغیرهای کانونی مجموعه مقابل

Table 7. Squared multiple correlation between environmental parameters and mean weight percent of seed sizes with their canonical variables set against

Environmental parameters	عوامل اقلیمی	V1	V2	Biophysical seed parameters	خصوصیات بیوفیزیکی بذر	W1	W2
Height above sea level	ارتفاع از سطح دریا	0.3360	0.5418	Total seed Yield	عملکرد کل بذر	0.0096	0.1201
Minimum temperture	کمینه دما	0.8214	0.8522	Seed yield 2mm ≠	درصد وزنی عملکرد بذر زیر ۲ میلی مترداراز	0.6128	0.6527
Maximum temperture	بیشینه دما	0.4967	0.6446	Standard seed Yield	درصد وزنی عملکرد بذر استاندارد	0.2765	0.2956
Average temperture	میانگین دما	0.2212	0.4684	Seed yield 3.2mm ≠	درصد وزنی عملکرد بذر بالای ۳/۲ میلی مترداراز	0.6303	0.6942
Sunny hours	ساعات آفتابی	0.9068	0.9068	Seed yield 3.5mm	درصد وزنی عملکرد بذر زیر ۳/۵ میلی مترگرد	0.6378	0.6418
Humidity	میانگین رطوبت	0.1329	0.4119				

تغییرات دمایی قرار نگرفت، ولی عامل مهمی در تغییر درصد وزنی عملکرد بذر استاندارد قابل فروش محسوب می شود. درصد وزنی عملکرد بذر با اندازه استاندارد و بیشتر از اندازه استاندارد در شرایط اقلیمی با ساعات آفتابی زیاد و با افزایش کمینه و بیشینه دما، کاهش می یابد. رطوبت نسبی هوا در مقایسه با تغییرات دمایی بر درصد وزنی عملکرد اندازه های مختلف بذر، نقش و اهمیت کمتری داشت. بر اساس یافته های این تحقیق می توان در انتخاب مناطق تولید بذر چغدرقند و استفاده از مواد ژنتیکی در برنامه های اصلاحی با هدف تولید بیشتر بذر استاندارد و اصلاح ارقام چغدرقند، استفاده نمود.

نتیجه گیری

میزان عملکرد بذر چغدرقند تحت تاثیر عوامل اقلیمی و ژنتیکی می باشد. با توجه به اندازه استاندارد مشخص بذر برای فروش، ۴۸ درصد از تغییرات اندازه بذر چغدرقند به عوامل اقلیمی و ۵۲ درصد تغییرات به عوامل دیگر نظیر ژنتیک وابسته است. مقارن شدن دوره رشد زایشی چغدرقند با شرایط سرد در اردبیل و فیروزکوه در مقایسه با شرایط معتدل کرج، باعث تولید بذر های چغدرقند بزرگتری شد، بنابراین مناطق سرد در تولید درصد وزنی عملکرد بذر استاندارد چغدرقند نسبت به اقلیم معتدل برتری معنی داری دارند. قوه نامیه مکانیکی بذر تحت تاثیر

References

منابع مورد استفاده

- Asghari, J., S. Amir Moradi and B. Kamkar.** 2009. Phsiology of Weeds. University of Guilan Press (In Persian).
- Baskin, C. C and J. M. Baskin.** 1998. Seeds: ecology, biogeography, and evolution of dormancy and germination. Academic Press, San Diego, California, USA.
- Borga, M.** 1998. Learning multidimensional signal processing. Ph.D. Thesis, Linköping University, Sweden, SE-581 83 Linköping, Sweden, Dissertation No 531, ISBN 91-7219-202-X.
- Bosemark, N. O.** 1970. Influence of seed crop environment on root crop characteristics. J. Int. Instit. Sugar Beet Res. 4: 193-206.
- Cook, D. A. and R. K. Scott.** 1993. Sugar beet crop: principle and practical. Chapman and Hall. London.
- Chegini, M. A. 2011. Effects of polish on germination and germination rate of sugar beet seed. Final report of Sugar Beet Seed Institute. (In Farsi).
- Chegini, M. A.** 1999. Effect of environment (temperature and photoperiod) on bolting, flowering and seed production in sugar beet (*Beta Vulgaris L.*) Ph. D Dissertation. The University of Reading. UK.
- CIFA; Canadian Food Inspection Agency.** 2002. Biology Document Bio. The Biology of *Beta vulgaris L.* (Sugar beet), http://www.inspection.gc.ca/English/plaveg/bio/dir/bio_0201_e.shtml.
- Donohue, K., and J. Schmitt.** 1998. Maternal environmental effects in plants: adaptive plasticity? p. 137-158, in Mousseau T. A. and C. W. Fox (Eds.), Maternal effects as adaptations, Oxford University Press, Oxford, UK.
- Durrant, M. J. and A. H. Loads.** 1990. Some changes in sugar beet seeds during maturation and after density grading. Seed Sci.Techol. 18, 11-21.
- Farshadfar, E.** 2010. Multivariate Principles and Procedures of Statistics. (3nd Ed.), Razi University Press

(In Persian).

- Farzaneh, S. 2015.** Investigation of relationship between phonological, morphological and physiological characteristics of different maternal and paternal lines on quantity and quality of sugar beet seed. Final report of Sugar Beet Seed Institute. (In Persian with English abstract).
- Galloway, L. F. 2001.** The effect of maternal and paternal environments on seed characters in the herbaceous plant *Campanula americana* (Campanulaceae). Am. J. Bot. 88(5): 832–840.
- Hampton, J. G., B. Boelt, M. P. Rolston and T. G. Chastain. 2013.** Effects of elevated CO₂ and temperature on seed quality. J. Agric. Sci. 151, 154–162.
- Heide, O. M., O. Junntila and R. T. Samuelsen. 1976.** Seed germination and bolting in red beet as affected by parent plant environment. Physiol. Plant. 36: 343-349.
- Lacey, E. P. 1996.** Parental effects in *Plantago lanceolata*. I. A growth chamber experiment to examine pre- and postzygotic temperature effects. Evolution, 50(2): 865–878.
- Longden, P. C. 1986.** Influence of the seed crop environment on the quality of sugar beet seed. In Proceedings of the 49th Winter Congress of the International Institute for Beet Research, Brussels. 1–16.
- Marlander, B., T. Lange and A. Wulkow. 2011.** Dispersal principles of sugar beet from seed to sugar with relation to genetically modified varieties. J. Fur Kulturpflanzen. 63(11): 373-349.
- Nash, M. S. and D. J. Chaloud. 2002.** Multivariate analyses (canonical correlation and partial least square (PLS)) to model and assess the association of landscape metrics to surface water chemical and biological properties using savannah river basin data. Environmental Protection Agency Las Vegas, Nevada, USA.
- Platenkamp, G. A. J. and R. G. Shaw. 1993.** Environmental and genetic maternal effects on seed characters in *Nemophila menziesii*. Evolution, 47: 540–555.
- Rasmussen, H. P and L. S. Lin. 2008.** W3168 Environmental and Genetic Determinants of Seed Quality and Performance . www.nimss.org/projects/view/mrp/outline/16536
- Scott, R. K. 1970.** The effect of weather on the concentration of pollen within sugar-beet seed crops Ann. Appl. Biol. 66: 119-127.
- Scott, R. K., P. C. Longden., D. W. Wood and M. G. Johnson. 1978.** Seed production. Rothamsted Experimental Station Report for 1977. Part 1, 58-59.
- Sultan, S. E. 1996.** Phenotypic plasticity for offspring traits in *Polygonum persicaria*. Ecology, 77(6): 1791–1807.
- Wood, D. W., R. K. Scott and P. C. Longden. 1980.** The effects of mother-plant temperature on seed quality in *Beta vulgaris* L. (sugarbeet). p. 257–270, in Hebblethwaite, P. D. (Ed.) Seed production. London–Boston, Butterworths.
- Wood, D. W., R. K. Scott. and P. C. Longded. 1982.** Effects of seed crop repening temperture on bolting in the sugar beet root crop. Proceeding of 45th Winter Congress. I.I.R.B. Bruscelles, Belgium.

Effect of environment and genetic on yield and seed size of single crosses of sugar beet (*Beta vulgaris L.*)

Mirzaei, M.R.¹, J. Asghari², D. Fatholah Taleghani³ and S. Sadghzadeh Hemayati⁴

ABSTRACT

Mirzaei, M.R., J. Asghari, D. Fatholah Taleghani and S. Sadghzadeh Hemayati. 2016. Effect of environment and genetic on yield and seed size of single crosses of sugar beet (*Beta vulgaris L.*). **Iranian Journal of Crop Sciences.** **18(1): 1-13.** (In Persian).

Effects of genetic and environmental factors on yield and seed size of 10 sugar beet singles crosses were evaluated using randomized complete block design with four replications. Experiments were carried out in Ardabil, Firouzkoooh, and Karaj, Iran, in 2013-14. Plant materials included 10 CMS lines crosses with one O-type. Combined analysis of variance for places showed that sugar beet seed yield was influenced by both genetic and environmental parameters. Some of the environmental parameters had significant effect on seed size. Cold regions including Ardabil and Firouzkoooh showed higher standard seed production (%) compared with temperate region, Karaj. In addition to environmental differences, significant differences were also observed among CMS lines in relation to standard seed production (%) (singles crosses). Considering standard seed size, results showed that the weight (%) of seed with standard sizes was influenced by both genetic and environmental parameters. Five biophysical seed characteristics and 6 environmental parameters collected from synoptic station. Canonical correlation study showed a relatively high and significant relationship between biophysical seed characteristics and environmental parameters and formed five canonical groups, among which only the first and the second groups were statistically significant. From the total variance of seed biophysical parameters, 48% of the total variance of seed biophysical variation was predictable by the first and the second canonical variables of environmental parameters. The first canonical variable function indicated the reduction of both standard and above standard seed size yields in comparison with under standard seed size. Considering of high positive construction coefficients for sunny hours and minimum and maximum temperatures, it can be concluded that the standard and above standard seed size yield reduced under Karaj environmental conditions with long sunny hours, higher minimum and maximum temperatures and lower altitude compared with Ardabil and Firouzkoooh environmental conditions.

Keyword: Biophysical seed characteristics, Canonical correlation analysis, Environmental parameters, Seed size and Sugar beet.

Received: 8 October, 2015 Accepted: 28 May, 2016

1- PhD Student, University of Guilan, Rasht, Iran (Corresponding author) (Email: Mirzaie_1346@yahoo.com)

2- Professor, University of Guilan, Rasht, Iran

3- Associate Prof., Sugar Beet Seed Research Institute, Karaj, Iran

4- Assistant Prof., Sugar Beet Seed Research Institute , Karaj, Iran