

غربالگری ژنوتیپ‌های برنج (*Oryza sativa L.*) با استفاده از شاخص‌های تحمل و روش‌های چند متغیره در شرایط تنش خشکی

Screening of rice (*Oryza sativa L.*) genotypes for drought tolerance using tolerance indices and multivariate analysis

سیده ارحامه فلاح شمسی^۱، همت‌الله پیردشتی^۲، علی‌اکبر عبادی^۳، مسعود اصفهانی^۴ و
محمود رائینی^۵

چکیده

فلاح شمسی، س. ا.، ۵. پیردشتی، ع. ا. عبادی، م. اصفهانی و م. رائینی. ۱۳۹۵. غربالگری ژنوتیپ‌های برنج (*Oryza sativa L.*) با استفاده از شاخص‌های تحمل و روش‌های چند متغیره در شرایط تنش خشکی. مجله علوم زراعی ایران. ۱۸(۴): ۳۶۳-۳۴۷.

به منظور شناسایی ژنوتیپ‌های برنج متحمل به تنش خشکی، آزمایشی گلستانی روی ۴۰ ژنوتیپ برنج بومی و اصلاح شده در شرایط بدون تنش و تنش آب (قطع آب در مرحله آبستنی) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۹۳ در موسسه تحقیقات برنج کشور اجرا شد. براساس شاخص‌های رایج تحمل تنش (آبیاری کامل تا انتهای دوره رشد) و تنش (قطع آب از مرحله آغازش خوشه تا انتهای دوره رشد) به صورت کوتاه‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج آزمایش مزرعه‌ای، ارقام نعمت و پرده‌یس به ترتیب با ۴۸۳۱ و ۲۰۷۶ کیلوگرم در هکتار، بیشترین و کمترین عملکرد دانه را در شرایط بدون تنش داشتند. در شرایط تنش خشکی، بیشترین عملکرد دانه از رقم ساحل (۳۶۰۵ کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد از رقم علی کاظمی با ۱۱۷۹ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. تنش خشکی باعث کاهش ۱۱/۵ تا ۶۴ درصد عملکرد دانه (به ترتیب در ارقام ساحل و علی کاظمی) شد. براساس نتایج تجزیه خوشه‌ای، ۱۷ ژنوتیپ برنج مورد ارزیابی به دو گروه تفکیک شدند که ۱۳ ژنوتیپ مقدار بالاتر شاخص‌های تحمل تنش را نشان دادند. براساس روش‌های رتبه‌بندی و تجزیه به مولفه‌های اصلی نیز به ترتیب نه و هفت ژنوتیپ به عنوان ژنوتیپ متحمل به خشکی شناسایی شدند. در آزمایش حاضر در مجموع براساس سه روش تجزیه خوشه‌ای، رتبه‌دهی و بای‌پلات، ژنوتیپ‌های درفک، قائم، لاین، ۸۳۱، اهلمنی طارم و جلودار متحمل به تنش خشکی شناخته شدند.

واژه‌های کلیدی: بای‌پلات، برنج، تجزیه خوشه‌ای، تنش خشکی و شاخص‌های تحمل.

- تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ این مقاله مستخرج از رساله دکتری و طرح پژوهشی شماره ۹۳۱۱۰۰-۰۴۲-۰۴-۳ موسسه تحقیقات برنج کشور می‌باشد.
- ۱- دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 - ۲- دانشیار پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران (مکاتبه کننده) (پست الکترونیک: pirdasht@yahoo.com)
 - ۳- استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت
 - ۴- استاد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 - ۵- استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مقدمه

شاخص حساسیت به تنش (SSI) نشان‌دهنده تغییرات کم عملکرد ژنوتیپ در شرایط تنش نسبت به شرایط بدون تنش و پایداری آن ژنوتیپ و میزان کمتر شاخص تحمل (TOL) حاکی از تحمل بیشتر ژنوتیپ به تنش است. شاخص تحمل تنش (STI) نیز توانایی تفکیک ژنوتیپ‌هایی را دارد که در هر دو محیط تنش و بدون تنش عملکرد بالایی را دارند. مقادیر بالای این شاخص نیز برای یک ژنوتیپ نشان‌دهنده تحمل تنش و پتانسیل عملکرد بالاتر است (Fernandez, 1992). شاخص پایداری عملکرد (YSI) نشان‌دهنده مقاومت ژنتیکی رقم به تنش و میزان بالای شاخص عملکرد (YI) حاکی از عملکرد بالای رقم در هر دو محیط تنش و بدون تنش می‌باشد (Jabari *et al.*, 2008). در این صورت ارقامی که تفاوت عملکرد زیادی با شاهد داشته باشند، مقادیر شاخص برتری (Pi) بیشتری خواهد داشت (Sio-Se Mardeh *et al.*, 2006). از سوی دیگر هر قدر مقادیر میانگین حسابی (MP)، میانگین هندسی (GMP) و میانگین هارمونیک (HM)، برای ژنوتیپی بیشتر باشد، تحمل بالاتری به تنش دارد.

نقوی و همکاران (Naghavi *et al.*, 2013) گزارش کردند که شاخص نسبی خشکی (RDI) و شاخص پایداری عملکرد (YSI) همبستگی بالایی با عملکرد دانه ذرت در شرایط بدون تنش و تنش خشکی دارند و این شاخص‌ها جهت انتخاب ژنوتیپ‌های متتحمل مناسب تر هستند. این محققان بیان داشتند که از بین ۱۲ شاخص تحمل، شاخص YI، شاخص درصد حساسیت به تنش (SSPI) و شاخص‌های تغییریافته تحمل تنش K₁STI و K₂STI، مناسب‌ترین شاخص‌ها به منظور گزینش ارقام متتحمل بودند. در بررسی اثر کم آبی روی ۱۵ ژنوتیپ کلزا مشخص شد که شاخص‌های K₁STI، GMP، MP، STI و K₂STI همبستگی مثبت با عملکرد دانه در هر دو شرایط تنش و بدون تنش داشتند. نتایج با پلات تجزیه به مؤلفه‌های اصلی هم نشان داد که این شاخص‌ها برای شناسایی ارقام متتحمل

برنج (*Oryza sativa* L.) به عنوان یکی از مهم‌ترین گیاهان زراعی جهان، سالیانه تقریباً ۳۵ تا ۷۰ درصد از کالری مورد نیاز سه میلیارد نفر از جمعیت دنیا را تأمین می‌کند. گزارش شده است که برای تأمین نیاز غذایی جمعیت جهانی تا سال ۲۰۲۵ نیاز به افزایش ۶۰ درصدی در تولید برنج می‌باشد (Fageria, 2007)، در عین حال از یک سو منابع آب شیرین به علت تغییرات آب و هوایی، رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی و توسعه صنعت، به طور فزاینده‌ای در حال کاهش است (Yang and Zhang, 2010) و از سوی دیگر برای تولید یک کیلوگرم شلتوك برنج حدود ۲۵۰۰ لیتر آب مورد نیاز است (Bouman, 2009). خشکی یکی از مهم‌ترین عوامل محدود کننده رشد برنج محسوب شده و می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه عملکرد و کاهش مقدار کل تولید برنج شود (Sikuku *et al.*, 2010). تخمین زده می‌شود که ۵۰ درصد تولید جهانی برنج تحت تأثیر خشکی قرار می‌گیرد، از این رو اصلاح ارقام جدید به منظور بهبود کارایی مصرف آب، جهت غلبه بر کمبود آب و تأمین نیاز جمعیت جهانی ضروری است (This *et al.*, 2010). با توجه به محدودیت آب آبیاری برای اغلب گیاهان زراعی از جمله برنج، استفاده هر چه مفیدتر و کارآمدتر از آب آبیاری، یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با بحران کمبود آب می‌باشد و شناسایی میزان تحمل ژنوتیپ‌های برنج نسبت به کمبود آب، از نخستین اقدامات لازم برای مقابله با اثرات سوء کمبود آب در زراعت این گیاه محسوب می‌شود. از این‌رو، استفاده از شاخص‌های تحمل، امکان بهره‌برداری از صفات مرتبط با عملکرد بالا در برنامه تولید ارقام متتحمل، تسهیل خواهد نمود. استفاده از این روش‌ها اطمینان ایجاد می‌کند که ژنوتیپ‌های انتخاب شده بر اساس این شاخص، متتحمل به تنش خواهند بود (Ouk *et al.*, 2006).

در بین شاخص‌های تحمل تنش، میزان کمتر

را برای شناسایی ژنوتیپ‌های برنج پرمحصول در شرایط بدون تنش و تنش شدید خشکی و شاخص‌های DYI، SSI و TOL را برای تفکیک ژنوتیپ‌های پرمحصول در شرایط تنش خشکی، معرفی کردند. Rahimi و همکاران (2013) شاخص‌های GMP، MP، STI و HM را برای انتخاب ژنوتیپ‌های پرمحصول در برنامه‌های اصلاح برنج مناسب اعلام کردند. گزارش شده است که شاخص‌های SSI و YSI برای شناسایی ژنوتیپ‌های برنج متتحمل به تنش خشکی در مرحله زایشی مناسب هستند (Khan and Dhurve, 2016). صفائی چائی کار و همکاران (2008) در ارزیابی ۴۲ ژنوتیپ برنج ایرانی و خارجی و فلاح شمسی و همکاران (Fallah-Shamsi et al., 2012) در ارزیابی ۱۵ ژنوتیپ اصلاح شده و بومی برنج گزارش کردند که شاخص‌های MP، GMP و STI برای ارزیابی تحمل تنش خشکی انتهای فصل و تنش کمبود آب، مناسب هستند.

روش‌های آماری چندمتغیره ابزار مفیدی برای استخراج الگوهای اثر متقابل ژنوتیپ × محیط هستند. استفاده از روش‌های تجزیه چندمتغیره نظری تجزیه به عامل‌ها و تجزیه خوشه‌ای در گیاهان مختلف زراعی از جمله برنج به منظور شناسایی ارقام و ژنوتیپ‌های متتحمل کاربرد دارد (Abd El-Mohsen et al., 2015). بعلاوه از روش رتبه‌بندی نیز برای ارزیابی شاخص‌ها و مجموع، انحراف معیار و میانگین رتبه‌ها در شناسایی ارقام متتحمل به تنش استفاده می‌شود. ژنوتیپ‌هایی که مقدار کمتری از نظر مجموع و انحراف معیار رتبه‌ها داشته باشند، متتحمل به تنش محسوب می‌شوند (Frashadfar and Elyasi, 2012).

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ژنوتیپ‌های متتحمل به تنش خشکی برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش به کمک روش‌های مختلف آماری در دو شرایط گلستانی و مزرعه‌ای انجام شد.

به تنش مناسب‌تر هستند (Aliakbari et al., 2014) سی‌وسه مرده و همکاران (Sio-Se Mardeh et al., 2006) گزارش کردند که در شرایط تنش خشکی متوسط، شاخص‌های MP، GMP و STI برای شناسایی ارقام گندم با عملکرد بالا در هر دو شرایط تنش و بدون تنش (ژنوتیپ‌های گروه A) مؤثر هستند، اما در شرایط تنش شدید هیچکدام از شاخص‌ها قادر به تفکیک ژنوتیپ‌های گروه A فرناندز نبودند. آنها اظهار داشتند که کارایی شاخص‌ها در انتخاب ارقام متتحمل بسته به شدت تنش متفاوت است. احمدی و همکاران (Ahmadi et al., 2008) نیز کارایی شاخص‌های تحمل تنش را برای ارقام گندم در شدت‌های مختلف تنش، متفاوت گزارش کردند. نتایج تحقیق روی ارقام یولاف در ترکیه نشان داد که شاخص YSI قادر به جداسازی ارقام حساس / مقاوم در شرایط تنش شدید و شاخص‌های GMP، MP، STI، YI، HM و Pi در گزینش ارقام متتحمل به تنش مؤثر بودند (Akcura and Ceri, 2011). صفری و همکاران (Safari et al., 2009) در ارزیابی اثر تنش خشکی در دو مرحله رویشی و زایشی روی لاین‌های اینبرد ذرت بیان کردند که در شرایط تنش در مرحله رویشی، شاخص‌های MP، GMP و TOL و در شرایط تنش در مرحله زایشی، شاخص‌های GMP و TOL مناسب‌ترین شاخص‌ها هستند. کومار و همکاران (Kumar et al., 2014) بیان کردند که انتخاب بر اساس شاخص‌های DTE (کارایی تحمل تنش)، SSI و STI به ژنوتیپ‌های برنج متتحمل به خشکی TOL به شناسایی ژنوتیپ‌های برنج متتحمل به خشکی در شرایط دیم کمک می‌کند. مطالعه روی لاین‌های اصلاح شده برنج نیز نشان داد که انتخاب ژنوتیپ‌ها بر اساس شاخص عملکرد خشکی (DYI) به شناسایی لاین‌های با عملکرد بسیار نزدیک به ارقام رایج در شرایط بدون تنش و عملکرد بالاتر در شرایط تنش شدید و متوسط خشکی، منجر می‌شود (Raman et al., 2012). آنها شاخص‌های GMP و STI و

تا انتهای مرحله پنجه‌زنی ژنوتیپ‌های برنج به صورت غرقابی انجام شد و در گلدان‌های مربوط به تنش کم‌آبی، آبیاری در مرحله آبستنی [مرحله پنج کدبندی‌سیستم ارزیابی استاندارد برنج؛ SES (IRRI, 2014)] به طور کامل قطع و پس از وقوع علائم تنش (فاصله گرفتن خاک از جداره گلدان تا حدود پنج تا هشت سانتی‌متر)، آبیاری گلدان‌ها از سر گرفته شد (Yazdani, 2012). بر اساس رابطه بین میزان فاصله گرفتن خاک (شالیزاری) از جداره گلدان و مقدار رطوبت حجمی (Yazdani, 2012)، میزان رطوبت حجمی خاک محاسبه و براساس منحنی رطوبتی خاک، میزان افت پتانسیل آبی و شدت تنش اعمال شده مشخص گردید (رابطه ۱).

$$y = 33x^2 - 38.8x + 11.3 \quad (\text{رابطه } 1)$$

y: نصف فاصله خاک از جداره گلدان و x: مقدار رطوبت حجمی خاک می‌باشد. با استفاده از رابطه ۱، با فاصله گرفتن خاک به میزان پنج سانتی‌متر از جداره

مواد و روش‌ها

پژوهش حاضر در دو سال (سال اول به صورت گلدانی و سال دوم به صورت مزرعه‌ای) اجرا شد. آزمایش سال اول (۱۳۹۳) روی ۴۰ لاین و رقم بومی و اصلاح شده از ژنوتیپ‌های برنج غرقابی (جدول ۱) در دو شرایط بدون تنش و تنش کم‌آبی به صورت گلدانی اجرا شد. ژنوتیپ‌های برنج مربوط به چهار استان گیلان، مازندران، اصفهان و خوزستان بودند که بذر آنها از موسسه تحقیقات برنج کشور تهیه شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و با دو عامل تنش کم‌آبی و ژنوتیپ‌های برنج در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) انجام شد. گلدان‌ها در طول اجرای آزمایش زیر پوشش بارانگیر قرار داده شدند. برای آزمایش، از گلدان‌های پلاستیکی با قطر دهانه ۲۵ و ارتفاع ۳۰ سانتی‌متر استفاده شد که در هر گلدان سه گیاهچه نشاکاری شدند. آبیاری گلدان‌ها

جدول ۱- خصوصیات ژنوتیپ‌های برنج مورد ارزیابی

Table 1. Characteristics of rice genotypes

شماره No.	Rice genotypes	منشاء Origin	شماره No.	Rice genotypes	منشاء Origin
1	Khazar	خرز	1	Keshvari	کشوری 4
2	Dorfak	درفک	1	Shiroudi	شیرودی 4
3	Nemat	نعمت	4	Koohsar	کوهسار 4
4	Gohar	گوهر	1	Hashemi	هاشمی 1
5	Saleh	صالح	1	Ali Kazemi	علی کاظمی 1
6	Kadoos	کادوس	1	Domsiah	دمسیاه 1
7	Tabesh	تابش	4	Sangejo	سنگجو 4
8	Shafagh	شقق	4	Sadri	صدری 1
9	Pouya	پویا	4	Binam	بنام 1
10	Fajr	فجر	4	Hasansarayi	حسن‌سرایی 1
11	Sahel	ساحل	4	Hasani	حسنی 1
12	Ghaem	قائم	4	Deylamani	دیلمانی 4
13	Jelodar	جلودار	4	Ahlomi Tarom	اهلمنی طارم 4
14	Pajohesh	پژوهش	4	Hamar Ahvaz	حرماهواز 3
15	Pardis	بردیس	4	Champa Ahvaz	چمپا اهواز 3
16	Zayandeh Rud	زاینده‌رود	2	Anboori Ahvaz	عنبری اهواز 3
17	Sazandegi	سازندگی	2	Hasani rishak ghermez	حسنی ریشک قرمز 1
18	Danial	دانیال	3	Gilaneh	گilanه 1
19	Hoveyzeh	هویزه	3	Line 831	لاین ۸۳۱ 1
20	Neda	ندا	4	Firoozan	فیروزان 2

1: Gilan, 2: Isfahan, 3: Khozestan and 4: Mazandaran

۱: گیلان، ۲: اصفهان، ۳: خوزستان و ۴: مازندران

پنجه‌زنی، همزمان با آغاز خوشة تا انتهای دوره رسیدگی (مرحله سه کدبندی سیستم ارزیابی استاندارد برنج) اجرا شد (داده‌های مربوط به پتانسیل آب خاک در جدول ۲ ارائه شده است). ابعاد کرت‌های آزمایشی $1/5 \times 1/5$ متر و فواصل نشاکاری 25×25 سانتی‌متر بودند. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار با دو عامل اصلی تیمارهای آبیاری (بدون تنفس با آبیاری سنتی و تنفس با قطع آب در مرحله حداکثر پنجه‌زنی) و عامل فرعی ۱۷ ژنوتیپ برنج انتخابی از آزمایش اول، اجرا شد. در اطراف کرت‌های تنفس و بین قطعات مربوط به ژنوتیپ‌های با دوره رسیدگی یکسان، زهکش‌های جهت خروج سریع آب در زمان بارش‌های احتمالی و جلوگیری از نشت آب از کرت‌های مجاور، احداث شد. نشاکاری در تاریخ ۹۴/۲/۶ و قطع آب ژنوتیپ‌های زودرس و دیررس به ترتیب در تاریخ‌های ۹۴/۴/۳۱ و ۹۴/۵/۹ انجام شد. در انتهای دوره رشد، بوته‌های هر کرت برداشت و عملکرد دانه آنها با رطوبت ۱۴ درصد اندازه‌گیری شد.

گلدان، مکش اشباعی معادل ۲۸۱-کیلوپاسکال محاسبه شد. با رسیدن فاصله خاک از جداره به حدود هشت سانتی‌متر (۹۰۰-کیلوپاسکال)، به منظور جلوگیری از وارد شدن خسارت شدید به گیاه، آبیاری گلدان‌های تنفس از سر گرفته شد. گلدان‌های بدون تنفس، تا انتهای دوره رشد به طور کامل آبیاری شدند. در انتهای دوره رشد گیاه و در مرحله رسیدگی، بوته‌های هر گلدان کف بر شده و عملکرد دانه در هر گلدان ثبت شد. از بین ۴۰ ژنوتیپ ارزیابی شده در آزمایش گلدانی، ۱۷ ژنوتیپ انتخاب و در سال ۱۳۹۴ در شرایط مزرعه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. این ژنوتیپ‌ها شامل ۱۴ ژنوتیپ متحمل که براساس شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنفس به عنوان ژنوتیپ‌های گروه A فرندز شناسایی شدند و در هر دو محیط تنفس و بدون تنفس عملکرد بالایی داشتند، همراه با سه ژنوتیپ از گروه‌های دیگر در شرایط مزرعه‌ای کشت شدند. آزمایش سال دوم در دو مزرعه شامل یک مزرعه برای شرایط شاهد بدون تنفس (آبیاری از ابتدای دوره تا ۱۰ روز پیش از برداشت به صورت غرقاب) و مزرعه دیگر برای تنفس خشکی [قطع آب از مرحله حداکثر

جدول ۲- میزان رطوبت حجمی و پتانسیل آب خاک بعد از قطع آبیاری (۱۳۹۴)

Table 2. Volumetric moisture content and soil water potential after irrigation withhold (IW) (2015)

Measurement time	زمان اندازه‌گیری	رطوبت حجمی خاک	
		Soil volumetric moisture (%)	پتانسیل آب خاک Soil water potential (kPa)
7 days after IW	روز بعد از قطع آبیاری	47.8	-38
12 days after IW	روز بعد از قطع آبیاری	46.8	-58
17 days after IW	روز بعد از قطع آبیاری	42.6	-142
22 days after IW	روز بعد از قطع آبیاری	34.1	-347
24 days after IW	روز بعد از قطع آبیاری	24.0	-900

شاخص پایداری عملکرد (YSI)، شاخص نسبی خشکی (RDI)، شاخص درصد حساسیت به تنفس (SSPI)، شاخص تغییر یافته تحمل تنفس (K_{STI}) و K_{1STI}، شاخص برتری (P_i) و شاخص عملکرد خشکی (DYI) براساس روابط جدول ۳ استفاده شد. پس از اندازه‌گیری

برای ارزیابی تحمل یا حساسیت ژنوتیپ‌های برنج به تنفس، از شاخص‌های میانگین حسابی (MP)، میانگین هندسی (GMP)، میانگین هارمونیک (HM)، شاخص تحمل (TOL)، شاخص حساسیت به تنفس (SSI)، شاخص تحمل تنفس (STI)، شاخص عملکرد (YI)،

تشخیص به روش مستقیم استفاده شد. تجزیه و مقایسه میانگین داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SAS نسخه ۹/۱ و با روش حداقل تفاوت معنی‌دار (LSD)، تجزیه خوش‌های PAST و بای‌پلات تجزیه به مؤلفه‌های اصلی با نرم‌افزار SPSS نسخه ۳/۰/۵ و تجزیه تابع تشخیص با نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام شد.

عملکرد دانه، شاخص‌های موردنظر برای هر دو سال آزمایش محاسبه شدند. تجزیه خوش‌های به روش گروه‌بندی واریانس حداقل وارد با استفاده از داده‌های استاندارد شده، براساس شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنفس انجام شد. برای تعیین صحت گروه‌بندی حاصل از تجزیه خوش‌های، از تجزیه تابع

جدول ۳- روابط مورد استفاده برای محاسبه شاخص‌های تحمل خشکی

Table 3. The used equation for calculating drought tolerance indices

Indices	شاخص‌های تحمل	Formula	رابطه	Reference	منبع
Mean productivity	میانگین حسابی	$MP = (Y_S + Y_N)/2$		Rosielle and Hamblin, 1981	
Geometric mean productivity	میانگین هندسی	$GMP = \sqrt{Y_S} \times Y_N$		Fernandez, 1992	
Harmonic mean	میانگین هارمونیک	$HM = (2 \times Y_N \times Y_S)/(Y_N + Y_S)$		Fernandez, 1992	
Tolerance index	شاخص تحمل	$TOL = Y_N - Y_S$		Rosielle and Hamblin, 1981	
Stress susceptibility index	شاخص حساسیت به تنفس	$SSI = (1 - (Y_S / Y_N))/SI$		Fischer and Maurer, 1978	
Stress tolerance index	شاخص تحمل تنفس	$SI = 1 - (\bar{Y}_S / \bar{Y}_N)$			
Stress tolerance index	شاخص عملکرد	$STI = (Y_N \times Y_S) / (\bar{Y}_N)^2$		Fernandez, 1992	
Yield index	شاخص پایداری عملکرد	$YI = Y_S / \bar{Y}_S$		Gavuzzi <i>et al.</i> , 1997	
Yield stability index	شاخص درصد حساسیت به تنفس	$YSE = Y_S / Y_N$		Bouslama and Schapaugh, 1984	
Relative drought index	شاخص نسبی خشکی	$IDI = (Y_S / Y_N) / (\bar{Y}_S / \bar{Y}_N)$		Fischer and Wood, 1979	
Stress susceptibility percent index	شاخص درصد حساسیت به تنفس	$SSPI = [Y_N - Y_S / 2(\bar{Y}_N)] \times 100$		Moosavi <i>et al.</i> , 2008	
Modified stress tolerance index (K1STI and K2STI)	شاخص تغییر یافته تحمل تنفس	$K_1 STI = Y_S^2 / \bar{Y}_S^2$		Farshadfar and Sutka, 2002	
Superiority index	شاخص برتری	$K_2 STI = Y_N^2 / \bar{Y}_N^2$		Farshadfar and Sutka, 2002	
Drought yield index	شاخص عملکرد خشکی	$P_i = \sum_{j=1}^n (X_{ij} - M_j)^2 / 2n$		Clarke <i>et al.</i> , 1992	
		$DYI = \frac{\bar{Y}_N}{Y_S} / \frac{G_N}{G_S}$		Raman <i>et al.</i> , 2012	

Y_S: میانگین عملکرد کلیه ژنوتیپ‌ها در محیط تنفس، Y_N: میانگین عملکرد کلیه ژنوتیپ‌ها در محیط بدون تنفس
G: میانگین هندسی عملکرد بین ژنوتیپ‌ها، Y_S: عملکرد ژنوتیپ در محیط تنفس، Y_N: عملکرد ژنوتیپ در شرایط بدون تنفس و SI: شاخص تنفس، X_{ij}: عملکرد دانه ژنوتیپ
نم در محیط زم و M_j: عملکرد دانه ژنوتیپ با حد اکثر عملکرد در محیط زم

Y_S : Mean yield of all genotypes under stress conditions, Y_N : Mean yield of all genotypes under non-stress conditions, G: Geometric mean across genotypes, Y_S: Yield of genotype under stress, Y_N: Yield of genotype under non-stress conditions, SI: Stress index, X_{ij}: Grain yield of ith genotype in the jth environment M_j: Yield of the genotype with maximum yield at location j

شرایط گلستانی نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در شرایط بدون تنفس به رقم علی کاظمی (۴۴ گرم در بوته)

نتایج و بحث

نتایج حاصل از ارزیابی مقدماتی ژنوتیپ‌ها در

(شکل ۱). لامبای ویلکس برای سه تابع شناسایی شده بسیار معنی دار (۰/۰۰۰) و صحت گروه‌بندی ۹۷/۵ در صد بود (جدول ۵). گروه‌های حاصل به ترتیب شامل ۶، ۱۴، ۹ و ۱۱ ژنوتیپ بودند (شکل ۱). مقایسه میانگین بین گروه‌های ایجاد شده (جدول ۶) نشان داد که از نظر شاخص‌های رایج تحمل تنش، ژنوتیپ‌های گروه دوم (II) شامل نعمت، جلودار، علی‌کاظمی، شیروودی، درفک، اهلی طارم، ساحل، قائم، پژوهش، گیلانه، لاین ۸۳۱، فیروزان، پردیس و ندا، جزء ژنوتیپ‌های متحمل به تنش کم‌آبی بودند، زیرا در هر دو محیط بدون تنش و تنش دارای عملکرد بالای (به ترتیب ۳۶/۷ و ۲۹/۷ گرم در بوته) بودند و با توجه به تقسیم‌بندی چهار گانه ژنوتیپ‌ها در گروه A قرار گرفتند. ژنوتیپ‌های گروه یک (I) شامل گوهر، سازندگی، هویزه، عنبری اهواز، فجر و دانیال در هر دو محیط بدون تنش و تنش عملکرد پایینی (به ترتیب ۱۰/۹ و

۶/۷ گرم در بوته) مربوط بود. بیشترین و کمترین مقدار عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی نیز به ترتیب برای ارقام گیلانه و دانیال (۳۶/۸ و ۴/۴ گرم در بوته) حاصل شد. براساس نتایج به دست آمده، تنش خشکی کاهش عملکرد ۱/۶ تا ۵۰/۸ درصدی را به ترتیب در ارقام صالح و دمسیاه باعث شد (جدول ۴).


بر اساس عملکرد دانه در شرایط بدون تنش و تنش آبی، شاخص‌های رایج تحمل و حساسیت به تنش شامل TOL، STI، SSI، MP و HM محاسبه شدند. در تجزیه خوش‌های، روش گروه‌بندی واریانس حداقل وارد با توجه به امکان رسم دندروگرام مناسب جهت برش و نیز مشخص نمودن گروه‌بندی مطلوب، مورد استفاده قرار گرفت. ضریب کوفنیک برای تجزیه خوش‌های به روش وارد ۰/۷۵۱۶ به دست آمد. خط برش برای دندروگرام حاصل در نظر گرفته شد و براین اساس ژنوتیپ‌های برنج در چهار گروه تفکیک شدند

جدول ۴- عملکرد دانه در شرایط بدون تنش (Yn) و تنش خشکی (Ys) و میزان کاهش عملکرد (YR) ژنوتیپ‌های برنج انتخابی (۱۳۹۳)

Table 4. Grain yield of selected rice genotypes in non-stress (Yn) and drought stress condition (Ys)

and yield reduction rate (YR) (2014)

Rice genotypes	ژنوتیپ‌های برنج	عملکرد دانه در شرایط بدون تنش Yn (g.plant ⁻¹)	عملکرد دانه در شرایط تنش Ys (g.plant ⁻¹)	کاهش عملکرد YR (%)
Dorfak	درفک	37.4	29.4	-21.4
Nemat	نعمت	41.0	33.6	-18.0
Gohar	گوهر	18.0	14.6	-18.6
Kados	کادوس	31.1	27.1	-12.7
Pouya	پویا	32.0	25.6	-20.0
Sahel	ساحل	34.4	25.8	-33.5
Ghaem	قائم	34.9	32.7	-6.5
Jelodar	جلودار	39.9	32.2	-19.4
Pajohesh	پژوهش	35.6	32.4	-9.0
Pardis	پردیس	32.3	29.9	-7.2
Neda	ندا	34.8	32.3	-7.7
Shiroudi	شیروودی	37.6	24.9	-33.7
Alikazemi	علی‌کاظمی	44.0	25.9	-41.2
AhlamiTarom	اهلی طارم	38.3	28.6	-25.5
Gilaneh	گیلانه	36.4	34.7	-4.7
Line831	لاین ۸۳۱	36.3	33.9	-6.7
Firoozan	فیروزان	33.1	32.4	-2.2



شکل ۱- دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌های برنج به روش گروه‌بندی واریانس حداقل وارد (۱۳۹۳)
(ضریب کوفنیک: ۰/۷۵۱۶)

Fig. 1. Dendrogram of cluster analysis of rice genotypes by Ward's minimum variance method (2014)
(Coph.Coeff: 0.7516)

از چه ترتیب: گوهر، سازندگی، هویزه، عنبری، فجر، دانیال (گروه یک)، نعمت، جلودار، علی کاظمی، شیروودی، درفک، اهلمنی طارم، ساحل، قائم، پژوهش، گیلانه، لاین ۸۳۱، فیروزان، پریدس، ندا (گروه دو)، زاینده‌رود، سنگ‌جو، دیلمانی طارم، کشوری، حسنی ریشك قرمز، تابش، صدری، بینام، دمسیاه (گروه سه)، حسن سرائی، هاشمی، پویا، کادوس، حمر، حسنی، شفق، کوهسار، چمپا اهواز، خزر و صالح (گروه چهار)

جدول ۵- آزمون تابع تشخیص برای ژنوتیپ‌های برنج در شرایط تنفس خشکی با استفاده از لامبایدی ویلکس برای شکل ۱

Table 5. Discriminant function analysis using Wilks' Lambda for rice genotypes under drought stress condition for Fig. 1

Test of function(s)	آزمون توابع	لامبایدی ویلکس Wilks' Lambda	کای اسکوثر Chi-square	درجه آزادی df	معنی‌داری Sig.
1 through 3	تابیم اول از درون تابیم سوم	0.009	161.004	18	0.000
2 through 3	تابیم دوم از درون تابیم سوم	0.128	69.956	10	0.000
3	تابیم سوم	0.425	29.131	4	0.000

جدول ۶- مقایسه میانگین گروه‌های حاصل از تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌های برنج براساس شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنفس خشکی

Table 6. Mean comparison of classified groups by cluster analysis of rice genotypes using susceptible and

Groups	tolerant indices								
	Yn	Ys	TOL	MP	GMP	HM	SSI	STI	
I	16.07d	10.93d	5.17c	13.53c	13.17d	12.90d	1.30b	0.20c	
II	36.73a	29.70a	7.07b	33.20a	32.97a	32.63a	0.83c	1.20a	
II	31.43b	19.90c	11.57a	25.70b	24.97c	24.27c	1.53a	0.70b	
IV	28.87c	24.87b	4.00d	26.87b	26.77b	26.70b	0.60d	0.80b	

در هر ستون میانگین‌هایی که دارای حروف مشترک هستند، براساس آزمون LSD در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی‌داری ندارند.

Means with similar letter(s) in each column are not significantly different at 1% probability level using LSD test

دaniel، تابش، نعمت، فجر و ساحل در تنش در مرحله رویشی و ژنوتیپ‌های Daniel، نعمت، ساحل و کادوس در تنش در مرحله زایشی از نظر بهترین شاخص‌های تحمل در آزمایش (GMP و STI)، تحمل بالاتری نسبت به تنش خشکی داشتند.


براساس نتایج آزمایش مزرعه‌ای، ارقام نعمت و پردیس به ترتیب با ۴۸۳۱ و ۲۰۷۶ کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد دانه در شرایط بدون تنش را داشتند. در شرایط تنش خشکی بیشترین عملکرد دانه از رقم ساحل (۳۶۰۵ کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد از رقم علی کاظمی با ۱۱۷۹ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. تنش خشکی در سال دوم آزمایش کاهش ۱۱/۵ تا ۶۴ درصدی را به ترتیب در ارقام ساحل و علی کاظمی باعث شد (جدول ۷). از ۴۰ ژنوتیپ بررسی شده در آزمایش گلستانی، ۱۷ ژنوتیپ شامل ۱۴ ژنوتیپ متحمل یا به عبارتی ژنوتیپ‌های گروه دو (II) به همراه رقم گوهر از گروه یک (I) به عنوان شاهد حساس و ارقام پویا و کادوس از گروه چهار (IV) با عملکرد بالا در شرایط تنش، انتخاب شدند و در شرایط مزرعه‌ای در مععرض تنش خشکی قرار گرفتند.

۱۶/۱ گرم در بوته) داشتند (گروه D). ژنوتیپ‌های گروه سوم (III) شامل زاینده‌رود، سنگجو، دیلمانی طارم، کشوری، حسنی ریشک قرمز، تابش، صدری، بیانم و دمسياه در محیط بدون تنش عملکرد بالایی (۳۱/۴ گرم در بوته) داشتند (گروه B)، اما تنش کم‌آبی افت عملکرد زیادی را در این گروه (۱۹/۹ گرم در بوته) باعث شد (۳۶/۶ درصد). گروه چهارم (IV) شامل ژنوتیپ‌های حسن‌سرائی، هاشمی، پویا، کادوس، حمر اهواز، حسنی، شفتی، کوهسار، چچپا اهواز، خزر و صالح در محیط تنش دارای عملکرد خوبی (۲۴/۹ گرم در بوته) بودند (گروه C). ژنوتیپ‌های این گروه در محیط بدون تنش عملکرد کمی نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها داشتند (۲۸/۸ گرم در بوته). در آزمایش فلاخ شمسی و همکاران (Fallah-Shamsi *et al.*, 2012) براساس این سه شاخص، ارقام علی کاظمی (بومی) و ندا، درفک و ساحل (اصلاح شده) در ارزیابی مزرعه‌ای، متحمل به تنش کمبود آب شناخته شدند. نتایج آزمایش عرفانی و همکاران (Erfani *et al.*, 2011) روی ۲۶ ژنوتیپ برنج در تیمارهای تنش خشکی در مراحل رویشی و زایشی نشان داد که ژنوتیپ‌های

جدول ۷- عملکرد دانه در شرایط بدون تنش (Yn) و تنش (Ys) و میزان کاهش عملکرد (YR) ژنوتیپ‌های برنج

Table 7. Grain yield of rice genotypes in non-stress (Yn) and drought stress conditions (Ys)

Rice genotypes	ژنوتیپ‌های برنج	and yield reduction rate (YR)			
		عملکرد دانه در شرایط بدون تنش Yn (kg.ha ⁻¹)	عملکرد دانه در شرایط تنش Ys (kg.ha ⁻¹)	عملکرد دانه در شرایط تنش	کاهش عملکرد YR (%)
Sahel	ساحل	4074.4	3605.2	-11.51	
Jelodar	جلودار	3431.4	2642.9	-22.98	
Ghaem	قائم	3679.9	2902.5	-21.12	
Pooya	پویا	3795.6	1373.9	-63.80	
Kadoos	کادوس	3521.9	1871.9	-46.85	
Dorfak	درفک	3834.5	2812.9	-26.64	
Nemat	نعمت	4830.9	2633.2	-45.49	
Shiroodi	شیروودی	3090.1	2731.6	-11.60	
Neda	ندا	4713.5	3198.6	-32.14	
Gohar	گوهر	3056.0	1430.2	-53.20	
Pardis	پردیس	2075.9	1452.5	-30.03	
Gilaneh	گیلانه	3519.3	2196.8	-37.58	
Ahlami Tarom	املامی طارم	3599.4	2590.5	-28.03	
Ali Kazemi	علی کاظمی	3264.3	1178.6	-63.89	
Pazhohesh	پژوهش	4138.7	2144.9	-48.17	
Line 831	لاین ۸۳۱	3795.4	2748.0	-27.60	



شکل ۲- دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌های برنج به روش ادغام بر حسب متوسط گروه‌ها (۱۳۹۴)
(ضریب کوفنیک: ۰/۸۳۳۸)

Fig. 2. Dendrogram of cluster analysis of rice genotypes by UPGMA method (2015) (Coph.Coeff: 0.8338)

از سمت چپ به ترتیب: گوهر، علی کاظمی، پردیس (گروه اول)، نعمت، ساحل، ندا، اهلمنی طارم، پژوهش، جلودار، قایم، لاین ۸۳۱، درفک، کادوس، شیروودی، گیلانه و پویا (گروه دوم)

جدول ۸- آزمون تابع تشخیص برای ژنوتیپ‌های برنج در شرایط تنفس خشکی با استفاده از لامبایدی ویلکس برای شکل ۲

Table 8. Discriminant function analysis using Wilks' Lambda for rice genotypes under drought stress condition for Fig. 2

آزمون توابع Test of Function(s)	آزمون توابع Wilks' Lambda	لامبایدی ویلکس Chi-square	کای اسکوئر d.f	درجه آزادی Significance
1 (تابع اول)	0.129	22.529	6	0.001

جدول ۹- مقایسه میانگین گروه‌های حاصل از تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌های برنج (۱۳۹۴)

Table 9. Mean comparison of classified groups by cluster analysis of rice genotypes (2015)

group	Yn	Ys	TOL	SSI	STI	MP	GMP	HM
I	2869.3	1353.8	1515.6	1.35	0.27	2111.6	1944.1	1793.1
II	3946.7	2592.1	1354.6	0.90	0.74	3269.4	3176.7	3089.2
LSD (0.05)	311.4	327.4	537.7	0.49	0.07	172.6	191.0	221.9
group	DYI	YSI	YI	Pi	RDI	SSPI	K1STI	K2STI
I	1.35	0.50	0.57	3710538	0.78	13.0	0.253	0.143
II	0.97	0.73	1.09	1394447	1.04	11.6	0.470	0.510
LSD (0.05)	0.28	0.19	0.14	340370	0.28	4.63	0.074	0.079

به تنفس محاسبه و تجزیه خوشه‌ای آن‌ها به روش گروه‌بندی واریانس حداقل وارد و روش ادغام بر حسب متوسط گروه‌ها یا UPGMA انجام شد. دندروگرام به دست آمده از روش UPGMA ضریب کوفنیک

در انتهای دوره به دلیل رشد نامناسب و عملکرد بسیار پائین رقم فیروزان، این رقم از آزمایش حذف و انتخاب ارقام متحمل بین ۱۶ ژنوتیپ باقیمانده انجام شد. برای سال دوم آزمایش، ۱۴ شاخص تحمل و حساسیت


گوهر، علی کاظمی و پردیس بود و بقیه ژنوتیپ‌ها در گروه دوم قرار گرفتند (شکل ۲) و تفاوت بین این دو گروه براساس لامبادای ویلکس حاصل از تجزیه تابع تشخیص معنی دار ($0.001 < P < 0.01$) و صحت گروه‌بندی

بالاتری ($0.8338 < P < 0.5995$) نسبت به روش وارد داشت، از این‌رو پس از بررسی دندروگرام حاصل از آن، ژنوتیپ‌های برنج مورد بررسی به دو گروه تفکیک شدند. گروه اول شامل سه ژنوتیپ

جدول ۱۰- تجزیه به مؤلفه‌های اصلی برای شاخص‌های تحمل خشکی ژنوتیپ‌های برنج

Table 10. Principal components analysis for drought tolerance indices of rice genotypes

شاخص‌ها Indices	مؤلفه اصلی اول PC1	مؤلفه اصلی دوم PC2
Yn	0.155	0.394
Ys	0.301	0.023
TOL	-0.175	0.374
SSI	-0.250	0.255
STI	0.277	0.138
MP	0.262	0.227
GMP	0.279	0.174
HM	0.289	0.128
DYI	-0.249	0.230
YSI	0.251	-0.253
YI	0.301	0.021
Pi	-0.255	-0.215
RDI	0.251	-0.254
SSPI	-0.175	0.374
K1STI	0.154	0.389
K2STI	0.296	0.023
Eigenvalue	مقادیر ویژه	11.0034
% Variance	درصد واریانس	69.8
% Cumulative	درصد تجمعی	69.8
		97.9



شکل ۳- نمودار با پلات ۱۶ ژنوتیپ برنج و شاخص‌های تحمل و حساسیت به خشکی براساس اولین و دومین مؤلفه اصلی

Fig. 3. Biplot of 16 rice genotypes and drought tolerance and susceptible indices based on the first and second principle component

ناحیه با پتانسیل تولید بالا و حساسیت پایین به خشکی، متتحمل به تنفس خشکی شناخته شدند. ارقام ندا و نعمت در قسمت سمت راست و بالای نمودار بای‌پلات واقع شدند که دارای پتانسیل عملکرد متوسط تا بالا و حساسیت به خشکی (نیمه‌متتحمل) می‌باشدند. در قسمت پایین و سمت چپ نمودار که نمایانگر حساسیت بالا و پتانسیل تولید کم بود، ارقام حساس به خشکی شامل گوهر، پر迪س و گیلانه قرار گرفتند. ارقام پویا، پژوهش، علی‌کاظمی و کادوس با قرار گرفتن در ناحیه سمت چپ و بالای نمودار بای‌پلات، به عنوان ارقام نیمه‌حساس یعنی با عملکرد و پتانسیل تولید پایین و حساسیت متوسط تا بالا به خشکی شناخته شدند.

از آنجایی که شناسایی ژنوتیپ‌های متتحمل به تنفس خشکی براساس هر کدام از شاخص‌ها به تنها یابی نتایج متفاوتی را به همراه دارد، برای تعیین مطلوب‌ترین ژنوتیپ متتحمل به تنفس خشکی از میانگین رتبه تمامی شاخص‌های محاسبه شده (R_g)، انحراف معیار شاخص‌ها (SDR) و مجموع رتبه‌ها (RS) که جمع میانگین رتبه‌ها با انحراف معیار شاخص‌ها است نیز استفاده شد. بر اساس نتایج (Frashadfar and Elyasi, 2012) رتبه‌دهی ژنوتیپ‌ها که در جدول ۱۱ ارائه شده است، ژنوتیپ‌هایی که کمترین مجموع رتبه را دارند، شامل درفک، نعمت، ندا، قائم، گیلانه، جلودار، اهلمنی طارم، پژوهش و لاین ۸۳۱ متتحمل به تنفس هستند. البته با توجه به اینکه شاخص‌های استفاده شده در این روش، مانند میانگین رتبه و مجموع رتبه‌ها، به دلیل حضور دو نوع از شاخص‌ها در ارزیابی‌های مربوط به تحمل تنفس که برخی کم بودنشان و برخی مقادیر بالای آن‌ها نشان دهنده تحمل ژنوتیپ می‌باشد، باعث ایجاد خطای خواهد شد، بنابراین مقدار نهایی به دست آمده همیشه حاصل توازن صحیحی از رتبه‌های بالا و پایین دو گروه متفاوت شاخص‌ها نخواهد بود، ازین‌رواین روش به عنوان روش مکمل در کنار سایر روش‌های آماری مانند تجزیه خوش‌های و بای‌پلات مورد استفاده قرار گرفت.

۱۰۰ درصد بود (جدول ۸). براساس ۱۴ شاخص تحمل و حساسیت محاسبه شده، ارقام گوهر، علی‌کاظمی و پر迪س از سایر ژنوتیپ‌ها جدا شدند (شکل ۲). نتایج مقایسه میانگین بین دو گروه ایجاد شده در جدول ۹ حاکی از آن بود که گروه دوم بالاترین میزان عملکرد دانه را در هر دو شرایط بدون تنفس و تنفس خشکی (به ترتیب ۳۹۴۶/۷ و ۲۵۹۲/۱ کیلوگرم در هکتار) داشتند.

به منظور بررسی همزمان ژنوتیپ‌ها بر اساس تمام شاخص‌ها در سال دوم آزمایش، از روش بای‌پلات استفاده شد. تجزیه به مؤلفه‌های اصلی برای داده‌های مربوط به ۱۴ شاخص و ۱۶ ژنوتیپ نشان داد که بیش از ۹۸ درصد از تغییرات کل، توسط دو مؤلفه اصلی اول (PC1) و دوم (PC2) قابل تفسیر بود و حذف سایر مؤلفه‌ها تأثیر بسیار ناچیزی در بیان تغییرات داشت (جدول ۱۰)، بنابراین ترسیم بای‌پلات براساس این دو مؤلفه انجام شد. سهم مؤلفه اصلی اول و دوم در توجیه نتایج به ترتیب ۶۹/۸ و ۲۸/۱ درصد بود. مؤلفه اصلی اول ضرایب مثبتی برای شاخص‌های STI، GMP، MP، HM، YI، YSI و K2STI و RDI در شرایط تنفس (Ys) داشت. از این‌رو مؤلفه اول به عنوان مؤلفه تحمل به تنفس خشکی نامگذاری شد. با توجه به مقادیر مثبت و بالای ضرایب این مؤلفه می‌توان ژنوتیپ‌های دارای عملکرد بالا در هر دو شرایط تنفس و غیرتنفس را انتخاب نمود. مؤلفه دوم با دارا بودن همبستگی مثبت با شاخص TOL و همبستگی منفی با شاخص‌های Pi، YSI و RDI، مؤلفه حساسیت به تنفس نامیده شد، بنابراین هرچه مؤلفه دوم کمتر باشد مطلوب‌تر است. در این صورت ژنوتیپ‌ها با دارا بودن مقادیر بالاتر برای مؤلفه اصلی اول (PC1) و مقادیر کمتر برای مؤلفه اصلی دوم (PC2)، متتحمل به تنفس شناخته شدند. در نتیجه لاین ۸۳۱ درفک، اهلمنی طارم، ساحل، قائم، جلودار و شیروودی که در قسمت پایین و سمت راست نمودار بای‌پلات شکل ۳ قرار گرفتند، به دلیل واقع شدن در

"...*Oryza sativa* L. " غربالگری ژنوتیپ‌های برنج

جدول ۱۱- رتبه‌بندی ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل خشکی و روش‌های آماری (۱۳۹۴)

Table 11. Ranking of rice genotypes using drought tolerance indices and statistical methods (2015)

ردیف No.	ژنوتیپ‌های برنج Rice genotypes	Yn	Ys	TOL	SSI	STI	MP	GMP	HM	DYI	YSI	YI	Pi	RDI	SSPI	K1STI	K2STI	SDR	RS		
1	Sahel	ساحل	4	1	15	16	1	2	2	1	16	1	1	15	1	15	4	1	6.0	6.2	12.2
2	elodar	جلودار	12	7	12	13	8	9	8	8	13	4	7	8	4	12	12	7	9.0	2.8	11.8
3	Ghaem	قائم	8	3	13	14	4	5	5	4	14	3	3	11	3	13	8	3	7.1	4.2	11.3
4	Pooya	پویا	6	15	1	2	13	13	13	13	2	15	15	4	15	1	6	15	9.3	5.5	14.8
5	adoos	کادوس	10	12	5	5	12	12	12	12	5	12	12	5	12	5	10	12	9.6	3.0	12.6
6	Dorfak	درفک	5	4	10	12	3	4	4	5	12	5	4	13	5	10	5	4	6.6	3.3	9.8
7	Nemat	نعمت	1	8	2	6	2	3	3	3	6	11	8	14	11	2	1	8	5.6	3.8	9.4
8	Shiroodi	شیروودی	14	6	16	15	10	10	10	9	15	2	6	6	2	16	14	6	9.8	4.5	14.3
9	Neda	ندا	2	2	7	8	6	1	1	2	8	9	2	16	9	7	2	2	5.3	3.9	9.2
10	Gohar	گوهر	15	14	6	3	14	14	14	14	3	14	14	3	14	6	15	14	11.1	4.6	15.6
11	ardis	پرديس	16	13	14	9	16	16	16	16	9	8	13	1	8	14	16	13	12.4	4.0	16.4
12	Gilaneh	گیلانه	11	10	8	7	11	11	11	11	7	10	10	7	10	8	11	10	9.6	1.5	11.1
13	Ahlami Tarom	اهلمی طارم	9	9	11	10	7	8	7	7	10	7	9	10	7	11	9	9	8.8	1.4	10.1
14	Ali Kazemi	علی کاظمی	13	16	3	1	15	15	15	15	1	16	16	2	16	3	13	16	11.0	6.0	17.0
15	Pazhohesh	پژوهش	3	11	4	4	9	7	9	10	4	13	11	9	13	4	3	11	7.8	3.4	11.2
16	Line 831	لاین ۸۳۱	۸۳۱	7	5	9	11	5	6	6	11	6	5	12	6	9	7	5	7.3	2.2	9.5

R: Ranks mean, SDR: Standard deviation of ranks and RS: Ranks sum مجموع رتبهها

میانگین رتبهها، SDR: انحراف معیار رتبهها و RS: مجموع رتبهها

جدول ۱۲- ژنوتیپ‌های برنج متتحمل به تنش خشکی انتخاب شده براساس روش‌های مختلف آماری

Table 12. The selected drought stress tolerant rice genotypes using various statistical methods

روش آماری	ژنوتیپ‌های برنج
رتبه‌بندی	درفک، نعمت، ندا، قائم، گیلانه، جلودار، اهلمنی طارم، پژوهش و لاین ۸۳۱
Ranking	Dorfak, Nemat, Neda, Ghaem, Gilaneh, Jelodar, Ahlomi Tarom, Pajohesh, Line 831
تجزیه خوش‌ای	نعمت، ساحل، ندا، اهلمنی طارم، پژوهش، جلودار، قائم، لاین ۸۳۱ درفک، کادوس، شیروودی، گیلانه، پویا
Cluster analysis	Nemat, Sahel, Neda, Ahlomi Tarom, Pajohesh, Jelodar, Ghaem, Line 831, Dorfak, Kadoos, Shiroudi, Pouya, Gilaneh, لاین ۸۳۱ درفک، اهلمنی طارم، ساحل، شیروودی و قائم
بای‌پلات	Line 831, Dorfak, Ahlomi Tarom, Jelodar, Sahel, Shiroudi, Ghaem
Biplot	درفک، قائم، لاین ۸۳۱، اهلمنی طارم، جلودار
هر سه روش	Dorfak, Ghaem, Line 831, Ahlomi Tarom, Jelodar
Three methods	

اهمی طارم و جلودار به عنوان ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی شناخته شدند.

سپاسگزاری

از موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به جهت همکاری در اجرای این پژوهش قادردانی می‌شود.

تجزیه خوش‌های ۱۷ ژنوتیپ برنج مورد بررسی را به دو گروه تفکیک نمود که ۱۳ ژنوتیپ از نظر شخص‌های مورد بررسی وضعیت بهتری را نسبت به چهار ژنوتیپ دیگر داشتند. بر اساس روش‌های رتبه‌بندی و تجزیه به مؤلفه‌های اصلی نیز به ترتیب نه و هفت ژنوتیپ به عنوان متحمل به تنش شناخته شدند (جدول ۱۲). در مجموع بر اساس نتایج کلی این پژوهش و بر طبق نتایج سه روش رتبه‌دهی، تجزیه خوش‌های و بای‌پلات، ارقام درفک، قائم، لاین ۸۳۱

References

منابع مورد استفاده

- Abd El-Mohsen, A. A., M. A. Abd El-Shafi, E. M. S. Gheith and H. S. Suleiman.** 2015. Using different statistical procedures for evaluating drought tolerance indices of bread wheat genotypes. *Adv. Agric. Biol.* 4(1): 19-30.
- Ahmadi, A., V. Mohamadi, A. Sio-Semardeh and K. Pustini.** 2008. Evaluation of wheat yield and drought resistance indices across water regimes. The 11th International Wheat Genetics Symposium. Sydney University Press. 24-29 August 2008, Brisbane, Australia.
- Akcura, M. and S. Ceri.** 2011. Evaluation of drought tolerance indices for selection of Turkish oat (*Avena sativa* L.) landraces under various environmental conditions. *Zemdirbyste-Agriculture.* 98(2): 157-166.
- Aliakbari, M., H. Razi and S. A. Kazemeini.** 2014. Evaluation of drought tolerance in rapeseed (*Brassica napus* L.) cultivars using drought tolerance indices. *International J. Adv. Biol. Biomed. Res.* 2(3): 696-705.
- Bouman, B.** 2009. How much water does rice use? *Rice Today.* 8(1):28-29
- Bouslama, M. and W. T. Schapaugh.** 1984. Stress tolerance in soybean. part 1: evaluation of three screening techniques for heat and drought tolerance. *Crop Sci.* 24: 933-937.
- Clarke, J. M., R. M. DePauw and T. F. Townley Smith.** 1992. Evaluation of methods for quantification of drought tolerance in wheat. *Crop Sci.* 32: 723–728.
- Erfani, F., M. Shokrpour, A. Momeni and A. Erfani.** 2011. Evaluation of drought tolerance in rice varieties using yield-based indices at vegetative and reproductive stages. *Sustain. Agric. prod. Sci.* 22(4):135-147. (In Persian with English abstract).
- Fageria, N. K.** 2007. Yield physiology of rice. *J. Plant Nutr.* 30: 843–879.
- Fallah-Shamsi, S. A., M. Esfahani, M. Ghodsi and H. Samizadeh Lahiji.** 2012. Evaluation of water deficit stress effect in local and improved rice genotypes based on tolerance indices. Proceedings of the 3rd Conference of Water Resources Management, 20-21 Aug 2011. Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. (In Persian with English abstract).

- Farshadfar, E. and P. Elyasi.** 2012. Screening quantitative indicators of drought tolerance in bread wheat (*Triticum aestivum* L.) landraces. Eur. J. Exper. Biol. 2 (3): 577-584.
- Farshadfar, E. and J. Sutka.** 2002. Screening drought tolerance criteria in maize. Acta. Agron. Hung. 50(4): 411-416.
- Fernandez, G. C.** 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In: Kuo, C. G. (ed.). Proceedings of the International Symposium on Adaptation of Vegetables and other Food Crop to Temperature and Water Stress, Taiwan, 13-18 August, pp. 257-270
- Fischer, R.A. and T. Wood.** 1979. Drought resistance in spring wheat cultivars III. Yield association with morphological traits. Aust. J. Agric. Res. 30: 1001-1020.
- Gavuzzi, P., F. Rizza, M. Palumbo, R. G. Campaline, G. L. Ricciardi and B. Borghi.** 1997. Evaluation of field and laboratory predictors of drought and heat tolerance in winter cereals. Can. J. Plant Sci. 77: 523-531.
- IRRI (International Rice Research Institute).** 2014. Standard Evaluation System for Rice (SES). Los Baños, Leguna, Philippines.
- Jabari, H., G. A. Akbari, J. Daneshian, I. Allahdadi and N. Shahbazian.** 2007. Effect of water deficit stress on agronomic characteristics of Sunflower hybrids. Agric. J. 9(1): 13-22. (In Persian with English abstract).
- Khan, I. M. and O.P. Dhurve.** 2016. Drought response indices for identification of drought tolerant genotypes in rainfed upland rice (*Oryza sativa* L.). Int. J. Sci. Environ. Technol. 5(1): 73 – 83.
- Kumar, S., S. K. Dwivedi, S. S. Singh, S. K. Jha, Lekshmy S, R. Elanchezhian, O. N. Singh and B. P. Bhatt.** 2014. Identification of drought tolerant rice genotypes by analyzing drought tolerance indices and morpho-physiological traits. SABRAO J. Breed. Genet. 46 (2): 217-230.
- Moosavi, S. S., B. Yazdi Samadi, M. R. Naghavi, A. A. Zali, H. Dashti and A. Pourshahbazi.** 2008. Introduction of new indices to identify relative drought tolerance and resistance in wheat genotypes. Desert. 12: 165-178.
- Naghavi, M. R., A. P. Aboughadareh and M. Khalili.** 2013. Evaluation of drought tolerance indices for screening some of corn (*Zea mays* L.) cultivars under environmental conditions. Not. Sci. Biol. 5(3): 388-393.
- Ouk, M., J. Basnayake, M. Tsubo, S. Fukai, K.S. Fischer, M. Cooper and H. Nesbitts.** 2006. Use of drought response index for identification of drought tolerant genotypes in rainfed lowland rice. Field Crops Res. 99: 48-58.
- Rahimi, M., H. Dehghani, B. Rabiei and A. Tarang.** 2013. Evaluation of rice segregating population based on drought tolerance criteria and biplot analysis. Int. J. Agric. Crop Sci. (IJACS) 5(3): 194-199.
- Raman, A., S. B. Verulkar, N. P. Mandal, M. Variar, V. D. Shukla, J. L. Dwivedi, B. N. Singh, O. N. Singh, P. Swain, A. K. Mall, S. Robin, R. Chandrababu, A. Jain, T. Ram, S. Hittalmani, S. Haefele, H. P. Piepho and A. Kumar.** 2012. Drought yield index to select high yielding rice lines under different drought stress severities. Rice, 5:31-43.
- Safaei Chaeikar, S., B. Rabiei, H. Samizadeh and M. Esfahani.** 2008. Evaluation of tolerance to terminal

drought stress in rice (*Oryza sativa* L.) genotypes. *Iran. J. Crop Sci.* 9 (4): 315-331. (In Persian with English abstract).

Safari, S., J. Dehghani and R. Choukan. 2009. Studying drought tolerance indices in maize inbred lines under limited and complete irrigation. *J. Plant Protec.* 23 (2), 20-25 (In Persian with English abstract).

Sikuku, P. A., G. W. Netondo, J. C. Onyango and D. M. Musyimi. 2010. Effects of water deficit on physiology and morphology of three varieties of nerica rainfed rice (*Oryza sativa* L.). *ARPEN J. Agric. Biol. Sci.* 5: 23-28.

Sio-Se Mardeh, A., A. Ahmadi, K. Poustini and V. Mohammadi. 2006. Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditions. *Field Crops Res.* 98: 222-229.

This, D., J. Comstock, B. Courtois, Y. Xu, N. Ahmadi, W.M. Vonhof, C. Fleet, T. Setter and S. McCouch. 2010. Genetic analysis of WUE in rice at the leaf level. *Rice.* 3: 72-86

Yang, J. and J. Zhang. 2010. Crop management technique to enhance harvest index in rice. *J. Exp. Bot.* 61(12): 3177- 3189.

Yazdani, M. R. 2012. Investigation on trend of cracking in paddy fields and management recommendation for percolation reduction. Irrigation Ph.D. Dissertation, Faculty of Agriculture, University of Tehran. (In Persian with English abstract)

Screening of rice (*Oryza sativa* L.) genotypes for drought tolerance using tolerance indices and multivariate analysis

Fallah-Shamsi, S. A.¹, H. Pirdashti², A. A. Ebadi³, M. Esfahani⁴ and M. Raeini⁵

ABSTRACT

Fallah-Shamsi, S. A., H. Pirdashti, A. A. Ebadi, M. Esfahani and M. Raeini. 2017. Screening of rice (*Oryza sativa* L.) genotypes for drought tolerance using tolerance indices and multivariate analysis. **Iranian Journal of Crop Sciences.** 18(4): 347-363. (In Persian).

This experiment was carried out to identify drought tolerant genotypes in a set of 40 rice genotypes. Experimental materials were tested in two experiments including; a; pot experiment carried out on 40 local and improved rice genotypes under two conditions of non-stressed and water stressed (water withholding at booting stage), and b; field experiment with 17 selected rice genotypes from pot experiment using tolerance indices, at Rice Research Institute of Iran in 2014-15 rice growing season. These genotypes were tested under field conditions under normal (fully irrigated till the end of crop life cycle) and stress condition (water withholding at panicle initiation stage, till the end of crop life cycle). Results of the field experiment showed that two rice genotypes; Nemat and Pardis with 4831 and 2076 kg.ha⁻¹ had highest and lowest paddy yield in the non-stressed condition, respectively. In watered stress condition, the highest paddy yield obtained from Sahel (3605 kg.ha⁻¹) and the lowest yield recorded from Ali Kazemi (1179 kg.ha⁻¹). In drought stress conditions in the second year, paddy yield was reduced by 11.5% in Sahel to 64% in Ali Kazemi cultivars. Cluster analysis could classify 17 rice genotypes in two groups and among them 13 genotypes had higher stress tolerance indices. Using ranking method and biplot based on principle components analysis, 9 and 7 genotypes were identified as tolerant, respectively. Dorfak, Ghaem, Line 831, Ahlami Tarom and Jelodar genotypes were identified as drought stress tolerant genotypes.

Keywords: Biplot, Cluster analysis, Drought stress, Rice and Tolerance indices.

Received: December, 2016

Accepted: February, 2017

1. Ph.D. Student, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2. Associate prof., Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran (Corresponding author)
(Email: pirdasht@yahoo.com)
3. Assistant Prof., Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
4. Professor, University of Guilan, Rasht, Iran
5. Professor., Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran